

COMMENTARII  
DE REBUS  
IN  
SCIENTIA NATVRALI  
ET  
MEDICINA  
GESTIS.





VOLUMINIS XVII. PARS I.

LIPSIAE MDCCLXXI.

APVD IO. FRIDERICVM GLEDITSCH

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud  
Briasson, Patauii apud Io. Manfré, Holmiae apud L. Saluium.









I.

Mémoires de mathématique et de physique,  
présentés à l'Académie Royale des Sciences,  
par divers savans, et lus dans ses assemblées.  
Tome V. à Paris de l'imprimerie Royale  
1768. 4. 3 Alph. 20. pl. tab. aen. 20.

i. e.

Commentarii mathematico physici Academiae  
regiae scientiarum per varios eruditos exhibiti  
et in eius conuentibus praelecti. Vol. V.

Continentur in hoc volumine sequentes commen-  
tarii.

1) *Excerpta ex tribus litteris* Cl. BOUILLET p. 1.  
ad Cl. MAIRAN, quae de variis observationibus  
astronomicis agunt.

2) *Observatio eclipsis lunae*, d. 13. ian. 1759 fa. p. 10.  
Acta a Cl. BOUILLET, BARBIER et FORES.

3) *Commentarius super theoria cometae* 1759. p. 12.  
Auctore Cl. BAILLY.

4) *Commentatio prior de aethere salis marini*. p. 19.  
Auctore Ill. DE COURTANVAUX. Aether salis





communis seu naphtha, cuius praeparatio adeo difficilis est, secundum Ill. Auctoris experimenta obtinetur, si librae tres spiritus fumantis **LIBAVII** \*) cum libris duabus spiritus vini miscentur et ex retorta, in arenae balneum collocata, destillantur. Collo retortae applicatur magnum vas recipiens, duplici collo instructum, ita nimirum, vt vnum retortae collum recipiat, alteri vero aliud insuper vas recipiens, tubulo instructum, applicetur. Vasa haec recipientia maximam partem glacie comminuta, cumque sale ammoniaco commixta, obteguntur, primumque vas recipiens linteis insuper, aqua, glacie et sale ammoniaco imbutis, inuoluitur. Iuncturis vasorum luto bene obfirmatis et igne moderato accenso, duplex liquor in vasa recipientia transtillat, alter alteri supernatans, quorum is, qui inferiorem locum occupat, vnciam vnam, alter vero, supernatans et aetherem sistens, libram vnam cum vnciis duabus sexque drachmis pondere aequat. In retorta massa fusca atque compacta remanet, quae pondus duarum librarum et vnciarum quatuordecim habet. Aether nondum depuratus acido abundat, et stannum solutum continet; vtrumque tamen, tum stannum, tum acidum separatur, si oleum tartari per deliquium ad saturationem vsque affunditur, quo facto stannum praecipitatur, et acidum subigitur. Aether ita depuratus denuo destillationi subicitur, sicque purus et rectificatus obtinetur. Quod ad massam, post primam destillationem relictam, attinet,

\*) Spiritus fumans **LIBAVII** praeparatur, si quatuor partes stanni cum quinque partibus mercurii viui commiscentur, et amalgama hoc cum aequalibus partibus mercurii sublimati corrosiui commixtum ex retorta destillatur. Sic enim in vas recipiens liquor admodum fumans transtillat, ex quo, quoties vas aperitur, copiosus, densus, albusque fumus surgit.



tinetur, ea, destillationi subiecta, butyrum stanni dat, quo cum oleo tartari per deliquium mixto, calx stanni obtinetur, quae aequae ac caput mortuum, in vase relictum, per reductionem stannum reddit \*).

5) *Observatio cometae 1759 et 1760 Vlyssippo* p. 37.  
*ni facta.*

6) *Observationes de strato terrae cretaceae et la-* p. 54  
*pidum ramosorum circa Riomium (Riom) reperiundo.*  
Auctore Cl. DU TOUR. Terra haec statim sub humo reperitur, ita tamen, ut inter hanc et illam stratum lapidum calcareorum ramosorum irregularium interpositum sit. Cum itaque terra haec sub lapidibus effodiatur, Noster in hac commentatione ostendere annititur, lapides istos non ab illa terra, sed hanc ipsam a frustulis lapideis ortum duxisse, et lapides quidem formam suam aquae, neutiquam tamen ei ipsi coniunctionem partium suarum debere, quod tamen, si dicti lapides ad stalactites pertinerent, requiri Nostro videtur.

7) *Descriptio nouae machinae in Schemnitiae* p. 67.  
*Hungarorum fodinis mens. mart. 1755 applicatae*  
Auctore Cl. IARS. Gratum erit, Lectoribus, hoc loco machinae sui generis forsitan primae, a IOSEPHO CAROLO HELL, rerum mechanicarum directore, astronomi celeberrimi fratre, inuentae, nec non nisi ex vagis adhuc relationibus cognitae, inuenire accuratam et descriptionem et delineationem, ob praestantiam eius prae reliquis, quae in eiusmodi casibus excogitari et adhiberi solent machinis. Inutile esset consilium, eam sine adiecta accurata delineatione velle describere; satis est annotasse, eam ita esse

A 3

com-

\*) Confer. de hac methodo aetherem acidi salis obtinendi Ill. SPIELMANN Instit. chem. edit. II. exp. 82.

comparatam, vt sine rotis ac tympanis ingens aquae copia ex insigni profunditate ope aëris, per aquam, ex superiori hydrophylacio in vas metallicum irruentem, compressi, eiici; ac exinde, vt quisque facile ipse colliget, qui internam eius fabricam sibi cognitam reddet, totam machinam esse ingeniosam satis fontis HERONIS, per recentiora de vi aëris condensati experimenta, ampliationem.

p. 72.      8) *Commentatio de aceti radicalis concentratione et congelatione.* Auctore Ill. DE COURTANVAUX. Cryсталlos aeruginis destillationi subiecit Ill. Auctor, primoque per aliquot horas ignem lenissimum adhibuit, quo phlegma separaretur; igne posthac sensim aucto, liquores magis ac magis acidos, vltimoque liquorem obtinuit, qui rectificatus in collo retortae, receptaculo intermedio et recipiente, in cryсталlos abit. Praeterea vltimam portionem, si ebulliat, valde inflammabilem esse, et ad praestandam congelationem aceti radicalis, separationem phlegmatis acidum, nec non gradum decimum seu vndecimum thermometri super puncto glaciali requiri, Cl. Auctor notat.

p. 81.      9) *Observatio cometae mens. mai. et iun. Parisiis*  
p. 175. *visi* Auctore Cl. MESSIER cum appendice.

p. 94.      10) *Variae observationes astronomicae Rothomagi* a Cl. BOUIN institutae.

p. 105.      11) *Experimenta, quibus ostenditur, in borace principium cupreum arsenicale et terram vitrescibilem latere.* Auctore Cl. CADET. Boracem, magna quantitate aquae solutam, colauit Noster, et in filtro substantiam albam, leuem et valde friabilem relictam obtinuit, cui terrae nomen imponit. Terram



ram hanc, per plures horas cum aqua decoctam et colatam, euaporationi tradidit, atque inter euaporandum in superficie pelliculam, valde subtilem et diversis coloribus insignitam, animaduertit, quae, partim per cochleare ablata, partim sponte praecipitata et a liquore posthac separata et exsiccata, lamellas paruas, argenteo nitore splendentes, praebuit. Pellicula hac separata, et euaporatione continuata, alia, colore hoc destituta, formatur, tuncque liquor, ad crystallisandum repositus, boracem dat; quod autem crystallisationem respuit, lixiuium praebet. Si pellicula illa, partim supernatans, partim praecipitata, non separatur, et interea euaporatio continuatur, maxima eiusdem pars euanescit, et borax copiosa obtinetur. Itaque pelliculam hanc coloratam ad formationem boracis necessariam requiri, illam autem substantiam, quam terram haecenus vocauit Noster, nihil nisi boracem, principio aquoso, ad crystallisationem necessario, destitutam esse, colligit. Pellicula illa colorata, in fundo vasis reperiunda, carbonibus iniecta, volatilis fit, et absque vlllo odore cito dissipatur. In retortam eadem indita et destillationi subiecta sublimatum admodum album dat, in recipiens autem, cui antea pauca aqua commissa fuit, liquor transtillat, qui aquam colore flauo, sed nullo, nisi fatuo sapore imbuit, quae euaporata materiam albam dat. Materia haec alba pariter ac sublimatum illud album inter duas laminas cupreas, luto bene obfirmandas, interspersum, et igni commissum, cuprum, vt ab arsenico fit, dealbat. Substantia, in retorta relicta, si in crucibulo forti igne funditur, in vitrum pellucidum abit, topazino colore debili tinctum. Si pellicula illa colorata salina cum sulphure sublimationi subicitur, puluis albus et gryseus, vterque cuprum dealbans, nec non sulphur rubrum ascendit, tuncque vasis apertis odor allia-

ceus exit, quod si vero in lixiuium, post euaporationem relictum, laminæ ferreae immerguntur, materia cuprea, his ipsis obducta, manifestatur. Acidus vero liquor, qui, dum sublimatio cum pellicula illa salina et sulphure instituitur, in recipiens transit, si cum solutione mercurii, ope acidi nitrosi facta commiscetur, praecipitatum album dat, ei simile, quod ope spiritus salis obtinetur. Ex his itaque, arsenicum, salem marinum et cuprum boracis mixtionem ingredi, Noster colligit.

P. 115. 12) *Observationes eclipsium lunae d. 29 maii et 13 iun. 1760.* Auctoribus Cl. BOUILLET, DE MANSE, DE FORES.

P. 117. 13) *Experimenta, quae ostendere videntur, boracem continere terram vitrescibilem.* Auctore Cl. CADET. Vitrum, quod ex terra illa, supra descripta, obtinuit Noster, in subtilissimum puluerem comminuit, et cum aqua coxit; liquorem posthac colatum ad siccitatem usque sensim euaporandum curauit, sicque latera vasis euaporatorii materia alba obducta vidit, quae, affuso acido vitriolico, soluta et cum spiritu vini mixta et accensa, flammam viridem dedit. Hinc, terram hanc partem subtilissimam vitri, ab aqua per fortem diuque protractam ebullitionem susceptam, esse colligit. Puluis, in filtro relictus, cumque acidis mineralibus mixtus, in materiam gelatinosam mutatus est. Cum autem Noster similia experimenta cum vitro communi institueret, et eadem phaenomena, praeter id, quod cum acidis solutum et spiritu vini mixtum nullam flammam viridem excitauerit, animaduerneret; vitrum, ex borace obtentum, maximam partem proprietates vitri communis obtinere, splendorem nimirum, fragilitatem etc. seque ad ignem lampadis, vt vitrum commune



mune habere, monet, et ex his terram vitrescibilem boraci inesse, colligit.

14) *Observatio tertii et quarti satellitum Iouis* p. 124.  
mens. novembr. 1760. Auctore Cl. BAUDOVIN.

15) *Commentarius, historiam naturalem et medicam aquarum Plomberianarum* (eaux de Plombieres) sistens. Auctore Cl. MORAND filio. Cum maxima Auctorum, qui de his aquis egerunt, pars in solo earum examine chemico substiterit, Cl. Auctor, aliam viam ad harum aquarum naturam demonstrandam ingressus, soli potissimum, ex quo propullulant, naturam, vicinorumque montium mineralia examinavit. Inuenit autem non solum in arenâ circa fontem posita, sed et in montibus proxime sitis magnam copiam terrae cuiusdam argillaceae induratae, quae polita quasi tactuque pinguis reperitur, et ab aqua calida soluta, thermarum naturam illam pinguem saponaceam, qua cum thermis Schlangenbadensibus, quae etiam similem terram continent, conueniunt, conciliat. Calor harum aquarum semper calorem aquae vulgaris superat, differt vero non solum in diuersis fontibus Plomberianis, ita vt fontes diuersi a 14 ad 65 gradum thermometri Reaumuriani calidi hoc in loco occurrant, sed et calor vnus eiusdemque fontis pro vario gradu caloris aëris externi variat. Ante pluuiam omnes calidiores fiunt. Praeter terram argillaceam alia quoque terra Plombierii reperitur, quae in igne phosphorescit, et a Cl. Auctore primum accuratius examinata est. Pertinet verò ad fluores sic dictos minerales vel spathum vitreum WALLERII et, vti nobis videtur, cum *terra*, quam *de bareira* dicunt, conuenit. Quod de musco *hepatica terrestri* offic. varii Auctores proposuerunt, hanc scilicet plantam Plombierii ibi tantum  
A 5 cresce-

crescere, vbi aquae saponaceae propullulent, Cl. Auctor refutat; cum ibidem etiam in aliis locis reperitur. In fundo *balnei maximi* excrescentia vegetabilis reperitur, quae a tremella in thermis Carolinis aliisque obuia, quam Cl. SPRINGSFELD eleganter descripsit \*), diuersa esse videtur. Consistentiam haec planta papyri, qua ad scribendum vtimur, atque homogeneam, neque reticularem vel vesicularem fabricam habet. Est vero *tremella palustris vulgaris, marinae similis, sed minor et tenerior* DILLENII vel *conserua gelatinosa omnium tenerrima et minima, aquarum limo innascens* RAI.

P. 153. 16) VINCENTII RICCATI *de termino generali serierum recurrentium cum appendice disquisitionis analytica.*

P. 177. 17) *Observationes de tunica choroidea.* Auctore Cl. DESCOMET. Summa harum observationum est: nullum esse interuallum inter finem piaë matris et initium choroideae eo loco, vbi neruus opticus bullum oculi intrat, vti ALBINUS asseruit; choroideam non solum a nerui optici insertionem, sed ex omni superficie scleroticae oriri; tandemque hanc ipsam tunicam non in vena terminari, sed antrosum continuari, omnemque corneae superficiem internam obducere, et hac ratione, vt sclerotica cum cornea, ita et choroideam, globum formare, cui in anteriore parte segmentum globi minoris appositum sit. Teneram vero hanc choroideae continuationem, quae interiorem corneae superficiem, vt adnata exteriorem, inuestit, membranam humoris aquei Cl. Auctor vocat. Omnem itaque choroideam in duas partes diuidit, posteriorem, quae ad ligamenta

\*) Vid. Mem. de l'Acad. de Berlin a. 1752. p. 104. Comment. nostr. Vol. III. p. 688.



gamenta ciliaria vsque a nerui optici insertione scleroticae subtenditur, et anteriorem, quae ligamentum et processus ciliares, vuae et membranam humoris aquei comprehendit. Est vero choroidea contextus fibrarum, quae ex omni scleroticae interna superficie egrediuntur. Hinc iis in locis, ubi vasa eam ingrediuntur, arctius scleroticae adhaeret, similis quoque arctior adhaesio choroideae ad scleroticam, in axi bulbi, paullo exterius insertione nerui optici deprehenditur, quo in loco difficillime choroidea a sclerotica separatur. Interna choroideae superficies, quam multi Ruyfchianam tunicam vocant, densior est exteriori parte. In fenibus interior haec lamina magis albida est, fibris choroideae ad se inuicem arctius adductis, et pigmento illo nigro ad externam laminam, quae laxiorem structuram habet, expresso. Vix condonandum Auctoris erro-  
p. 185.  
rem indicare, operae pretium esse putauimus. Cum enim HALLERUS et ZINNIUS Cll. ubi observationes a Sociis Academiae scientiarum Parisinae, in dissectionibus animalium variorum occupatis, factas, quae titulo inferius commemorato in lucem prodierunt \*), commemorant, plerumque scribant Parisinos hoc vel illud obseruasse, Cl. Auctor putauit esse aliquem Cl. PARISINI, qui commentarios, historiae naturali animalium inferuientes, scripserit, eundemque iam in leone choroideam in duas laminas diuississe \*\*). Scleroticae albus color secundum Cl. Auctoris opinionem pendet ex humoris copia, quo imbuta est. Quae si enim siccatur, pellucida fit, et aquae

\*) Memoir. pour servir à l'histoire des animaux dressés par Mr. PERRAULT. 4.

\*\*) En verba Cl. Auctoris: *Parisini a separé dans une lionne une lame de la choroïde, qu'il appelle le tapis.* In nota adiecta citantur EIU S D. *Memoires pour servir etc.*

aquae iterum immissa, pristinam opacitatem recuperat. Piaae matris lamina, quae ex Cl. ZINNII observatione \*) eo in loco, ubi nervus opticus bulbum ingreditur, scleroticam interius obducit et in eius laminam internam abit, laminae exterioris choroideae aliqua portio fuit, quae scleroticae adhaesit. Iam vero, quod ad nouam a Cl. Auctore primum, ut putat, propositam \*\*), choroideae productionem, quae corneam interius inuestit, attinet, ea in equo, oue et lepore integra a cornea ab eo, scalpelli ope, separata fuit. Ligamento ciliari exterius adhaeret et ad circulum vueae e s. p. continuatur. In infantibus cum cornea perfecte concrescit, in adultis vero sensim ab ea secedit, ita ut in senibus sexaginta annorum integra separari possit. Cum vero in homine tenerrima sit, equorum potissimum oculis Cl. Auctor usus est. Naturam capsulae lentis crystallinae et membranae humoris vitrei habet, a cornea separata conuoluitur et aquae immissa, non, ut cornea, mutatur. Sedem cataractae membranaceae, in anteriore oculi camera obuia, Cl. Auctor in ea ponit.

p. 190. 18) *Commentarius de nauigatione ex Gallia in Indiam orientalem.* Auctore Cl. D'APRES DE MANNEVILLE.

p. 233. 19) *Commentarius de surdis et mutis* Auctore Cl. ERNAULD. Breuiter methodos describit Cl. Auctor,

\*) *De oculo* tab. I. fig. I. et cap. I.

\*\*) Iam Cl. BONN in dissertatione inaug. de continuationibus membranarum Lugd. B. 1763. defensa, monet: anteriorem iridis laminam non ad corneae ambitum deficere, sed supra internam corneae superficiem continuari, ab eaque sat insignem partem se separasse asserit. Vid. l. c. p. 46 et Comment. nostr. Vol. XIII. p. 113. Facillime rem in oculo senili nonnunquam succedere, ipsi, dum haec scribimus, experti sumus, et, si vuea tenditur, ab ea membranaceam productionem ad corneam protendi, quilibet experiri potest.



Et or, qua loquelaе facultatem hominibus a natiuitate furdis conciliat. Longe tamen perfectiora et pleniora consilia in egregio libro AMMANNI de hac re conscripto occurrunt, neque ea, quae hic proponuntur, noua sunt, aut saltem ita comparata, vt breuiter hic in compendio tradi queant.

20) *Disquisitiones circa uterum.* Auctore Cl. LEP. 247. suë. Cl. Auctor vteros omnium aetatum, puellarum impuberum, feminarum menstruatarum, gravidarum et parturientium anatomicè dissecuit, atque potissimum varia musculosa strata in vtero eiusque confiniis, a se ipso detecta, describit. Vidit vero primum fibras musculosas in duplicatura ligamentorum latorum vteri excurrentes, quales etiam in ea peritonaei duplicatura, qua vterus ad intestinum rectum alligatur, deprehenduntur, quas *musculos obliquos laterales* nominari posse contendit. Peritonaei lamina ab vtero detracta, exterius in anteriore vteri superficie aliquod stratum fibrarum longitudinalium invenitur, quae radiatim primum dispersae, quo propius ad fundum accedunt, eo magis ad se inuicem convergunt, et circa fundum circumuolutae in posteriore superficie iterum descendentes, radiorum instar, secedunt. Sub iis aliae sunt transuersim et oblique positae, iisque aliud stratum simile subiacet, quod superiori varie implicatur, vt fabrica, cordis fabricae musculosae, analogae inde nascatur. In interiori vero vteri superficie occurrunt primo quatuor musculi triangulares, duo in posteriore totidemque in anteriore parte collocati, quorum omnium apex in laterali fundi parte eo in loco positus est, vbi tubae Fallopianae vterum ingrediuntur; basis vero in media et inferiore vteri parte collocatur. Hos musculos *quadrigenos uterinos* Cl. Auctor vocat. Ruy-schianum musculum orbicularem in fundo vteri non vidit.

vidit. Describit autem duos alios *orbiculares laterales*, quorum centrum in aperturis tubarum est, circa quas concentricae fibrae circumflectuntur. In inferiore vteri parte transuersales et obliquae fibrae varie inter se inuicem irretitae sunt. Orificium vteri internum circulares fibras habet, inter quas eminentiae longitudinales carnosae sunt. Vasorum orificia vel sinus vbique inter orbiculares et transuersas fibras aperiuntur. Iam quod vsum horum muscutorum attinet, putat Cl. Auctor, fibras carneas ligamentorum latorum tubas sub conceptione ouariis applicare, eas vero, quae in iis ligamentis, quae nonnulli Galli posteriora dicunt, deprehendantur, efficere, ne vterus ad latera vacillet; musculos longitudinales externos fundum vteri ad orificium deprimere; obliquos et transuersos externos fetum et sanguinem ex vasis subiectis exprimere; quadrigeminos tandem et transuersos internos, fetu egresso, placentae expulsionem adiuuare. In fetu et infantili aetate semper colum vteri maius est, eaque magnitudo, quae primum magnitudinem corporis vteri aequabat, sensim minuitur.

p. 254. 21) *Dissertatio de quibusdam libris aquariis seu instrumentis, quibus horizontalis linea determinari solet*, Auctore Cl. CHEZY.

p. 263. 22) *Commentarius de ichthyocolla*, Auctore Cl. MÜLLER. Haec ichthyocolla non, vt multi putant, ex ea tantum acipenseris specie, quae *acipenser kuso* dicitur, sed ex quatuor speciebus huius piscis in Russia obuiis obtinetur, ex *sturione* scilicet et *acipensere ruthe-no* (sterlet), quae optimam largiuntur, ex alia porro acipenseris specie, quae *seurjouga* vulgo vocatur, (quam LINNAEUS ad *sturionem* retulit, quo vero minor capitisque rostro magis elongato est,) et tandem ex *husone*



*husone*. Haec vltima species, quae *beluga* nominatur, probe distinguenda est ab alio pisce ex cetaceorum genere (*piscis cetaceus albus* RAII) etiam *beluga* dicto, ex cuius corio lineae curruum, non vero vt LINNAEUS in systemate asserit ex acipensere *husone* praeparari possunt. Ichthyocolla vero non solum ex acipenseris speciebus, sed etiam ex aliis piscibus nonnunquam paratur, vt ex *cyprini* aliqua specie *sasan* dicto, ex *siluro*, imo *gado molua*, qui in Volga et Yaik fluuio abundant. Omissis, quae de fluuiis Russiae, in quibus species acipenseris, ichthyocollam largientes, reperiuntur, Auctor Cl. habet, annotamus, ichthyocollam obtineri ex vesica acipenserum natatoria, quam inter cartilagineos pisces vnicum hoc genus habet. Haec purgata vna cum glutine, quod continet, in pastam manuum ope figuratur, et in taleolos secta lente exsiccat. Est alia adhuc species, quae coctura vesicae, ichthyocollam largientis, paratur, quae vero longe rarior est vulgari eaque praestantior, et cum ea collae specie, quam vulgo *mundleim* dicimus, conuenit.

23) *De positione orbitae veneris ex obseruationibus, in eius transitu per discum solarem d. 6. iun. a. 1761. a Cl. MAYERO factis, differit Cl. BAUDOVIN.* p. 270.

24) *Disquisitiones circa respirationem erucarum.* p. 276. Auctore Cl. BONNET. Notum est, Cl. REAUMUR putasse, stigmata erucarum aliorumque insectorum a MALPIGHIO primum descripta \*) soli inspirationi inferuire, aëremque a tracheis susceptum per poros cutis, in qua distribuuntur tracheae, iterum egredi. Cl. vero BONNETI experimen-

\*) Vid. Cl. LYONNET descript. de la chenille p. 407. seq. Comment. nostr. Vol. XI. p. 427.

rimenta hic recensita probare videntur, aëris globos, qui in erucis sub aqua merfis ex cute egredi visi sint, fuisse aërem, qui cuti ante submersionem adhaeserit, quae difficulter aqua madefiat; aëremque etiam per stigmata iterum egredi, egressumque hunc motu et agitatione corporis erucae adiuuari. Parte corpore erucae extra aquam eleuata, ab aëre, per stigmata, aqua non tecta, irruente, totum corpus ad motum iterum suscitatum est. Gangliis medullae spinalis semihora post mortem erucae irritatis, muscoli vicini ad motum excitati sunt. In papilionibus Cl. Auctor etiam stigmata 18, id est, tot, quot in eruca adfunt, numerauit.

P. 304. 25) *Observationes astronomicae Parisiis a Cl. MESSIER a. 1762 institutae.*

P. 319. 26) *Commentatio de solfataris circa Romam, deque origine et formatione vitrioli Romani.* Auctore Cl. MAZEAS. Vasti gurgites seu voragines, in statu Ecclesiastico inter mare Toscanum et montes Apenninos reperiundae, solfatarae vocantur. Notissimae harum voraginum sunt solfatara Tiburtina et Viterbiensis. Prior quatuordecim milliaria a Roma distat, intolerabilem hepatis sulphuris foetorem exhalat, strepitum continuum edit, bullulaeque aëreae continuo ad superficiem aquae surgunt. Phaenomena haec a terra quadam et sulphure prouenire, Noster perhibet. Sedimentum enim harum aquarum, in igne disquisitum, calcem perfectam praebet; sique terra illa alba cum sulphure coquitur, odor hepatis sulphuris producitur. Hae insuper aquae incrustationes formant, quae indolis seleniticae sunt, martisque praeterea crocus ex his aquis, si stagnant, praecipitatur. Altera vorago, solfatara scilicet Viterbiensis, sub nomine *bullicame* nota est, quod ab ebullitione aquarum contraxit. Haec eadem



eadem ratione, vt praecedens, odorem hepatis sulphuris exhalat, eandem speciem selenitis soluti continet, et canales, per quos ducitur, incrustat. Aquae eius limpidiores, quam praecedentis, sunt, hanc quidem ob rationem, quod nullum bitumen contineant et calidae sint. Praeterea maiorem copiam ferri habent, quod in canalibus omnibus et locis, vbi aquae istae stagnant, sub forma croci praecipitatur.

Aquae hae sulphureae ad formandum vitriolum p. 327. ab ipsa natura impenduntur, quod triplici modo fieri obseruatur. Primus est, dum vapores, ex solfataris riuisque sulphureis ascendentes, in terras martiales rursus descendunt, hasque sensim efflorescentia quadam vitriolica obducunt. Cum vero proventus ab his terris parcissimus sit, vitriolum ex his non coqui, Noster perhibet. Alter modus est, vbi vapores terras, ferrum continentes, quasi per filtrum penetrant: terrae eiusmodi coerulescentes et adstringentes sunt, et ad vitriolum excoquendum impenduntur. Tertius est, quando terrae martiales, multum insimul sulphuris continentes, per motum quendam intestinum et calorem ad producendum vitriolum disponuntur. Cum vero saepe contingat, vt ferrum et sulphur, in his terris irregulariter dispersa, intimam vnionem subire nequeant, operarii terras has in peculiaribus aedificiis accumulunt, easdemque in his per artem eo disponunt, vt motum intestinum subeant, atque acidum vitriolicum cum ferro coniunctionem inire queat; quo facto terras sic adaptatas ad praeparandum vitriolum adhibent.

27) *Obseruatio transitus veneris per discum solis* p. 331.  
*Parisiis facta d. 6. iun. 1761. Auctore Cl. MES-*  
*SIER.*

Tom. XVII. Pars I.

B

28) *Ana-*

P. 341. 28) *Analysis gypsi*. Auctore Cl. LAVOISIER. Experimenta, quae Cl. Auctor cum gypso instituit, ostendunt, lapidem specularem seu gypsum non calcinatum, aequè ac calcinatum, in magna quantitatè aquae solui, solutum et lente euaporatum crystallos admodum exiguas praebere, igni expositum pelluciditatem et aquam amittere, leni igne calcinatum cum aqua indurari, cum carbonibus tractatum hepæ sulphuris exhibere, et aqua solutum, affuso oleo tartari per deliquium, tartarum vitriolatum et terram calcaream largiri. Ex his colligit Cl. Auctor, lapidem specularem seu gypsum quodcunque salem neutrum esse. Cum vero in aqua difficulter solvatur, ad eius solutionem quingentis partibus aquae opus habet.

P. 358. 29) *Observationes de alcali plantarum marinarum, et modis, istud eidem vsui, cui soda inseruit, aptum reddendi*. Auctore Cl. MAZEAS. Plantae marinae, quas Cl. Auctor examinavit, sunt: 1) *Fucus maritimus, seu quercus marina vesiculas habens C. B.* 2) *Fucus angustifolius vesiculis latis filiquarum æmulis RAI.* 3) *Fucus longissimo, latissimoque folio C. B.* Plantae autem maritimae sunt 1) *Salicornia annua geniculata TOURNEF.* 2) *Salicornia gramineo folio candicante EIUSD.* seu kali minus album semine splendente C. B. 3) *Crithmum maritimum flore asteris attici C. B.* 4) *Cneoron album folio oleae argenteo molli. C. B.* Plantae hae, tum singulae, tum coniunctae, si comburuntur, cineres largiuntur, ex quibus quidem per elixationem et euaporationem alcali obtinetur, quod vero indolem sodae Alicanticae non habet, nec oleum soluit, nec cum eodem perfecte coniungi se patitur. Vt itaque alcali, ex dictis plantis obtinendum, sodae simile fieret, nec olei coniunctionem respueret, libram vnam  
cine-



cinerum harum plantarum cum sex vnciis nitri, sexque drachmis pulueris carbonum commiscuit Noster, inque crucibulo candente detonationi tradidit. Detonatione peracta, massam aequè duram et compactam, ac sodam, penitus alcalinam, in coerule-scentem colorem vergentem obtinuit, quae cum calce acuata lixiuium praebuit, adeo actiuum, vt quinque vel sex eiusdem guttae ad albescendam olei vnciam dimidiam, idque lacteum reddendum sufficerent. Nouam hanc sodam eodem modo, vt sodam Alicanticam ad instituendam praeparationem saponis se habere, easdem crystallos praebere, nec in aere deliquescere, Noster perhibet.

30) *Observationes astronomicae Tolosae factae a p. 367.*  
Cl. D'ARQUIER.

31) *Observationes de minera aluminis de la Tolfa p. 379.*  
*in locis Romae finitimis, deque eadem minera ad Pali-*  
*nier in Britannia minore reperiunda. Auctore Cl.*  
MAZEAS. Circa arcem Tolfa complures depre-  
henduntur colles, faxis pleni, quae pulueris pyrii  
ope diffringuntur. Saxa haec diffracta, maxima cum  
cura in furnis calcinantur, posthac autem in aedifi-  
cia, hunc in finem exstructa, deportantur, ibique  
ita disponuntur, vt ab aqua affluente humectentur,  
quae de faxis in fossam promanans, breui tempore  
sapore aluminoso imbuitur. Frequente hac lotio-  
ne, interdum quatuordecim dies durante, lapides  
isti finduntur, tandemque, vt calx viua, in pastam  
abeunt. Pasta haec in ahenis plumbeis, aqua re-  
pletis, sub continua agitatione coquitur; cocta de-  
mum, alumine sufficienter impraegnata, in aliud vas  
deriuatur, in quo clarior limpidiorque facta ad cry-  
stallificationem idonea fit. Ex hoc canalis ope in se-  
xaginta ad octoginta vsque vasa, singulari modo con-  
structa

structa et inter se inuicem coniuncta, deriuatur, vbi lateribus eorum alumen, in crystallos formatum, accrescit. Aqua inde defluens colligitur, iterumque in ahenum, vbi pasta aluminosa coquitur, infunditur. Alumine ex dictis faxis extracto, sabulum subtile cum terra, ad ignem se indurante, mixtum, nec non materia pinguis, albescens et acida relinquitur, quae aeri exposita efflorescit, humiditatem attrahit, et eadem fere phaenomena praebet, quae in lixiuio, post crystallisationem vitrioli superstita, obseruantur. Colligit itaque ex his Cl. Auctor, acidum vitrioli in dictis faxis iam existere, per calcinationem autem tum demum euolui et ad combinationem intimam cum terra aluminosa disponi.

P. 384. Quod ad mineram aluminosam de Palinier in Britannia attinet, ea lapidem sistit, qui in fodina, vbi tripela effoditur, reperitur, et minerae aluminosae de la Tolfa perfecte analogus est. Hic lapis a tripela differt: si enim dictus lapis et tripela igni exponantur, haec duritiem retinet, quae in illo cessat. Si deinde iste lapis aqua humectatur, et chartae coeruleae imponitur, ei maculam rubescentem imprimit, quam tripela non efficit. Idem porro lapis calcinatus, et aqua saepe irroratus, saporem aluminosum linguae imprimit; forti igne calcinatus, nullum vltro alumen dat, quod aequè in minera aluminosa de la Tolfa obseruatur. Itaque igne forti mineras has acido suo orbari, acidumque hoc basi suae in minera immediate non vnitum esse, Noster coniicit.

32) *Methodus, qua naus, in fluuio submersa, iterum eleuata fuit.* Auctore Cl. BONNONY.  
P. 392.

33) *Transitus mercurii per discum solis d. 6. maii 1753. Parisiis obseruatus a Cl. KERAUSTRET.*  
P. 396.

34) *Com-*



34) *Commentatio prior de frigore, quod liquores, P. 405.*  
*cum euaporant, producant.* Auctore Cl. BAUME.  
 Liquores seu fluida, quibuseum Cl. Auctor haec exper-  
 imenta instituit, sunt; 1) aqua fluuiatilis cola-  
 ta; 2) eadem aqua destillata et per annum asserua-  
 ta; 3) acetum vini vulgare; 4) acetum vini destil-  
 latum; 5) acetum vini destillatum, per frigus con-  
 centratum; 6) spiritus veneris; 7) spiritus nitri  
 fumans; 8) spiritus salis fumans; 9) spiritus sul-  
 phuris; 10) oleum terebinthinae vulgare; 11)  
 oleum terebinthinae rectificatum; 12) oleum ani-  
 male DIPPელიi rectificatum; 13) spiritus cornu  
 cerui; 14) spiritus salis ammoniaci, cum calce, in  
 aere extincta, paratus; 15) spiritus salis ammonia-  
 ci vinosus; 16) aqua vitae; 17) spiritus vini com-  
 munis; 18) spiritus vini rectificatus; 19) spiritus  
 vini rectificatus, cum camphora saturatus; 20) ae-  
 ther vitriolicus; 21) aether nitrosus. Singulis his  
 fluidis thermometer tam nudum, quam linteum  
 inuolutum, immergit, atque omnia haec fluida, aci-  
 dis nonnullis exceptis, frigus, dum euaporent, pro-  
 duxisse, hocque, quo magis euaporabilia fluida sint,  
 eo quidem maius, minus tamen durabile esse, ob-  
 seruauit. Cum Cl. Auctorem ubique sequi nequeamus,  
 vnum alterumque exemplum commemorasse, suffi-  
 ciat. Aceto vini vulgari, eidemque destillato, nec  
 non per frigus concentrato, thermometer immer-  
 sum vix ad gradum vnum, dum extraheret Noster,  
 descendit; spiritui veneris autem et spiritui nitri ac  
 salis fumanti immersum statim post extractionem  
 ascendit. In oleo animali DIPPელიi ad duos gra-  
 dus et, cum thermometer, linteum inuolutum, im-  
 mergebatur, ad quatuor gradus descendebat. Haec  
 et reliqua, cum fluidis instituta, experimenta, utili-  
 tate non carere, et arti inprimis saluari inferuire  
 posse, Noster autumat. Si v. g. quis sudet, et lin-  
 tea,

tea, quibus inuoluitur, sudore madida sint, humorem, dum euaporet, nonnunquam funesta symptomata, quorum causa forsan ignorari posset, producere, asserit. Itaque in medicina et chemia, si lintea humoribus fluidisque madefacta applicentur, ad euaporationem liquoris humectantis et producendum inde frigus attendendum esse, Noster innuit.

P. 425. 35) EIUDEM *Commentatio posterior, de eodem argumento.* In hac ostendit Cl. Auctor, frigus, si pressio aeris ambientis, qui euaporationem ex parte retardet, supprimatur, notabiliter augeri. Itaque experimenta, in vacuo instituta, communicat, quibus demum alia, cum variis liquoribus et glacie suscepta, subnectit. Sic aquae purae, ad trigesimum quartum gradum calefactae, calor intra decem minuta in vacuo ultra nouem gradus imminutus est, cum eiusdem aquae calor intra idem tempus in aere libero tres tantum gradus descenderet. Spiritus salis ammoniaci cum calce viua, in aere extincta, paratus effecit, ut thermometer in vacuo ad nouem gradus, in aere libero autem ad quinque gradus descenderet. Thermometrum aetheri, in vacuo posito, immersum viginti sex gradus frigoris ostendit. Cum hoc Noster obseruaret, vasculum, aqua repletum, aetheri immergit, posteaque in vacuum collocavit, sicque subito aquam in glaciem abiisse, obseruauit. Quod ad coniunctionem fluidorum cum glacie attinet, experimenta Noster cum variis acidis, oleo animali DIPPELII, spiritu salis ammoniaci vinoso, spiritu salis ammoniaci cum calce viua parato, aqua vitae, spiritu vini vulgari et rectificato, nec non cum aethere vitriolico et nitroso instituit, variosque gradus refrigerii obseruauit. Sic vncia dimidia glaciei contusae, cum drachmis duabus aceti vini vulgaris mixta, thermometer ad vnum gradum descendere coegit.



coegit. Drachma vna spiritus salis fumantis, cum vncia dimidia glaciei contusae mixta, descensum in thermometro ad sedecim gradus, duae autem drachmae dicti spiritus cum eadem quantitate glaciei ad gradus viginti tres, et tres drachmae eiusdem ad gradus viginti quinque effecerunt. Aether vitriolicus, cum glacie mixtus, thermometrum ad gradus octo, aether vero nitrosus ad gradus decem descendere coegit. Sed haec sufficiant. Ex his enim patere arbitramur, quanto studio quantaque attentione experimenta haec, vtilitate certe non destituta, a Cl. Auctore instituta sint.

36) *Observationes insulae in Flandria a fine hys p. 441. mis 1752. ad ver 1753. factae, circa diuersam aëris temperiem, agros eorumque producta, et morbos epidemicos, in hac prouincia grassantes. Auctore Cl. BOUCHER.*

37) *Commentarius de conchyliis in Galloprovin. p. 467. cia datte dictis. Auctore Cl. FOUGEROUX DE BOUDAROY. Praeter pholades, quos Galli dails vocant, alia quoque testaceorum species rupes terebrat et in lapidibus habitat, quam datte nominant, et quae mytilus lithophagus Ill. LINNAEI est. Cum vero Cel. REAUMUR, qui in commentariis academiae Parisinae \*) pholades accuratius descripsit, putauerit, illos argillam tantum perforare posse, et pholades, quos in lapide duriori deprehendimus, in hunc lapidem eo tempore penetrasse, quo adhuc mollis fuit, postea vero hanc argillam in lapidem mutatam esse; Cl. Auctor huius commentarii demonstrat; mytilos aliaque testacea lapides durissimos perforare posse. Vidit enim illos non solum in madreporis, sed et maxima eorum copia Toulonii*

B 4

in

\*) A. 1712. p. 126. seq.

in faxis aqua marina tectis, quae ex lapidicinis remota et in portum delata sunt, quo aedificia iis superstruantur, reperitur. Putat vero mytilos, paruos adhuc, filamentorum seu byssi ope faxis adhaerere, et tum corporis motu, tum ope partis cuiusdam carnosae, quae vulgo pes in testaceis nominatur, lapidem sensim perforare. Hinc canalis, quem animal effodit, semper in superficie lapidis exteriori angustior est, quam interius, ubi animal collocatum est. Si animal in itinere suo canaliculum ab alio animali perfossum offendit, eum penetrat, et mytilum, qui ibidem habitat, enecat. Penetrant vero etiam in canaliculos, quos mytuli parauerunt, per aperturam externam, varia insecta marina, conchyliisque his vescuntur. Quae de anatome mytilorum horum Cl. Auctor habet, omittimus, cum fabrica eorum, cum fabrica reliquarum specierum huius generis satis conueniat.

P. 479. 38) *Usus diuisorum numeri in resoluendo problemate arithmetico.* Auctore Cl. RALLIER DES OURMES.

P. 485. 39) *Expedita methodus numeros primos in serie numerorum imparum continuata detegendi, et simul diuisores eorum numerorum, qui non sunt primi.* Auctore E. O D E M.

P. 500. 40) *Observationes circa surdos et mutos cum animaduersionibus in nonnulla loca commentarii* Cl. ERNAULD sup. p. 233. Auctore Cl. PEREIRE. Docet Cl. Auctor, Cl. ERNAULD non inuentorem esse methodi ibidem descriptae, sed ipse sibi hanc gloriam vindicat. Pleniorum vero huius controversiae historiam in compendio tradere, impossibile esse iudicamus.

41) Com-



41) *Commentarius de falsola kali* (falicor). Au-p. 531.  
 Auctore Cl. MARCORELLE. Describitur hoc commentario non solum planta *falsola kali* LINN. ex qua optima sodae species paratur, sed et fusa cultura eius in agris sale marino impraegnatis, et methodus exponitur, qua soda post combustionem plantae ficcatae obtinetur. Ex succo falsolae iam alcali minerale sodae et sal marinum, ante combustionem extrahi potest, quod iam Cl. MONTEY observavit, cuius tamen commentarius de hac re conscriptus \*) Cl. Auctori demum, hoc commentario iam ad finem perducto, innotuit. Soda ex falicornia optima est, et colorem ex nigro coerulescentem habet. Sodae vero, ex *falicornia herbacea et fruticosa* (quam plantam Galli *soude* vocant) paratae, quae praecedente inferior est, color griseus esse solet. Paratur vero etiam soda ex variis aliis plantis, ut *mesembryanthemi, falsolae et falicorniae* aliis speciebus.

42) *Epitome observationum Rothomagi d. 12. p. 549. iul. 1757. factarum* a Cl. PINGRÉ et BOUIN.

43) *Observatio astronomica eodem die Parisiis facta* ibid. a Cl. MONNIER.

44) *Nova methodus diuidendi, si diuidendus fuerit multipulum diuisoris, nec non radices extrahendi ex potentia perfecta.* Auctore Cl. RALLIER DES OURMES.

45) *Commentarius continens descriptiones eclipsium solis Parisiis visibilium ab anno 1767 ad a. 1900.* Auctore Cl. DU VAUCEL.

B 5

46) Com-

\*) Vid. Mem. de l'Acad. a. 1762. p. 639. Comm. nostr. Vol. XV. p. 478.

- p. 593. 46) *Comparationes lunae cum stellis fixis a. 1756. Rothomagi factae. Auctore Cl. BOUIN.*
- p. 598. 47) *Observationes astronomicae ibidem ab EODEM a. 1757. factae.*
- p. 605. 48) *Observatio eclipsis solis d. 13. iun. 1760. ibidem facta a Cl. DULAGUE.*
- p. 607. 49) *Commentarius de fetu monstroso. Auctore Cl. BETBEDER. Monstrum hoc duo capita, quatuor brachia, thoracesque duos habuit. Internis vero partibus a chirurgo exemptis, qui in partu opem tulerat, anatomen eius Cl. Auctor non tradere potuit.*
- p. 611. 50) *Observationes astronomicae a mense augusto a. 1752. ad annum 1762. Parisiis factae a Cl. MESSIER.*
- p. 615. 51) *Observatio circa tertium satellitem Iouis d. 25. ian. 1763. ab EODEM facta.*
- p. 617. 52) *Commentatio de pyritis et vitriolis, ad stabilienda dogmata chemica de formatione naturali harum substantiarum mineralium aliarumque materiarum, quae ex combinatione earundem producuntur. Auctore Cl. VALMONT DE BOMARE. In itineribus, quae fecit Noster, varias de pyritis et vitriolis collegit observationes, quarum summa hic traditur. Pyrites Nostro sunt omnes substantiae terrestres, salinae, acidae, quae vario sub statu mineralisatae et crystallisatae sunt; interim pyrites a marcasitis distinguit, subque his ea corpora mineralia comprehendit, quae tam de pyritis, quam metallis participant, humiditatem non attrahunt, et omnem elixationem respuunt. Pyrites respectu figurae et proprietatum diuersos esse,*





II.

**Traité des fleurs blanches, avec la méthode de les guérir: par Mr. RAULIN. Docteur en Médecine, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi; de la Société Royale de Londres, des Académies Royales des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Bordeaux et de Rouen, et de celle des Arcades de Rome. Tome premier. à Paris, chez Herissant, fils, libraire. 1766. 12. pagg. 435. cum praefatione pagg. 30. Tome second. Ibidem, eodem anno, pagg. 626.**

i. e.

**Tractatus de fluore albo, cum methodo eum curandi. Auctore Cl. RAULIN, etc.**

**I**n tres partes opus hoc diuiditur, quarum duae priores primum, tertia alterum tomum constituunt. Pars prima theoriam fluxus albi proponit, eiusque sectio prima characterem illius, secunda varias species, tertia causas remotas sistit. Pars secunda causas propiores et immediatas fluoris albi ita pertractat, ut sectio prima causas eiusdem propiores, et secunda causas proximas exponat. Tertia denique pars de cura fluoris albi agit, et sectione prima rationem praecauendi causas eiusdem remotas atque medendi effectibus earundem, sectione secunda curam causarum propiorum, et tertia curam causarum immediatarum seu proximarum exhibet. Singulae sectiones in capita quaedam subdivisa sunt, quorum argumenta nunc paullo vberius prosequuturi sumus.

**Tom. I.** Primum caput sectionis primae in parte priori p. 1. exponit, quid nomine fluoris albi veniat. Est ille efflu-



effluxus humorum aquosorum, serosorum, lymphaticorum, mucosorum, biliosorum, chylosorum vel lacteorum ex pudendis feminarum, vario modo differens pro varietate causarum ipsius, fere semper ratione effectuum suorum timendus, diuersus ratione ortus sui et periodorum, quas seruat, incongrua etiam nonnunquam sequela menstruorum cessantium; rarissime in feminis perfecte sanis absque incommodo occurrit, et hoc ne tunc quidem, cum aliquamdiu perdurauerit. Cognitus quidem fuit antiquis, sed tum non nisi vetulas infestasse scribitur, p. 7. quum hodie ne tenerrimae quidem aetati parcat. Molestum symptoma est in grauidis, et infantes hoc maternum vitium saepius luunt. Neque semper a vitio vteri pendet, sed a quacumque corporis aut partis cuiusdam deprauatione oriri potest: neque res periculo caret, si ipse vel sponte cessat, vel reprimatur inepte. Caput secundum sanguinem et chy- p. 11. lum, tamquam fontes generales mali huius, considerat, et integrum fere physiologicum est. Tertium caput descriptionem vteri exhibet, et quid ille ad fluorem album conferat, docet, vbi praecipue ratio habetur motus fluidorum in hac parte ob flexuras vasorum insigniter retardati, et insignis copiae glandularum folliculosarum per totam vteri et vaginae superficiem dispersarum. Caput quartum exponit, p. 36. qua ratione fluor albus oriatur. Fluidae corporis partes cum deprauantur, solidas sensim iusto tono iustaque elasticitate priuant easque relaxant; et vt in omnibus chronicis morbis fluida corrupta locum sibi peculiarem deligunt, in quem copiosius irruunt ac sedem ibi figunt, ita mirum non est, vterum facile eiusmodi decubitus pati, cum structura mire iisdem faueat, quare MERCATUS et PARACELSUS eundem emunctorium vniuersale totius corporis dixerunt. Caput quintum agit de diuersis co- p. 40. loribus

- loribus fluoris albi. Differunt ii ratione diuersae qualitatis humorum, ad vterum deductorum, ratione indolis, quam in ipso vtero acquirunt, ratione morae, quam in eodem subeunt, et ratione mutationis, cui in eo ipso subiecti sunt. Varietates hae colorum ex veterum scriptis ad decem classes redigi possunt; insigniter autem omnino mutantur ex assumptis alimentis potulentisue, aut aliis circumstantiis ex vario vitae genere accidentibus. Caput sextum diuersas qualitates fluoris albi exponit, qui aequae ut colores eius variant pro varietate causae et materiae effluentis, huius maioris vel minoris morae in vteri et vitiorum ibi contractorum. Inueteratus fere malignioris indolis et periculosior saepe est, quam recens. Ab his diuersis qualitatibus odor etiam diuersus determinatur. Describit nunc Cl. Auctor diuersas fluoris albi species. Serosus copiosior oedemata, pallorem, cet. efficit. Qui flauescens coloris est, copiosus et foetens; viscosus autem viridescens, plus minusue corrodens est. Pessimus est nigricans vel obscuri coloris. Qui coloris pallidi et albi sunt, pertinaciores sunt, at minus periculosi. Qui loturam carniū aequant, maximopere irritant. Albi cancrofi, faniosi et putridi pessime foetent et quaecumque tangant, arrodunt. Cacochymia scorbutica fluorem album semper irritat et saepe acriorem reddit. Ea species, quae puri similem materiem sistit, interdum verum pus tantum est, interdum pus cum materia diuersae penitus naturae remistum. Alia est species, cuius materia liquori seminali similis est, at acris et vellicans. Fluor albus chylosus, paullo post pastum inprimis copiosior, lenis est, et sistit chylum ob deprauatam digestionem non rite subactum, inde ad vterum delatum et ibi cum aliis humoribus vitiatis depositum. Eiusdem fere originis atque indolis est lacteus, cuius in ipso corpore



corpore facile oriundam acrimoniam multa documenta probant. Cumque omnes humores corporis, sanguis, bilis, vrina cet. adeo facile acrimoniam contrahant, mirum non est, fluorem album itidem, si in cellulis vteri commoretur, acriorem reddi. Vnde autem differentes adeo characteres diversae eius species acquirant, in capite septimo perpenditur. Secretio, quae in statu naturali fieri debet in vtero, aequae ac reliquae in corpore obviae, certis legibus est subiecta. Quodsi ergo a quacum-  
p. 68.  
que demum causa circulus humorum in eodem impeditus fuerit, humor aquosus, substantiam internam eiusdem irrorans, augetur adeo, ut in sensus incurrat: inde fluor albus aquosus, simplex, benignus, qualis fere in principio esse solet. Subsistentibus aut auctis causis, augetur morbus, excretoria irritantur, relaxantur, liquoribus denique omnis generis deprauatis atque inter se commistis suscipiendis apta redduntur; inde cum primo pars aquosa sanguinis prodiit, succedit postmodum serosa, fibrosa, mucilaginosa, bilis, chylus, lac, sanguis ipse. Docent hoc cadauera feminarum, morbo hoc affecta-  
p. 70.  
rum: et reliquas etiam secretiones iisdem mutationibus obnoxias esse, Cl. Auctor vrinae et bilis exemplis demonstrat. Caput octauum signa floris albi docet, qui et si ab aegris intempestiuo pudore permotis reticetur, satis tamen cognoscitur ex inspectione linteorum et vrinae, quae, durante fluore, sedimentum deponit pituitosum magisque album et crudum, quam in statu sano, aut inhaerentes ostendit flocculos albos et pituitosos. Signa diuersitatis floris albi ex coloribus eiusdem atque effectibus seu symptomatibus depromenda sunt, de quibus igitur caput nonum agit. Si cacochymia illum produxit, totum corpus sensim sensimque debilitatur, cachectium redditur, et, morbo aucto, febris lenta, phthisis

phthisis et plurima alia incommoda accedunt, quae, fluente per pudenda materia, breue solamen acquirunt, quamquam ipso profluuiio semper exasperantur. **p. 81.** Sunt vero et cuilibet parti corporis, cuius vitio ortum debet fluor albus, peculiaria symptomata, eaque pro diuersitate ipsarum partium varia, alia capitis, alia pectoris, alia ventriculi, mesenterii, hepatis, lienis, viarum vrinariarum, vasorum spermaticorum, vteri ipsius, quae omnia formam saepissime mutant. HIPPOCRATES copiose descripsit symptomata et effectus variarum specierum morbi huius, et obseruationes ipsius cum iis, quae nunc fiunt, conueniunt.

**p. 91.** Sectio secunda sistit diuersas morbi nostri relationes, et primum quidem caput de fluore albo haereditario exponit. Generatim disquisitis causis morborum haereditariorum cum in parentibus, tum nutricibus, et a priori, et per experientiam monstratur, fluorem album omnino inter eosdem referri debere: imo ex obseruatione BALLONII idem contagiosus esse potest. **p. 99.** Caput secundum fluorem album cum aliis morbis complicatum sistit. Semper ille symptomaticus est, numquam criticus: morbi autem cum eo complicati vel ex actionibus partium corporis ab eodem vitiatis pendent, vel **p. 105.** tantum epigenomena sunt. Hi vel acuti esse possunt, vel chronici: priores, nisi iam fluida exhausta fuerint et solidorum robur fractum, curationem quidem admittunt, at tardam et difficilem, aequae ac alii morbi acuti facile in cachexiam, marasum, hydropem, phthisin cet. transeunt. **p. 106.** Morbi chronici, fluori albo superuenientes, sponte numquam cessant, artis auxiliis non nisi rarissime cedunt: si subsistant, vterque morbus omnem medelam respuit. Qui ab ipso fluore albo originem ducunt, ple-



plerumque terminantur scirrhis viscerum abdominalium, vlceribus saepe cancris, aliisque funestis accedentibus. Referenda huc etiam est grauiditas, quam aut abortus sequitur, aut fetus languens excipit, qui etsi, quod rarius euenit, emergat, per totam tamen vitam imbecillis est et eandem indolem haereditate in posteros propagat. Rarius etiam statum puerperii incommodis iisque multiplicibus caret. Caput tertium docet, in quo differat fluor albus ab aliis morbis, qui eum mentiuntur; quorum pertinent menstrua mali coloris, pus ex vlceribus vteri promanans, mucus ex haemorrhoidibus vteri et gonorrhoea. Menstrua peruersi coloris dignoscuntur ex ratione ortus ipsorum, periodorum, quas seruant et toto corporis habitu: pendent enim fere ab acrimonia scorbutica. Vlcera matricis vel sunt superficialia, vel degenerant in carcinomaticam indolem: saepius etiam scirrhus verus in vtero haeret. Symptomata scirrhi vel vlceris cancris, pus excretum, interdum saniosum, interdum quoque sanguine remissum, eius mutatio successiua, facile morbum a fluore albo distinguunt. Neque difficilis redditur distinctio, si ambo morbi inter se complicentur. Haemorrhoides nonnumquam circa colum vteri aequae ac circa intestinum rectum oriuntur; has tactus et, deductis genitalibus, ipse visus detegit, et cruor effluens, quem materia mucosa, albicans, albumini ouorum similis, excipit, optime distinguit. Gonorrhoeae feminarum tres sunt spe-  
p. 120.

- p. 126. fidendum non sit, ponenda est distinctio in partibus affectis, quae sunt in gonorrhoea partes pudendae externae, in fluore albo vterus et vagina; in doloribus et symptomatibus eadem ex ratione diuersis; in interuallis, quae in gonorrhoea nulla esse solent, in fluore albo, quam diu situs horizontalis seruetur, adsunt. Interim complicatur interdum morbus et tum alteruter ex signis sibi propriis discernendus est. Glandulas autem, quae sedem gonorrhoeae constituunt, exulcerari posse sola acrimonia humorum, nullo accedente miasmate venereo, observationes docent, quarum vnam memorat Cl. Auctor a se ipso factam. Caput quartum metastases fluoris albi proponit. Theoria metastasium in vniuersum docet, morbos contextus cellulosi plerumque metastasin pati per eundem, vti morbos contra systematis sanguinei per vasa. Cum vero fluoris albi causae in p. 136. vitiis omnium viscerum partiumque corporis haerere possint, ille suppressus, facillime eadem viscera petit, ex quibus ortum prius traxit. Oriuntur inde vlcera partium quam maxime remotarum, tumores, pustulae, purpura scorbutica, totum corpus occupans, vlcera oris, salivae et muci copiosior ad os affluxus: frequentissima autem, vt in omnibus morbis partium generationis, ad pulmones sit metastasis, phthysos aliorumque morborum visceris huius causam praebens.
- p. 143. Sectio tertia causas remotas fluoris albi pertrahat et in primo quidem capite aeris ratio habetur. Si partes nociuae aeris resorptae sunt a corpore nostro, natura easdem expellere intendit: cum autem eam partem deligat, in qua minimam resistantiam p. 146. inuenit, vterum eiusmodi euacuationi praeternaturali facile obnoxium esse, patet. Inde elucescit, cur fluor albus quibusdam in regionibus humidioribus,



bus, v. c. Belgio, endemius morbus sit: epidemicum autem eundem producit tempestatis nimia humiditas, qualis fuit, cuius in actis Wratislauiensibus sub initium huius seculi mentio facta est. Frequentior autem et grauior eius causa in alimentorum peruersa qualitate sita est, de qua caput secundum agit. Ex quo enim, peiore reddita per diluvium orbis terrarum conditione, recesserunt homines a simplici illo prioris aevi victus genere, saeva ista morborum terris incubuit cohors, adiuta inprimis abusu aromatum, quibus solida stimulantur et ad crebriores contractiones fortioresque motus disponuntur, fluidisque ideo damnum infertur. Cibi viscerati morbum nostrum mire fouent, qua in re alia causa posita deprehenditur, cur ille in Belgio adeo frequens sit. Caput tertium abusum diversorum potus generum considerat in genere: quartum vero aquam vitiatam, tamquam causam remotam morbi nostri. Verum quidem est, aquam purissimam nec nutriendis plantis, nec praebendo potui idoneam esse: sed salubritas eius consistit in conuenienti quantitate particularum ei admistarum. Optima ea iudicanda est, quae facile per corpus transit, nec ventriculum grauat. Admixtae particulae heterogeneae saepe medicam eidem virtutem conciliant, saepe eam nociuam reddunt et inter alios effectus etiam coagula et obstructiones humorum efficiunt. Inde apparet, cur aquae Vindobonenses, simplici coctione falsedinem contrahentes, fluoribus albis generandis adeo faueant. Quod si etiam fluor albus non immediate pendeat ab eiusmodi aquis, tamen mediate, corruptis corporis actionibus, ab iisdem proficiscitur. Caput quintum de fictitiis potus generibus exponit. Haec omnia, praecipue spirituosae, solummodo ratione aquae, basin ipsorum constituentis, vtilia censenda sunt. Vi-

num, cuius stimulo consuetudine assueti sumus, nonnisi multa aqua temperatum bibendum est. Accetum eius, teste HOFFMANNO, inter causas maxime sollemnes referri debet, cur fluor albus in Flandria praesertim adeo frequens est. Cereuisia recentior vtero semper infesta est. Quae a spirituum inflammabilium variis generibus damna metuenda sint, facile perspicitur. Coffea neruosum systema irritando affectiones vaporosas et fluorem album producit. Theae abufui morbus iste adscribitur in Germania, Flandria et Aquitania inferiori. Chocolata, adiunctis aromatibus, peior redditur et, incrassando humores destruendoque digestionem, fluori albo ortum praebet, in quo adeo color ipsius, assumpto antea hoc potus genere, obseruatus fuit. Caput sextum excessum motus et vigiliarum, quietis et somni expendit. Motus iusto minor solida relaxat et fluidis lentorem comparat, indeque omnibus morbis inde oriundis fores pandit. Vigiliae modum excedentes, imprimis cum motu vehementiori, vt salutatione cet. coniunctae, ex altera parte sanitati officiunt. Maximum in genere damnum vitam desiderem et otiosam sequitur: neque vllus est morbis, qui ex eadem non scaturire possit. Caput septimum excretionum vitia atque alia accidentia externa, tamquam causas floris albi considerat. Excretionem quaelibet, si a norma naturae recedant, principium morbi sistunt, nisi vel natura ipsas alio modo suppleat, vel damna, ex turbato hoc ordine imminetia, alia ratione praeuertat. Sic feminae, quae serum acre per nares et bronchia excernere consueuerunt, euacuatione hac imminuta vel suppressa, fluori albo obnoxiae sunt. Immoderatum mensium profluuium circulum humorum in infimo ventre turbat, qui ad vterum, locum minime resistentem, delati, vasa eiusdem relaxant et ad suscipien-



piendam perpetuo serosam sanguinis partem, adeo-  
 que ad morbum nostrum, disponunt: idem fit, di-  
 minutis aut suppressis menstribus, ut et post partum  
 laboriosum, abortum aut molam, quod HIPPO-  
 CRATES iam annotavit et posteri semper confir-  
 marunt. Potissimum imprudentior secundinarum  
 extractio funesta huius mali causa frequenter satis  
 existit. Sicut abortum crebrius fluor albus sequi-  
 tur, ita idem vicissim abortus causa satis commu-  
 nis est. Caput octavum affectus animi, ut causam  
 remotam morbi nostri, recenset. Omnes ad duas  
 classes generales redeunt, gaudium nempe ac tristi-  
 tiam. Vterque affectus, si modum excedat, no-  
 cet: morbo vero nostro potissimum tristes affectus  
 fauent, quod solidorum robur minuunt et fluidis  
 lentorem inducunt, cuius peculiare exemplum Cl.  
 Auctor ipse vidit. Caput nonum teneritudinem  
 constitutionum producendo malo huic favere osten-  
 dit. Temperamentorum diuersitas a nutritione et  
 vitae genere pendet. Ex his ergo causis morbo-  
 rum quoque origines deduci oportet. Inprimis ve-  
 ro praematurum coniugium, anteaquam corpus de-  
 bitum robur nactum sit, feminas debilitat et lar-  
 gum morborum fontem subministrat. Latet etiam  
 plurimorum morborum scaturigo in neglecta nutri-  
 tione infantum, cuius negligentiae poenam matres  
 luunt, quod in capite decimo copiose demon-  
 stratur.

Recensitis causis remotis, progredimur ad par-  
 tem secundam totius operis, in qua causarum pro-  
 priorum seu earum, quae non pendent a mutatio-  
 nibus externis, sed in corpore ipso existunt, et im-  
 mediatarum, quae in utero ipso haerent, examen  
 traditur. Hac diuisionis ratione tota pars in duas  
 sectiones dispescitur. Facile vero patet, tantum  
 C 3 hic

hic tradi effectum earum caussarum, quae in parte prima iam commemoratae fuerunt, in varias corporis partes et actiones, et monstrari, quomodo ex iis demum vitia vteri, et speciatim fluor albus, pendean-  
 t. Hinc subsistamus tantum in recensendis capitum seriebus, quo ex iisdem perspiciatur ordo  
 p. 260. tractationis, a Cl. Auctore seruatus. In sectionis prioris capite primo status fluidorum et solidorum in genere consideratur, cum ille a conditione naturali recedere incipit. Caput secundum solida debilia et relaxata et fluida per ipsam vasorum relaxationem nimis attenuata; tertium solida nimis rigida et tensa, et fluida hanc ipsam ob causam nimis condensata; quartum irritabilitatem solidorum; quintum vitia fluidorum; sextum obstructions simplices et compositas; septimum deprauatum corporis vniuersi statum, et sequentia quatuor capita morbos partiales, nempe defluxum ex capite, secretiones consuetas imminutas aut suppressas, morbos pectoris; viscerumque abdominalium, tamquam  
 p. 281. causas propiores floris albi pertractant. Sectio altera in capite primo relaxationem fibrarum vteri, in secundo infarctus, obstructions et humores visceris huius vt causas proximas recenset. Omnia haec obseruationibus cum aliorum, tum ipsius Cl. Auctoris, illustrantur. Vltimum demum caput causam hypotheticam floris albi adfert, quam nuper demum Auctor quidam non ignobilis famae in vasis lacteis vteri posuit, quae sententia parum differt ab ea, quam VIEUSSENIUS sub initium huius seculi, et multo quidem probabiliorem, proposuit.

Tom. II Tomus secundus seu pars tertia totius operis  
 p. I. curationem morbi nostri complectitur. Sectionis primae caput primum docet, medicos solos curare posse



posse illum, quippe quibus indolem eius variam  
causarumque diuersitates cognoscere datur. Ca-  
put secundum media generalia tradit praeuertendi  
et curandi morbum, si aer causa eius remota fue-  
rit. Solum regimen externum non sufficit, sed iun-  
genda ei sunt auxiliorum alia genera. In aere cali- P. 17.  
diori frigida aqua copiose quidem vtendum, sed gra-  
dus frigoris ipsius sollicitè calori interno corporis  
adaptandus est. Summus enim frigoris gradus su-  
bito applicatus nocet: ipsum tamen per gradus au-  
gere omnino conducit. Hoc modo diiudicandae P. 18.  
sunt potiones nitrosae aut, additis acidis vegetabili-  
bus, valentiores redditae. Acida mineralia nonnisi  
cautissime vsurpanda sunt, cum coagula humorum  
semper augeant. Ptisana ex hordeo et emulsionem  
femini nocent, cum calor atmosphaerae iam flui-  
da spissiora reddit. Melius est, sero lactis vti. Ple-  
thora spuria, a calore atmosphaerae inducta et  
morbo nostro mire fauens, demulcentia et leniter  
laxantia postulat: calor humidus cum adeo facile  
putredinem in corpore animali excitet, vsum victus  
animalis prorsus excludit: vtendum tunc est farina-  
ceis, vegetabilibus, acidulis, antiscorbuticis; in  
maiori dissolutionis vel relaxationis gradu pauco vi-  
no, et, additis guttis aliquot spiritus vitrioli, ptisa-  
nae, cui tamen, vbi irritatio maior fuerit aut agryp-  
nia, liquor anodynus HOFFMANNI substituatur.  
Conuenit etiam corticis chinae et cascarillae vsus,  
quibus catechu in effectibus similem se praestitit.  
Neque balsama natina aliena sunt. Frigus atmo-  
sphaerae vasa contrahit et plethoram efficit: incom- P. 26.  
moda, inde metuenda, sanguinis missio et diaeta auer-  
tunt. Vtendum ergo tunc est potu calido emollien-  
te et non nihil aperiente, balneis domesticis cau-  
te adhibendis, victu animalis potius, quam farina-  
ceae indolis, laxantibus parcioribus, quam in prio-

- p. 31. ri atmosphaerae conditione, neque tamen, cum necessaria fuerint, negligendis. Frigus humidum restitutionem toni viscerum, densitatisque fluidorum, euacuationem materiae peregrinae et usum denique roborantium et tonicorum postulant, cum causae fluoris albi sublatae fuerunt. Caput tertium de incommodis, ex abusu alimentorum praecavendis et curandis, agit. Miramur autem, Cl. Auctorem huic capiti inseruisse tractatum de variis causis, quae fetus in utero materno versanti, damnum contrahere possint, et de detrimentis, quae matribus ipsis inde imminet, v. c. de abortu earum, quae fluore albo laborant, de incommodis ex concubitu, instantibus mensstruis, peracto, de iusto pretio, balneis, grauiditatis tempore, statuendo, de
- p. 51. cura morborum puerperarum cet. Tandem ad diaetam puerperarum accedit, et nutritionem infantis recens nati eiusdem tractationi subiungit. Et
- p. 58. ab hoc demum argumento deducitur ad illud, quod fronti capitis inscriptum est, nempe damna ex abusu alimentorum. His demum praestitis, curatio causae proximae suscipienda est, quae suo loco tradetur. Caput quartum potus varia genera eodem, quo in praecedentibus capitibus factum est, modo
- p. 69. expendit. Missis generalioribus, hic tantum notamus, potum in morbo nostro differre debere pro diuersa eiusdem indole; in densitate fluidorum et rigiditate solidorum debet esse copiosus, demulcens, temperans, leniter aperiens; in relaxatione minus copiosus, ex tonicis et aperientibus mitissimis, imo nonnumquam ex adstringentibus lenioribus paratus; in purulento morbi statu detergens et vulnerarius. In noxis, a liquoribus fermentatis inductis, primo ii ipsi moderatius adhibendi, vel, fieri potest, plane vitandi sunt; postea regimine leniori et humectante utendum, et omnia ea in victu fugi



fugienda, quae solida irritare et fluida spissare possunt. Cura lactis hic prae reliquis commendatur. Coffea relaxatas ventriculi fibras roborando interdum proficuum in fluore albo remedium fuit: continuatus tamen usus eiusdem damno numquam caret. Caput quintum de praecauendis et curandis fluoris albi speciebus exponit, quae excessui motus et quietis, somni et vigiliae originem debent. Morbus ab exercitio nimio posuit quietem, demulcentia, temperantia, sedantia, balnea; obstructiones inde inductae eadem remedia leniter aperientia reddi iubent. Praestant vegetabilia remedia mineralibus. Morbus a nimia quiete exercitium moderatum requirit, cuius effectus iuuatur vitando alimenta aquosa, vtendo potionibus aperientibus et tonicis, infusis amaris resoluentibus, decocto radicis chinae cum nitro, pauco vino in prandio, purgantibus ex rheo, aloe, ialappa. Vigiliarum effectus corrigunt et p. 81. praecauent diaeta, regimen, exercitia moderata et euitatio affectuum animi. Si eae prouenerint ab irritatione, siccitate, rigiditate fibrarum, demulcentibus, humectantibus, emollientibus et laxantibus opus est: serum lactis hic egregium usum praestat. Eadem conducunt, si caussa in calore interno latitet; iungenda tamen iis sunt balnea, sedantia nitrosa et praecipue vitriolica, venaesectio in brachio vel pede pro varia indicatione, vesicatoria, euacuantia et praecipue diaeta. Somnus nimius poscit exercitia animi corporisque, aliaque remedia caussae ipsius accommodata. Caput sextum de ex- p. 84. cretionum vitiis ceterisque caussis externis agit. In quauis morbi nostri specie curanda atmosphaerae ratio habenda est, quia nexus eiusdem cum perspiratione adeo insignis est. Dein ad vitia mensium p. 98. progreditur eorumque variis caussis diuersa opponit medicamenta. Fluoris albi, post partum labo-

- riofum exorti, curationem recenset Cl. Auctor, laxante ex cassia, parcissima tartari emetici copia effi-
- p. 110. caciore reddito, et ptisana demulcenti. In capite septimo, quomodo tractandi sint affectus animi, si morbi nostri causa extiterint, docetur. Ac potissimum melancholiae tum taciturnae, cum ferocis mentionem facit, quam sine praegressa visceris cuiusdam labe oriri ex hoc morbo posse, non arbitratur. Commendat hic itinera, sanguinis missiones, demulcentia, balnea, euacuantia, neruina, excepto
- p. 127. opio, roborantia et victum farinaceum. Caput octauum floris albi a temperamentis oriundi curam complectitur. Vbi respicit Noster ad sanguinem, laxitatem vasorum, pituitam, bilis se et excretionem et nonnulla de fluore haereditario albo ad normam diuersae constitutionis solidorum ac
- p. 143. fluidorum addit. In capite nono remedia indicantur, quibus infantes a damnis lactis peruersi nutrimentum liberari possint et quomodo matres non lactantes a fluore albo immunes sint seruandae. Priora quod attinet, vberior eorum tractatio reseruatur recensionem causarum propiorum, alterum autem argumentum amplius pertractatur, et de febre lactea eiusque curatione, purpura puerperarum, apoplexia lactea, doloribus post partum, fluxionibus lacteis pectoris, diarrhoeis, inflammatione vteri, lochiorum vitiis et metastasi lactea disseritur, iisque medendi methodus proponitur.
- p. 211. Sectionis secundae capita exacte respondent capitibus sectionis primae partis secundae, in qua causae propiores fuerunt recensitae. Floris albi in feminis, nondum nuptis duo sunt genera, vnum haereditarium, alterum effectus temperamenti vidi et facillime irritabilis. Vltimum leuatur coniugio, sanatur penitus grauiditate; utroque autem remedio prius genus exacerbat. Eleganter hic pro-



propositam medendi methodum quod attinet, dolemus, nos, qui diutius iam in praecedentibus immorati sumus, nihil hic addere posse.

Progredimur tandem ad sectionem tertiam, quae p. 553. curationem immediatarum caussarum fluoris albi tradit. Caput primum de relaxatione vteri agit, quae a relaxatione totius corporis, vel a causa, in vtero haerente, proficisci potest. In relaxatione chronica, suppuratione quadam orta, conducunt, praemissis detergentibus plantis, balsama naturalia cum camphora coniuncta. Magna autem in curatione opus est cautione, ne imprudenter hic fluor coerceatur fortioribus adstringentibus vno quasi impetu. Suadet propterea Noster principium facere tonicis, siue relaxatio totum corpus, siue vterum tantum tangat, dein lenioribus adstringentibus uti, quibuscum balnea, fomentationes, iniectiones, imprimis ex aquis martialibus, suffimigia, ad acrimoniam temperandam aqua tepida, decoctum hordei seu serum lactis coniungi possunt. Penitus ab iis abstinendum est, si menstrua fluunt.

Caput secundum exponit curationem infarctus, p. 574. obstructionum, tumorum et ulcerum in vtero ut caussarum immediatarum fluoris albi. Morbus is, ab infarctu pituitoso vasorum vteri pendens, curatur ptisanis laxantibus, aquis martialibus iisque iunctis salibus mediis, purgantibus repetitis, iisque interpositis iusculis cum herbis laxantibus et resolventibus coctis, resolventibus ex vegetabili aequae ac minerali regno, millepedibus, extractis amaris, aloe, si menstrua irregularia, parciore vel suppressa fuerint, sin minus, ialappa et diagrydio; quorum remedium usus pro varietate caussarum eligi et exercitatione et regimine iuuari debet. Ex obseruationibus Auctorum patet, scirrhus a partu ortos facilio-

- ciliores curatu, quam qui ab alia quacumque causa prouenerint. In cura canceri in variis corporis
- P. 594.** partibus belladonnae multum tributum est: re autem curatius examinata, perspectum est, ex omnibus allatis aegrarum exemplis nullam vero cancro laborasse, sed tantum infarctu simplici, glandulis induratis, humoribus exiguis et decubitu lacteo; quae ideo incommoda aequae facile aliis remediis vinci potuissent. Similis fere ratio videtur esse cicutae, quae ex ipsius Cl. Auctoris obseruationibus in scirrho prorsus nihil effecit, cancerum autem le-
- P. 596.** niuit quidem, non vero curauit. Ad curam palliativam canceri suadetur ex mente MORGAGNII iniectio lactis, cum opiato remissi. BALLONII consilium, saturnina exterius applicandi, itidem aliqua
- P. 597.** ex parte proficuum inuentum fuit. Respiciendum est, vtrum vlcera vteri proueniant a vitio totius corporis vel visceris cuiusdam, an a solo vtero. In priori casu remediis iam alibi allatis vtendum est, euacuantibus et alterantibus; in altero curatio causae accommodari debet, quae pariter ex iam ad ductis repetenda est. Symptomata remedia parti-
- P. 599.** cularia indicant. BALLONIUS regimen strictum, usum purgantium leniorum, clysmatum emollientium et anodynorum et vegetabilium alterantium suadet, et inprimis serum lactis in mortario plumbeo cum succo vnus vel alterius istorum vegetabilium commistum commendat. Numquam in eorum curatione vulnerariorum et balsamicorum vsus internus negligendus est: cui fini balsama egregie inferuiunt. Laudem etiam merentur aquae minerales saponaceae, tum interne adhibitae, tum in vterum iniectae. Iniectio HOFFMANNI ex balsamicis et aqua vulneraria tum demum locum habere videtur, quum, praegressa cura caussarum, vlcera cicatricem non formant.



III.

L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l'ornithologie, qui traite des oiseaux de terre, de mer et de riviere, tant de nos climats, que des pays étrangers. Ouvrage traduit du Latin du synopsis avium de RAY, augmenté d'un grand nombre de descriptions et de remarques historiques sur le caractère des oiseaux, leur industrie et leurs ruses. Par Mr. SALERNE, Doct. en Médec. à Orleans, Corresp. de l'Acad. Roy. des Scienc. à Paris chez Debure Pere, 1767. 4. mai. 2 Alph. 12. pl. tab. aen. 31.

i. e.

Historia naturalis quoad praecipuam sui partem illustrata; ornithologia, quae de avibus terrestribus marinis et fluviatilibus, tam nostri climatis, quam regionum peregrinarum agit. Opus ex synopsi avium RAYI latina gallice conuersum, pluribusque descriptionibus et animadversionibus historicis de natura et ingenio avium, earum sollertia et astutia augmentum. Auctore Cl. SALERNE M. D.

Exhibet hoc opus, vt iam ex praefixo titulo apparet, historiam avium RAYI, quam versionis Gallicae Auctor vel editor ducentis speciebus ex WILLOUGHBEYO, KLEINIO, GESNERO, LINNAEI Fauna variisque itinerariis collectis, quae apud RAYUM desiderabantur, auxit. Inseruit quoque locis suis aues peregrinarum regionum, quae RAYI libro, appendicis loco, additae erant. Cete-

Ceterum non solum nomina aut exterioris formae descriptiones hic exhibentur, sed vita quoque et natura auium describitur. Systematica LINNAEI nomina, vbique nunc recepta, hic desiderantur, neque Cl. Auctor BRISSONII aliorumque recentiorum scriptis ita vsus esse videtur, quemadmodum debuerat. In tabulis aeneis centum circiter aues delineantur; quae in nonnullis exemplis viuus coloribus distinctae reperiuntur, atque in vniuersum opus hoc ita adornatum est, vt continuatio conchyologiae et lithographiae Cl. D'ARGENVILLE \*) haberi possit. Passim obseruationes variae insertae sunt, quas Auctor Cl. communicatas accepit, a venatoribus aliisque, quibus opportunitas erat, varias aues obseruandi; ex quibus exempli loco quaedam attulisse sufficiat.

- P. 18. Ante plures annos in Gallia auis, nunquam antea ibidem visa, piscibus victitans, occisa est, tantae magnitudinis, vt extremitates alarum octodecim pedes a se inuicem distarent. Dorsum ex nigro, griseo et albo variegatum, abdomen vero coccinei coloris erat. Coniicit Cl. Auctor *vulturem gryphum* LINN. siue *condour*, quae auis in America Australi reperitur, fuisse. Struthio, qui in Guinea aliisque calidioribus regionibus noctu tantum ouis incubat, ad Caput bonae spei die nocteque iis insidet.
- P. 142. *Phasianos tolchicos* non granis tantum, sed et cadaueribus vesci, obseruatio exstat. *Loxiam pyrrhulam* et *fringillam Canariensem* inter se coitu misceri, speciemque hybridam ex hoc coitu nasci, Auctor Cl.
- P. 258. asserit. Quid ars humana in naturali animalium instinctu mutando efficere possit, patet ex historia *fringillae*

\*) L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales la lithologie et la conchyologie. à Paris. 1742. 4. chez de Bure. Conf. Comment. Vol. V. p. 652.



*gillae Canariensis* cuiusdam, quae quotiescunque vocem felis, quam iussu dominae illa edebat, audiuiisset, caueam deseruit, felisque capiti insidens, suauiter cantauit. Anatem feram pullos, volatui nondum idoneos, ex vno loco ad alium transferre confirmatur.

IV.

MARTINI TH. BRUNNICHII rerum naturalium et oeconomicarum in vniuersitate Hafnienſi lectoris publici ichthyologia Maſſilienſis, ſiſtens piſcium deſcriptiones eorumque apud incolas nomina. Accedunt ſpolia maris Adriatici. Hafniae et Lipſiae apud Rothii viduam et Proſt. 1768. 8. pl. 8.

Cl. BRÜNNICHE in itinere, per magnam Europae partem ante aliquos annos inſtituto, Maſſiliae commoratus, piſces, quos ibidem reperire poterat, omnes accurate deſcripſit, nominaque vulgaria, quae lingua Gallo-prouinciali iis dari ſolent, et ab ARTEDI nominibus differunt, addidit.

In praefatione Cl. Auſtor notat: differentiam numeri radiorum ſummam nunquam tres vel quatuor ſuperare in dorfalibus et analibus pinnis; ventrales vix vnquam numero radiorum variare. Addit quoque *ſpari*, *labri* et *percae* genericos characteres, differentes a characteribus, a LINNAEO datis. Inter ipſas ſpecies plures nouae ſunt, quae in Linnaeano ſyſtemate deſiderantur. *Squalum edentulum* p. 6. deſcribit, cuius tamen caput tantum vidit, qualem GUNNERUM Cel. etiam obſeruaffe, alio loco diximus \*). *Syngnathi hippocampi* deſcriptio a Lin. p. 10. naea-

\*) Act. Nidroſ. Vol. III. p. 28. vid. Comment. noſtr. Vol. XVI. p. 674.

- naeana quoque valde differt. Pisce hoc combusto et in puluerem redacto, contra lac mulierum coagulatum, Dalmatiani vtuntur. Noua est *gymnoti* species, quam *acum* vocat, nec non *gadus tricirratus* et *blennoides*, variaeque *gobii*, *spaci*, *labri*, *percae* etc. species.
- p. 85. In spoliis maris Adriatici aliquot amphibia piscesque plures describit, quorum nomina Dalmatiana passim Auctor Cl. addit. Varii quoque noui inter eos sunt, vel nondum accuratius determinati. Adduntur tandem cancri et vermes nonnulli.
- p. 109. Corallium nonnunquam habere rosaceum colorem naturalem, Cl. Auctor confirmat.

V.

Brief van IOHANNES ALBERTUS SCHLOSSER M. D. Medelid van de Koninglyke Maatschappy der Weetenschappen van Londen, aan den zeer eruaarenen en kundigen Heere FERDINAND DE JEAN, oulangsbervemd Stads Heelmeeſter der Stad Batauia, behelzende eene naauwkeurige Beschrijving der Amboinsche Haagdis etc. Amsterdam 1768. sumtibus Auctoris. 4. mai. pl. 8. tab. aen. color. distincta 1.

i. e.

IOHANNIS ALBERTI SCHLOSSER M. D. Soc. Reg. Scient. Lond. Soc. Epistola ad Virum Exper. Perit. FERDINAND DE JEAN, celeberrimum nuper apud Indos vrbis Bataviae Chirurgum publicum ordinarium, de la-certa Amboinensi, nouae plane huius speciei, pulcherrimae et hucusque fere incognitae, accuratam descriptionem ac fidelem a peritis artificibus elaboratam delineationem, aeri incisam sistens.

Cl.



Cl. Auctor, cuius praematuram mortem, quae paullo post editionem huius libelli accidit; omnes boni lugent, epistola hac belgice et latine conscripta, singularem lacertae speciem accurate fusque describit, quam a Cl. DEJEAN, cui haec epistola scripta est, dono accepit. Haec vero species praecipue ideo attentione digna est, quod per eam hiatus, qui inter *lacertam basiliscum* LINNAEI et *lacertam iguanam* EIUSD. in methodo naturali animalium adhuc supererat, hac noua specie impletur. Habet enim ea nonnullos characteres cum utraque specie communes. Incognita fere in hunc usque diem fuit, si obscurum VALENTINI \*) de p. 4. ea locum et rudiorum ad descriptionem paratam figuram exceperis. In sola Amboina reperitur et ut *lacerta iguana* ad ripas fluuiorum habitat, carnemque sapidissimam, carne *iguanae* adhuc praestantiorrem, habet. Notum est, *lacertam basiliscum* LINN. pinnam dorsalem radiatam, *iguanam* vero EIUSD. futuram dorsalem dentatam habere. Huius vero *Amboinensis* speciei, specificum characterem pinna caudalis radiata et futura dorsalis dentata sistunt. Longitudo huius animalis triginta tres pollices circiter aequat. Color in capite et collari viridescens, striis albis diuisus, fuscus in dorso et cauda, griseus in ventre est. Maculis praeterea multis albis corpus vtrimque ornatur.

\*) Vid. VALENTINI *descriptio veteris nouaeque Indiae orientalis* T. III. p. 281 et 282. atque in tabula adiecta litt. I.

VI.

Rariores obseruationes medico practico anatomicae a D. CASPARO M. FORLANI medico, physico ac chirurgo et in Senensi Academia publico philosophiae professore editae. Decas prima. Senis ex typographia Aloysii et Benedicti Bindi. 1769. 8. pl. 7. c. praefat. c. tab. aen. 3.

Quamquam ii, qui faciunt medicinam, eiusmodi libris, qui eodem consilio conscripti sunt, quo Cl. FORLANI hunc, quem iam indicabimus, vulgavit, non sunt destituti, tamen Noster non desperat prorsus de eius vtilitate. Spectat enim hic liber practicam anatomiam, morborumque obseruationes studiose collectas, et cum iis, quas BONNETUS et MORGAGNIUS similes annotauerunt, collatas, in se continet. Offert hic Cl. FORLANI decadem primam harum obseruationum, in quas paullo accuratius inquirere nobis liceat.

P. 17.

Obseruatio prima agit de putrida febre petechiali cum molae excretionem et de vtero bipartito. Femina nimirum annorum circiter triginta quatuor, mater vnus filiae, ante duos abhinc annos natae ac sanae, febribus malignis epidemice grassantibus, febre putrida afficiebatur tum, cum, vti illa aiebat, per tres menses erat grauida. Praeter alia symptomata, his febribus communia, de doloribus in regione vmbilicali conquerebatur aegra anxia et debilis, et sexto morbi die maculae intense rubrae, ad nigrum colorem vergentes, in cute apparebant. Rebus itaque sic se habentibus, praedixit Noster abortum et, diarrhoea, multis cum spasmodis coniuncta, oborta, haemorrhagia narium aliquoties accedente, maculisque citius euanescentibus, et doloribus magis



gis magisque augmentibus praecipue in regione vteri, die nono sanguis e pudendis fluebat, quem noctu mola carnosâ magnitudine oui anserini, multis cum doloribus et largo sanguinis profluvio sequebatur. Aegra vero ita erat debilis, vt decimo quarto morbi, et quarto post abortum die viuere desineret.

Sede morbi huius a Nostro in abdomine posita, p. 24. solum quoque in sectione cadaueris abdomen perquisiuit. Ibi erat ileum intestinum leuiter inflammatum et insigniter tumidum, vterus vero externe consideratus in transuersum vtroque latere magis extensus et adhuc magis in parte sinistra. Vtero transuerse dissecto, circa fundum secundum longitudinem in duas cauitates, intersepti ope a se inuicem separatas, bipartitus reperiiebatur. Interseptum hoc erat eadem fabrica, qua vterus, circa fundum vero crassius et in inferiori parte tenuius vtero, in qua duae hae cauitates in vnam confluebant. Sinistra vteri pars angustior dextra et inflammata erat, vasaque ampliora et crassiora habebat, inque ea parte circa fundum erat mola quaedam eiusdem structurae, ac ea, quae, viua adhuc aegra, expellebatur. Inferior pars fere tota gangraenosa erat circa vteri orificium. Dextra autem vteri pars rugosa, flaccida et laxa et ad totum eius ambitum nimis ampla, in qua Noster filiam, quam antea pepererat, conceptam et nutritam esse arbitratur. Inferior vteri pars, qua confluebant cauitates, valde erat inflammata et gangraenosa, inprimis circa orificii coronam, vbi aequae ac in ipsa vagina sanguis corruptus reperiiebatur.

In secunda obseruatione describitur abdomen in p. 27. signiter tumidum ex struma, in testiculo muliebri nata. Rustica valde laboriosa macilentae constitutionis et mater vndecim liberorum, quae in primo partu vnum infantem, in secundo duos, in tertio ite-

rum duos, in quarto tres magnitudine et sanitate aequales, in quinto rursus duos ac in sexto vnum absque magnis incommodis peperit, in septimo autem molas nonnullas sarcomatosas diuersae magnitudinis, quarum quaedam fluido viscidiori erant impletae, edidit. Bene sese habuit nihilominus vsque ad quadragesimum tertium aetatis annum, vbi catamenia, a decimo iam quarto anno rite succedentia, parcius ac tenuius fluere coeperunt, corporisque eiusdem emaciatio augebatur et sensus tumoris, huc illuc in abdomine vagantis, percipiebatur. Abhinc menstrua prorsus cessabant et tumor abdominis cum pedum varicibus atque oedemate, aluina siccitate et vrina parciore, dyspnoea, magis magisque ita crescebat, vt abdominis ambitum naturalem plus dimidio excederet, et miliares herpeticae circa vmbilicum, ex quibus continuo serum quoddam emanabat, conspiciebantur. Hanc miseram vitam transegit aegra per quatuor annos, variis interea frustra adhibitis remediis, et tandem summe emaciata, mente tamen integra aprili 1766 obiit.

p. 35.

Antequam itaque sectio cadaueris instituebatur, mensura abdominis, quae erat supra tertiae partis eiusdem totius corporis extensionem, est explorata. Tum abdomine aperto, peritoneum valde extensum et crassum reperiiebatur. Introsipientibus itaque peritoneum, apparebat tumor, communi circumdatus tunica, totum propemodum abdomen occupans cumque variis partibus in abdomine contentis e. c. omento, colo, tuba Fallopiana etc., arcte connexus, cuius inferior pars in regione vmbilicali firmiter affixa erat, et multis folliculis paruis externe circumcinctus. Quo horizontaliter discisso, multi parui folliculi, et materiei, in se continentis, varietate et fabricae diuersitate a se inuicem distincti, ex quibus tota interna tumoris compages conficiebatur,



tur, reperiiebantur. Ampla ac superior cauitas huius tumoris insuper materia sebacea granosa ac virulenta ad pondus circiter quadraginta librarum, erat impleta. Vterus vero cum eius vagina nihil habebat praeternaturale, exceptis iis, quae tales graviditates sequi oportet, et paruulis hydatidibus, fimbriis dextrae tubae et rotundo ligamento sinistrae partis inhaerentibus. In eadem parte tandem muliebris testiculus plane deerat, alter vero sanus et integer spectabatur, excepta quadam eiusdem scirrhotitate. Hic vero tumor seu potius struma, vti appellat Noster, vtrum ad ouarium, an ad glandulas lumbales seu mesocoli aut mesenterii pertineat, non satis intelligit, arbitratur tamen, ad muliebrem testiculum partim ob vnius scirrhotitatem, partim propter summam alterius abolitionem esse potius hunc tumorem referendum, hancque suam sententiam, aliis doctorum virorum obseruationibus, tumores ouarii spectantibus, laudatis, probat. In tabulis aeneis additis tumoris huius icones spectantur.

Agitur in tertia obseruatione de catharro suffo-  
catio ob nimiam tracheae angustiam, bronchialibus glandulis scirrhotis redditis, in puella tredecim annorum post mortem detectam. p. 45.

Vehementissimus capitis dolor cum frigoris sen-  
su in muliere ob tumorem folliculatum in ventriculo sinistro cerebri in quarta describitur obseruatione. Mulier robusta, mater quatuor filiorum a vigesimo quinto aetatis anno semper grauem capitis dolorem cum frigoris sensu propemodum continuo percipiebat, cui accedebant deliria sine febre, hystericae passionis interdum atque conuulsiones inprimis in dextra corporis parte. Quibus quidem, venaesectio-  
nis et antispasmodicorum ope, sopitis, iterum ad se redibat et, etiamsi haec inter grauiditatem accidebant, nihilominus tamen fetum sanum et debito

tempore peperit. Tandem vero, cessantibus menstruis, trigesimo sexto aetatis anno, et convulsionibus, semper in dextra parte corporis adhuc conspicuis, auctis, cum delirio ferino, alui segnitie, abdominis tensione sitique inexstinguibili coniunctis, aegra trigesimo nono aetatis anno vitam cum morte commutavit.

**P. 52.** Sectione cadaueris instituta, caput primum est disquisitum. Calua remota, praeter vasa varicosa et varia pisiformia tubercula in durae matris superficie externa, toto cerebro horizontaliter discisso, in ventriculo sinistro tumor folliculatus, materia glutinosa flavescente, albumini ouorum non absimili repleta, apparebat, quo rupto ob flacciditatem a compressione cerebri, totum ventriculum materia haec occupabat.

**P. 58.** In quinta obseruatione peripneumonia vna cum cordis inflammatione, ob scabiem caninam imprudenter retropulsam, traditur. Mortuo secundo die morbi aegro, sectio cadaueris instituebatur, vbi, tumoribus abdominis externis et internis animaduersis, thorax aperiebatur et pulmo sinister plane inflammatus deprehendebatur et in dextra parte feri flauī librae sex in pleura erant. Pericardio dissecto, cor mole auctum materia mucoso flavescente, purulenta coopertum atque inflammatum erat.

**P. 65.** In sexta obseruatione haemoptysis cum cordis palpitatione per nimiam dilatationem dextri cordis ac venae cauae consideratur. Vir admodum robustus quinquaginta annorum de cordis palpitatione per quatuor annos conquerebatur, quibus succedebant haemoptysis et fluxus haemorrhoidalis. His morbis feliciter superatis, duobus annis post in anasarcam incidebat, qua quoque, idoneis remediis adhibitis, liberatus, iterum palpitationem cordis et haemoptysin experiebatur tantam, vt, cachexia vniuersali



versali corpori inducta, febre lenta ei esset moriendum.

Thorace aperto, serum copiosum et admodum p. 67. flavescentius eius ambas quidem, praecipue tamen dextram occupabat cavitates. Cor laxum tenuibusque praeditum fibris deprehendebatur, cuius dexter ventriculus et auricula cum sinu venae cauae erant ampliora. Vbi sanguinis grumi propemodum circulares detegebantur, qui sanguinem solutum et ad nigredinem vergentem atque hydatides continebant. Valuulae semilunares et tricuspidales erant prolongatae, quarum semilunarium vni media in parte adhaerebat tumor folliculatus nucis auellanae magnitudine et sebacea materia repletus. In parte sinistra vlcus pulmonum spectabatur. Praeter alia, in abdomine deprehensa, ventriculus plus dimidia parte amplior erat et venae portae magnitudo aequabat propemodum venae cauae magnitudinem, cuius propagines varicosae reperiiebantur.

Similem propemodum morbum offert obseruat. p. 72. tio septima, vbi cordis palpitatio ex imprudenter sedato fluxu haemorrhoidali et nimia cordis dextri vna cum venae cauae sinu dilatatio deprehendebantur. Vir quadraginta annorum ex retropressis haemorrhoidibus alias rite periodicis, per in et externum vitrioli spiritus usum, in asthma, tussim, lumborum dolores, appetitus prostrationem et cordis palpitationes incidebat, quibus succubuit.

Aqua in ambabus thoracis cavitatibus effusa et p. 75. pulmones mucosa materia, in aqua feruenti non solubili, sed fundum petente, et in igne foetidissima cooperti erant. Pericardium nimis amplum sero impletum erat flavescente. Cor dextrum et auricula cum sinu venae cauae duplo erant maiora. Ceterum musculorum magna deprehendebatur flacciditas.

p. 82.

In octava obseruatione narratur exemplum febris continuæ putridæ, in virgine cum pudendorum gangraena et sphacelo superueniente, feliciter curatæ. Virgo annorum decem quatuor, paludosas aquas ad sanguifugas capiendas sæpe petens, putrida afficiebatur febre. Praeter exanthemata parotides suppurabantur intereaque labia pudendorum tumida atque inflammata paullo post nigra apparebant, ita, vt tota externa labia cum nymphis deciderent, et firma formaretur cicatrix plana ac distincta a perinaeo, pristina aegrae recuperata sanitate. Auget hoc exemplum ideo nostram admirationem, quod Cl. Auctor simplicissimo medendi methodo vsus est et haec omnia solummodo praestitit vis vitae. Graui profecto autem hoc morbo superato et per duos annos floridæ sanitati restituta aegra, denuo morbum inflammatorium experiebatur, quo, inflammatis tenuibus intestinis, peribat.

p. 91.

Nona obseruatio spectat vteri exulcerationem cum diris conuulsionibus. Femina quinquaginta octo annorum conquerebatur de molestissimis abdominis doloribus cum tympanitide, conuulsionibus hysteriis, fluxu puris ex pudendis, ponderis sensu in pelui continuo et febre, tertio et aliquoties quinto superueniente die, coniunctis, et summe emaciata diem supremum obiit.

p. 94.

Cum sedem morbi in abdomine esse a Nostro intelligeretur, id quoque solummodo in sectione cadaveris ab eo considerabatur. Omentum erat exulceratum et consumtum. Glandulae mesaraicae et pancreas erant scirrhusae et hepar mole auctum. Ambobus vero testiculis muliebribus triplo maioribus, tactu inaequalibus, discissis, omnia ouula materia glutinosa alba, fere gypsea, repleti et tres in dextra parte hydatides inueniebantur. Vtero, naturalem magnitudinem habente, discisso secundum eius longitudinem, circa eius ceruicem foedum vlcus,



cus, totam internam occupans superficiem, non vero cum vagina continuum detegebatur, vere carcinomaticum maculisque gangraenosis circumdatum.

Finem harum observationum facit exemplum p. 98. mulieris octogenariae, vitae necessitatibus destitutae, macilentae et imbecillae, victu exili sese sustentantis, quae ex solo virium defectu mortua videbatur. Cum eius cadauer in theatrum anatomicum deferretur ad disquirendas ac praeparandas partes genitales, detegebant in hanc rem inquirentes in ouario dextro et in media propemodum eius parte inaequalem tumorem, externe albicantem, subdurum, anserino ovo maiorem, cum folliculo tenaciori et hinc inde in cartilagineam abiente duritiem. Quo dissecto, ille repletus erat glutinosa materia seu potius vinctuosa, granosa, albescente, in aqua communi facile solubili, in feruente adhuc facilius, nec foetida. In huius folliculi media parte tumor ex pilis quasi, in glomerem coactis conspiciebatur, quem tabula tertia figura secunda Cl. Auctor sistit. Hac re excitatus studiosius Noster, in vitam eius ante actam inquirens, expertus est: sese debita agente aetate et iusto corporis robore acquisito, nuptias celebrasse et per duodecim annorum duos tantummodo filios peperisse, constantique interea fruitam esse sanitate; tum, marito mortuo, secunda vice eam iniisse matrimonium, sine prole tamen, hystericas conuulsiones dirissimas passam et victu prauo fuisse usam; porro decem et septem annis praeterlapsis et hunc maritum decessisse, ex quo tempore solam vixisse usque ad mortem, saepeque morbo arthritico laborasse et defectu victus esse pressam.

Arbitratur Noster, ex hoc exemplo satis clare patere id, quod et alii iam defenderunt, animi perturbationes et victum non conuenientem, ac inprimis farinosum et pultaceum, huic morbo suppeditare posse occasionem.

VII.

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar,  
För År 1768. Vol. XXIX. Med. Kongl. Aca-  
demiens Tilstånd. Stockholm. Tryckte  
hos Directeuren Lars Saluius, På des's egen  
kostnad, 1768. 8. mai. Alph. I. pl. I. tab.  
aen. 9.

h. e.

Acta Academ. reg. soc. Suecicae anni 1768.  
Vol. 29.

*Trimestre primum.*

- P. 3. I. *Historiam Tourmalini*, quam in actis 1766\*)  
inchoauerat, continuat IO. CAR. WILKE. Gem-  
mas, quibus vsus est, describit, modumque experi-  
menta instituendi. Cur calore excitentur in oppo-  
sitis lapidis partibus (polos vocat, ad imitationem  
magnetis) electricitates oppositae, et illarum quae-  
vis, dum refrigeratur lapis, in oppositam abeat, hy-  
pothesi sequenti rationem reddi aliquatenus posse  
credit. Cogitetur lapis, plenus copiosa materia  
electrica, quam fortiter attrahat et retineat, vnum  
autem latus lapidis, calore et frigore vehementius  
statuatur affici altero, hoc est, vehementius extendi  
aut contrahi, ita in canalibus lapidis materia electri-  
ca, mox ad vnum latus magis, mox ad alterum co-  
getur, orieturque excessus aut defectus negatiuus,  
quod praecipuum est in explicandis electricitatibus  
contrariis ex FRANKLINI theoria. Eamdem  
coniecturam atmosphaerae applicat. Huius strata  
elastica, si a sole diuersis modis incalescant, et ex-  
tendantur, electricam materiam, quam continent,  
mox huc, mox illuc pellent, ita electrica vis, primum  
in

\*) v. Comment. nostr. Vol. XV. p. 583.



in sicco aëre excitatur, eam vero attrahant nubes, donec aequilibrium restitatur.

2. CAR. A LINNE *describit animal Brasiliense*, p. 26. quod in *syst. nat.* EIUSD. mus aguti appellatur. Viuum habuit, omnino simile iconi, quem Cl. CATESBY carol. Vol. 3. tab. 18. leporem Iauensem appellat; nisi, quod rubri coloris non sit. Patriam falsam Cl. CATESBY tradidit. Pedum anteriorum digiti sunt quatuor, posteriorum tres, hi sine digito. MARGGRAVIUS posterioribus sex digitos tribuit; qui animal descripsit in historia naturali cum descriptione Gazophylacii Regis Galliae Tab. VIII. anterioribus quinque, vtrique falso.

3. *Experimenta de piscium coloniis lacubus mediterraneis introducendis*, edit TIBURZ TIBURTIUS. p. 30. Oua foeta inferere parum prodest, cum aerem non tolerant, succussibus vecturae comminuantur, piscibus et insectis, in lacu iam reperiundis, in escam cedant. Viui autem pisces hyeme facile transuehi possunt, illi ergo lacui iniekti, post se multiplicant. Videndum vero est, quae, pro quouis piscium genere nutriendo, in lacu reperiantur: non enim omnes pisces eadem esca delectari, vel iis, qui arundine piscantur, notum est. Ita lucius et perca intactas relinquunt hirudines; quae ideo in lacubus, vbi hi pisces habitant, insigniter multiplicantur, vt iis in locis anates aut anseres educari non possint; pullis enim, lacui innatantibus, adhaerent hirudines, illisque sanguinem exfugunt. Sed carassii, rutili, bramae hirudinibus vescuntur.

4. *In proportionem remorum*, inprimis qui in tri- p. 40. remibus adhibentur, inquit FRID. CHAPMANN. Triremium regiorum architectus.

5. Gem-

p. 55.

5. *Gemmas igne examinat* BENED. ANDERSON QUIST; director et furnorum, quibus metalla liquantur, praefectus. (*Ober-Hüttenmeister*). Gemmas, ut physici solent, ad filices refert. Specimen, quomodo eas tractauerit, det adamas. Is absque additamento non fluit in igne, quem excitare possumus, vehementissimo, neque illum gradum caloris recipit, quem *weiß glühen*, vocant. In puluerem subtilem redactus, obscure griseus est, fere niger, eundem colorem et post vstionem retinet. Cum borace pulvis adamantis mox abit in vitrum album compactum, simile ei, quod fit, adhibita calce stanni. Ulterius vero agitatum igne vehementi, fit semipellucidum, ad modum porcellanae. Eum effectum praebet paucillum pulueris adamantis, maiori boracis copiae admixtum. Vehementius ignitum vitrum magis pellucet, in pellucido boracis vitro sparsae spectantur particulae exiguae albae opacae, quae longo et vehemente igne ipsae funduntur, et exhibent vitrum omnino pellucidum, omni colore orbem, densum, quod eo magis fit fusibile, pellucidum, purum, quo magis igne vrgetur. In igne vehemente videtur adamas attrahi a borace, quoniam multum pulueris adamantis addi potest boraci, et cum eo in vitrum pellucidum fundi. Pulvis adamantis, in oleo vitrioli coctus, nihil mutatus visus est, sed omnia, quae ante diximus, phaenomena exhibet. Simili modo alias gemmas, quam plurimas examinat, quibus experimentis, quo pluris constant, et quo rariora sunt, eo magis naturae scrutatores sibi Noster deuinxit. Subiicit plurimarum gemmarum grauitates specificas.

p. 76.

6. *In paroeciis Lapponiae Quickjock et Iockmok*, quibus diebus semen frumenti terrae creditum fuerit, quibus ad messem maturuerit, quando, a niue liqua-



liquata, flumina intumuerint, quamprimum glacies lacus maiores obduxerit, obseruationes annorum 1750 – 1766 edit IONAS HOLSTEN. Past. loc. Spissiori glacie lacus obducuntur, cum, ingruente p. 82. gelu, parum ningit. Glacies nata, si mox tegatur profunda niue, tenuior manet. Vehementi frigore, accenso igne sub dio, prope ignem pluuia subtilior animaduertitur, paulo remotius ab igne, vera nix cadit, etsi ceterum non ningat.

7. *Ad parcendum sumtibus in focus, ubi ferrum in prismata vel laminas elaboratur, consilium edit* LEONH. P. 82. MAGN. UGGLA. Eo redit, vt formae, quam vocant, pars ex ferro fiat, non integra, vt hucusque factum est ex cupro.

8. *Probat consilium* SWEN RINMANN, si fa- p. 84. bri idonei formae ita perficiendae adsunt.

9. *Quae praeternaturalia in arteriis quibusdam, p. 85. cordi propinquis, viderit, enarrat* ADOLPH. MURRAY. In aortae adscendentis distributione haec p. 89. animaduertit: I. arcus non proprie curuatura continua flectebatur, sed magis in angulum obtusum. II. Ex hoc arcu primum sola nascebatur carotis dextra, deinde carotis et subclauia sinistra, non vero subclauia dextra. Carotis dextra obliquius super arteriam asperam iacebat, quam alias solet arteria innominata. Carotis sinistra multum distabat ab arteria aspera. Subclauiae sinistrae situs erat naturalis. III. Postquam aorta ascendens in descendentem abiebat, exhibat ex ea, ad quartam vertebrae dorsae, subclauia dextra, paululum minor, quam solet esse. Arteria sub oesophago et aspera arteria oblique superius tendebat ad clauiculam, per scalenum primum itura ad brachium. Arteriae vix longitudo polli-

pollicis apparebat infra clauiculam, antequam musculum transiret, cum alias fere quatuor pollices infra clauiculam reperiantur. Ex arteria hac rami nascebantur non nisi sequentes. 1) duo intercostales inferiores in latere sinistro, prodeuntes ex arteria statim, cum ex aorta exiisset, illi sequebantur marginem inferiorem costae cuiusvis, more solito. 2) ceruicales, quarum vna saltem hic reperiiebatur, quae diuidebatur in ramos duos, quorum vnus fiebat ceruicalis profunda, alter transuersalis colli, transuersalis scapularis prodibat ex axillari. 3) intercostalis superior. 4) thyrioidea inferior. Vltimae duae arteriae, more consueto, se distribuebant.

P. 90. IV. Arteria axillaris, postquam octo lineas processerat, exhibat ex ea mammaria interna, incuruans se circa costam primam, vt more consueto progrediretur. V. Vertebralis exhibat ex carotidis latere posteriore, per foramen transversum quartae vertebrae colli, ascendens ad cranium. Vsum huius observationis eum addit Noster, vt cauti esse discant, qui de lethalitate vulnerum renunciant, huic enim subiecto vulnus ad extremitatem sternalem clauiculae, nisi arterias offendisset, non adeo absolute lethale fuisset, ac corpori, in quo arteriae sunt in situ naturali. Brachium dextrum eius, in quo haec visa sunt, coniici potest deterius nutritum esse a sanguine, quod, vt eo perueniret, longiore via opus habebat. Videbantur etiam brachium dextrum minus, et ad id pertinentes musculi tenuiores, quam quae respondebant in latere sinistro. Forte etiam, dum cibi deglutiebantur, subclauia, adhaerens oesophago, ope tunicae cellulosaе, compressa est, sicque circulus sanguinis turbatus.

P. 93. 10. *Experimenta de usu electricitatis in variis morbis sanandis* GUSTAVI FRID. HIORTBERG, M.D.



M. D. in compendio eduntur. Nuda fere nomina morborum recensentur et qui a singulis his morbis sanati sint. In rheumatismis Noster frequenter hac methodo usus est. Parti adfectae, ope syringae, impetu quodam aquam frigidam, deinde ibidem electricitatem applicuit, unde pars ea incaluit. Interdum et syringae loco, lintea madida adhibuit. Aquam hausit ex fonte, qui in medio loci paludosi oritur: eius loci lutum, dum manibus fricatur, paululum picis olere videtur; aquae nullus est sapor aut odor, nec mutatura saccharo saturni, gallis, syrupo violarum.

*Trimestre secundum.*

1. *Reliqua de tourmalino edit* IO. CAR. WILKE. p. 97. Experimenta, nota eius sagacitate, instituta sunt et leges saltem operandi detectae, etsi de causis parum adhuc sciamus. Id vero doctum se credit experimentis, tourmalinum, calore et frigore, item tactu corporum, vim electricam adducentium aut abducentium, in eum statum deduci, in quo est vitrum, vi electrica plenum, antequam in succussum Muschenbroekianum erumpat, *geladen* vocant. Hinc pleraque phaenomena explicantur.

2. *Observationes de funibus maioribus, quorum in nauibus usus est, faciendis edit* NIC. PSILANDERSCHILD, Admiralis, Eques ordinis Regii ensis. Plura hic habentur egregia, ad praxin nauticam facientia. Bitumine illitos funes, cum in futuros usus reponuntur, citius perire illis, qui bitumine non sunt illiti, experientia edoctus est, unde suadet, bitumine tunc demum eos illini, cum ad usum adhibentur.

3. *Argillam albam Smolandicam describit* P. H. R. p. 125. ADR. GADD, Prof. Chem. Oboens. Arenam subtilissimam

- liffimam continet, cum acido vitriolico alumen prae-  
bet, ipsa vero ad alumen depurandum utilis est. No-  
men ei, vtpote nondum descriptae, dat Noster: ar-  
gilla lactea, leptamnosa, farinacea, siticulosa, maculans.
- p. 133.
- p. 134. 4. *Observationes anatomicas occasione cadaueris grauidae* edit ROL. MARTIN, Anat. et Chir. Prof. Cadauer solis inquisitionibus angiologicis destinabatur; iniecta vero cera, vt moris est, per aortam, ventrem leuiter tumere animaduersum est, eoque dissecto, vterus, quantum ex magnitudine fetus col-
- p. 136. ligi poterat, mense quinto grauidus. Illo igitur, cum iis, quae ad genitalia pertinent, exemto, incisione in eius latus posterius facta, vbi adhaerebat placenta, rami arteriarum in interna vteri superficie, pluribus in locis, vsque ad placentam, cera repleta erant, in-
- p. 137. dicio, arterias immediate inferi vasis placentae et circulum, inter fetum ac vterum, immediate fieri per vasa sanguifera, adeo aperta, vt hic ceram reciperent, non eo consilio iniectam, vt ad ipsa penetraret, imo vi, tam moderata actam, vt nihil eius in ramificationes coeliacae veniret, quae supra peluim in partes, circa ventriculum fitas, abeunt, illa vero
- p. 136. vteri vasa, in statu grauiditatis, ampliora sunt. Fetus dorso conuexo iacebat versus sinistram, anteriore parte corporis caua versus dextram, in cauitate siti erant artus et funiculus vmbilicalis; caput ad ceruicem vteri, versus orificium. Hinc credit Noster, refelli eos, qui, vltimo mense, inuerti fetum credant, vt tunc demum caput versus inferiora cadat. Nam et in aliis cadaueribus grauidarum et in abortu, caput inferius vidit, quod suadet etiam praecipuum eius pondus, quo in fluido descendit.
- p. 139.
- p. 140. 5. *Vierram Naricam* describit CAR. A LINNE. Nominatur syst. nat. ed. XII tom. I. p. 64. n. 3. Animal



mal Americae australis nemo adhuc plenius descripsit. Hic et icon exhibetur. Parum differt a viuerra sua, vt vel res ad discrimen sexus redire possit.

6. *Duas alias observationes ex historia naturali* ad-p. 146.  
dit CAR. A LINNE. 1) Simiam oedipum describit, quam viuam habuit; minima est generis sui vix maior ratto. 2) Rex Sueciae Nostro ostendit *gordium* Medinensem viuum, Gothenburgi repertum, crassitudine fili crassioris, pallidum, dimidiam vlnam longum. Mirum est animal in Suecia reperiri.

7. *Problema ad geometriam pertinens* soluit Ba-p. 147.  
TO FRID. PALMQUIST, quando trianguli latus minima quantitate varietur, variato angulo opposito.

8. *De piscinis struendis* Academia quaesiuerat.p. 166.  
Ex responsionibus, quas quatuor oeconomi ipsi exhibuerunt, hic excerpta eduntur, auctore KNU T-BERG.

9. *Animal filamenti ope maiori adhaerens et ita vi-* p. 176.  
*uens*, describit CAR. DE GEER. Acari sunt minimi, fili ope insidentes insecto maiori, vt staphylino, septurae; itaque hoc modo nutrimentum ex illo surgentes. Neque singuli immediate insecto adhaerent, sed vnus filum alteri inseritur, vltimi insecto, fili ope; ita oportet eos nutriri, vt fetus nutritur ope vniculi vmbilicalis. Relinquunt etiam filum et quaquauerfum repunt, sed sine terra humida non viuunt; spiritum vini fortem satis diu tolerant.

10) *Dormientes minus calere* ostendit ANTON p. 184.  
COL. MARTIN. Ex multis obseruationibus, quibus edoctus est, quasdam adfert. Calorem partium externarum thermometro applicato, exponit, vt in  
*Tom. XVII. Pars I.* E iis,

- iis, quae edidit in commentariis 1766; 1767 horum
- p. 185.** specimen dabimus: quadragenarius, post motum vehementem, ad somnum se componens ita calebat: manus gradibus 37; spatium sub axillis 37; pectus 36; abdomen 35; flexura genu 35; planta pedis 32. Post somnum 8 horarum euigilans manus, spatii sub axillis, pectoris, abdominis et genu calor, singulorum gradu vno decreuerat. Antequam obdormisceret, arteriae pulsus 70 numerabantur sexagesima prima; sed cum euigilasset nonnisi 60. Dormiens sexagesima prima 14 aut 15 vicibus respirauit, euigilans 20
- p. 186.** vicibus. Calor loci erat graduum 20. Ex his et similibus constat, dormientium calorem minorem esse, restitui vero mox, postquam euigilarunt, ad pristinam quantitatem. Haec valent saltem de calore exteriori, quem thermometer indicat, vrina 36 vel 37 gradibus calet ante et post somnum, ut internus constans videatur. Ex quibusdam observationibus, imprimis infantum, colligit, durante somno, calorem ex peripheria interiora versus cogi, dum euigilamus, exteriora versus propelli. Differunt tamen somnus quietus et inquietus, inter somnum et vigiliam
- p. 187.** dius. Infantes, dum ex somno inquieto euigilant, rubentibus genis, plorantes aliquot gradibus magis incaluerunt; sed quiete dormientes refrigerari, colligitur ex pulsu et respiratione; pulsus, antequam obdormierant, sexagesima fiunt 100 aut 105; dormientium triennium aut quinquennium non fiunt nisi 85 aut 90, sed statim, postquam euigilarunt, idem numerus pulsuum redit. Respirant infantes non velocius quam adulti; triennes aut quinquennes, quam tricenarii aut quadragenarii; scilicet in sexagesima 15 aut 16 vicibus dormientes; 20, 22, 23 vicibus euigilantes. Vnde colligit Noster, infantes non magis calere adultis, nam, sanorum calorem externum non superare 36 aut 37 gradus, reperit, cui respondere inter-



internum, vrina docuit; tantus etiam est sub axillis et ad vmbilicum adutorum, si motum susceperint, calida biberint, calide vestiti fuerint; quietus vero, et minus tectus vestibus, supra vmbilicum gradibus 36 calens, febrim indicat, quod et in aegro, variolis laborante, Noster obseruauit. Ceterum alii externe magis calent, alii interne, potest tamen summa caloris vtrinque esse eadem.

II. *Sinenses quomodo, vt oua excludantur, obtineant*, describit CAR. GUST. EKEBERG. Sepis genus, viminibus densis, textum constringitur, ei oua in corbibus induntur, tegitur sepes, et, carbonibus extus admotis, calefit. p. 188.

*Trimestre tertium.*

I. *Inclinationes acus magneticae, in tabula ad leges earum, quas hydrographicas vocant, delineatas*, exhibet IO. CAR. WILKE. Adhibuit, praeter obseruationes antiquiores, recentissimas Cl. DE LA CAILLE et EKEBERG. Historiam eorum, quae circa inclinationem acta sunt, exponit, et cum plus ordinis, quam hucusque creditum est, inclinationibus acus repperit, hanc, quae hucusque fere neglecta iacuit, inuestigationem commendat, vt quae plurimum faciat, non saltim ad naturae cognitionem, sed ad ipsam artem nauticam. p. 194.

2. *Suas inclinationis acus magneticae obseruationes*, p. 225. edit CAR. GUSTAV. EKEBERG.

3. *Sectionem caesaream in femina nana peractam*, p. 229 describit HERM. SCHUTZER, Archiater reg. Femina 30 annorum erat aliquot iam dies vehementibus parturiendi doloribus vexata; cum eam exami-

naret Noster, fetus anum versus sinistram, caput versus spinam dextram ossis pubis reperit, membranis ob dolores ruptis, liquores iam profluxerant, vteri orificium angustissimum erat, spatium inter os coccygis et os pubis adeo exiguum, vt, summo labore, duo digiti vix possent introduci, peluisque tota tam angusta, vt per eam exire, aut educi infans nullo modo posset. Itaque decreta est sectio caesarea, suadentibus et adstantibus pluribus medicis. Posita parturiente in situm horizontalem, eleuatis integumentis communibus in latere sinistro abdominis quatuor digitos transuersos ab vmbilico, dissecta illa sunt, incisio, suspensa manu, profundius acta, per musculos obliquum et transuersum item peritoneum; cum sentiret Noster, penetrasse se in cauum abdominis, indice sinistro in aperturam immisso, cauit, ne, illam continuando, intestina laederentur, illam vero ad longitudinem quarta vlnae parte maiorem produxit vsque ad digitum transuersum ab osse pubis. Partem intestinorum prodeuntem, vnus adstantium retinuit et operuit, tunc autem vterus apparuit, in quo aperiendo summa cura vsus est Noster, ne, quoniam

**p. 231.** iam effluerant liquores, fetus laederetur. Cum in conspectum prodiret punctulum album, ex quo profluerent guttulae liquoris clari, intellectum est, penetrasse incisionem per omnem vteri crassitiem. Haec igitur apertura, ipsi in abdomine fere aequalis, facta est, rursus, ne quid laederetur, cauente indice sinistro, apparuit fetus, situ ante dicto, cuius partibus labia vulneris vteri ita adhaerebant, vt vix manus ad eximendum inferere posset. Puella erat, matri similis, artubus curuis, praegrandi capite. Cl. ACREL funiculum vmbilicalem ligauit, quod cum fieret, primam vocem mater emisit, de sexu quaerens, ante, incomparabili constantia et patientia, ne sonum quidem exire passa est. Exemtis secundinis et sanguine coagulato,



coagulato, Cl. ACREL gastroraphiam fecit et, p. 231.  
obligato vulnere, aegra in lectum reposita, laetum  
testata animum. Sanguinis iacturam passa erat non  
maiores, quam solet contingere feliciter parienti-  
bus. Medicamenta idonea data sunt, et dietam ut  
exacte observaret, suavitatem feminae temperamenti  
valde sanguinei. Bene dormiuit et nihil quiescit  
die sequente; pulsus etiam naturalis fuit, venter pau-  
latim intumuit, mollis tamen. Vespere bene se ha- p. 233.  
buit, nec non sequente die. Utile applicatum est  
clyisma ex lacte, oleo et saccharo. Cum esuriret, pa-  
nem tostum iussa est immergere aquae, cuius quatuor  
partibus adfusa erat pars una vini. Venter detumuit.  
Nocte inter diem tertiam et quartam, cum accede-  
ret febris suppuratoria et lactea, idonea medicamenta  
propinata sunt, meridie sudare coepit, capitis dolores  
cessabant, pulsus vehementia decreuerat, et omnia  
spem optimam faciebant; sed cum madere sentiret  
vestes et linteum lecti, matre auxilium praebente,  
alias vestes induit, imo e lecto descendens et sellae  
insidens lecto aliud linteum imposuit. Quae omnia  
quam parum calida fuerint, colligi potest ex eo, quod  
haec peracta sint quadrante horae, paulo ante, quam  
femina adueniret, quae aegrae curam habere debe-  
bat, illorum, quae gesta essent, ignara. Mane se-  
quenti vehemens diarrhoea coepit, nullis remediis  
cohibenda, quae, cum diem et noctem durasset, aegra  
morta est, procul dubio ea sua culpa. Sed et pul-  
tem puro vino Rhenano immerfisse, imo vinum post  
bibisse, femina, quae eius curam habebat, narrauit.  
Cum aperiretur cadauer, venter repertus est paulu- p. 234.  
lum tumidus, exteriores vulneris margines ficci et  
nigrescentes, vulnus autem ita coalitum, ut denuo  
rescindi deberet. Intestina ab aëre tumentia, pau-  
lulum inflammata, nisi circa vulnus, magis a diar-  
rhoea, quam ab operatione. In cavo abdominis ne  
E 3 gutta

gutta quidem sanguinis ab operatione residua; vterus ita rursus contractus, vt vix pugni exigui magnitudinem aequaret, vulnus maximam partem coalitum, margines nigrescentes, vt in vulneribus mortuorum. Nullum indicium, operationem aliquid ad morbum contulisse. Infans excisus vixit, et bene se habuit. Subiicit Noster historiam eorum, quae olim de sectione caesarea scripta sunt, et recentiora quaedam exempla, maximam partem Gallica. Inter alia anno 1741 chirurgus primus in arce Gallica *Bicestre* partum secuit ex femina, lue venerea infecta, vbi euentum felicem Noster ipse vidit, eoque magis miratus est, quoniam femina tophos ingentes gerebat in pedibus, vlcera venerea in collo.

P. 245. 4. *Bidens Acmelloides* describitur a PETR. ION. BERGIO. Plantae semina Parisiis attulit hortulanus aulicus, Kallström; vbi indigena sit, nescitur. Paludosam esse, aut saltem in agris humilioribus crescentem, habitus indicat. Calorem amat, cum durauerit in domo Cl. Auctoris in camera, hyeme, 14 vel 18 grad. thermometri Suecici calente. An perennet, nescit, cum anno, quo haec scripsit, floruerit. Folium recens, dentibus comminutum, saporem pungentem producit, fere, qualis est ari vetustioris. Ad bidentem refert, ob receptaculum paleaceum. Paleae concavae, incuruae, membranaceae, apice lutescentes, obtusae, floribus breuiores, singulos flores obuoluentes singulae, deciduae. Est itaque ipsi planta: bidens (acmelloides) foliis oppositis, quatis ferratis, caule procumbente, floribus solitariis: *spilanthus* (oleracea) LINN. S. N. Ed. XII. p. 534.

P. 250. 5. Semen, autumnno terrae commissum, perire, si magna copia niuis rarae tegatur ante, quam gelu in terram penetrauerit, ostendit experientia quadam CAROL.

KNUT-



**K N U T B E R G**, Capit. Mechanicus. Caussam indicat, quod radices et germina calore intra terram corrumpantur. Suadet igitur, vt nix super agris comprimatur, quo terra congeletur.

6. *Transitum Veneris per solem* d. 3, 4 iul. 1769. p. 254. tunc adhuc futurum **ERICUS PROSPERIN**, Adiunct. Math. et Phys. Acad. Vpsal. computat, qualis appariturus sit, in illis Sueciae locis, vbi tunc verosimile erat astronomos futuros.

7. *Arena mobilis quomodo plantis possit figi, docet* p. 265. **LAUR. MONTIN**, M. D. et Med. Prouinciae Hallandiae. Hac arena regiones, mari adiacentes, ita paulatim obducuntur, vt coli amplius vix possint. Arundine arenaria et elymo arenario coeptum est illam feri, vt plantis his retineretur, sed non magno cum fructu. Noster plantarum, quas tanta frequentia in hac arena reperit, vt conuenire eis hoc terrae genus certum esset, numerosum texit catalogum, frutices autem et arbores etiam ait in illa crescere, ipsam alnum, dummodo primo, magna plantarum minorum copia, arenae superficiem cespite firmo obduxerit.

8. *De remediis contra luem veneream et insufficien-* p. 273. *tia spiritus mercurialis*, agit **JO. HARTMANN**, Med. D. et Prof. Oboenf. Solutionem mercurii sublimati p. 274. in spiritu vini pluribus dedit, celebritate medicamenti motus, quod vni alteriue, leuiter laboranti, profuit; multi vero, cum sanati viderentur, absque nouo contagio, denuo in morbum inciderunt; aliis etiam nihil omnino profuit spiritus ille mercurialis, contra, aequae ac ab aliis mercurii praeparatis chemicis, ab hoc natum est malum hypochondriacum, imo pectori mala inde exorta sunt cum vomitu vehementi,

- etſi parum ſpiritus datum fuiſſet, aqua cinnamomi aut camphora mixtum, et iuſculis ex vegetabilibus dilutum. Magis profuit vnguentum Neapolitanum, ex mercurio et pinguedine, eâ cura adhibitum, ne ſaliuatio oriretur, niſi, quod nec huius, nec reliquo-
- p. 276. rum medicamentorum ſalubris effectus fuerit apud illos, vbi indurationes in locis remotioribus, ſedem morbo praeberent. Apud hos cum fructu adhibitaſunt Edinburgenſium pilulae aethiopicae, hac formula: Rec. merc. viu. drach. vi. vel viii. ſapon. alb. Hiſpan. extr. guaiaci ana vnc. ſemis. Facta globulorum plena extinctione, tritutando in mortario vitr. adde ſulph. antimon. aur. Edinb. vnciam dimidiam. ſyrup. comm. q. ſ. vt f. maſſ. pil. qua form. pil. gr. vnus pulu. lycop. aſp. Loco extr. ligni
- p. 278. guai. uſus etiam eſt extr. turion. pini. Vnguentum mercuriale et has pilulas vtiliora reperit ſpiritu mercuriali, quo iis ſaltim in locis non omnino ſanatur
- p. 280. lues venerea, nec herpes Graecorum. Pilulas vnguento praefert. Eas quidem nunquam ſolas dedit, ſed primis duabus ſeptimanis laxantia, mercurio dulci vel turpetho minerali aut pulu. PLUMM. mixta; ſed illorum effectum alium non credit, quam quod ad uſum pilularum praepararint. Igitur pilulas exiſtimat morbo venereo leuando ſufficere, etſi ſolae exhibeantur. Alio tempore expoſiturus eſt, quid faciant contra elephantiaſin, ſatis in his terris frequentem.
- p. 281. 9. *Ad caſtoris hiftoriam pertinentia* narrat. ION. HOLSTEN verb. diu. Min. in Quickiok in Lapponia. Caſtorem educauit, qui, cum primus adferretur,
- p. 283. non niſi lac poterat fugere. Veſcitur cortice betulae, populi, ſalicis, non vero alni, ſorbi et pruni padi; vtitur etiam herbis, quibus oues inprimis aluntur, maxime amat equiſetum, ſed et, quibus homines nutriuntur, ſumit, ipſam carnem. Terram,



ram, et quibus ad aedificandum opus habet castor, pedibus anterioribus amplectitur, et ita progredien- p. 284.  
do, ope posteriorum, aut natando promouet, vt nul-  
lum sit fundamentum fabulae, castorem vnum a reli-  
quis, trahae ad modum, onerari. Castoreum con- p. 286.  
tra omnia mala externa praesentissimum remedium  
habet earum regionum populus; magis tamen illud  
faciunt Noruegi, quam Sueci. In spiritu vini sum-  
tum praeseruare credunt tempore pestis et morbo-  
rum epidemicorum. Non audent illud secum ferre  
nauigantes, credentes, cetos eius odore allici, et na-  
vigiis periculum creare. Vulnera, dentibus castoris p. 287.  
facta, non incurabilia sunt, vt vulgus dicit, difficilius  
tamen curantur, tum, quod castor, quae dentibus  
complexus est, omnia auferat, tum, quod ex ore  
eius calor vehemens exeat.

*Trimestre quartum.*

1. *Ea, quae ad nauigationem pertinent, quae* p. 289.  
*feliciter, quae minus feliciter Sueciae cedant, quam*  
*aliis regionibus, examinat* IO. WESTERMANN.

2. *Adnotat quaedam occasione huius scripti.* p. 318.  
FRID. CHAPMANN.

3. *Idem facit* IO. CLASON. p. 321.

4. *De montibus Westgothicis observationes edit* p. 324.  
TORB. BERGMANN; inprimis de stratorum, qui-  
bus constant, materiis, situ, conditionibus.

5. *Litorella iuncea, nouum genus conditur a* p. 337.  
PETR. ION. BERGIO. Planta, Sueciae indige-  
na, ea est, quam accurate satis descripsit et pinxit  
BERNH. DE JUSSIEU, *Memoires de l'Acade-*  
*mie*

*mie des sciences* 1742. p. 131, relicto ei plantagi-  
 p. 339. nis nomine, a quo tamen genere differt, quod flo-  
 res habeat non hermaphroditos, vt plantago, sed ad  
 p. 341. LINNAEI monoecias tetrandrias pertineat. A lo-  
 co igitur, quo crescere solet, *litorellam* appellat, no-  
 vum genus, cuius hi sunt characteres: Masculi flo-  
 res pedunculati. *Calyx* perianthemum campanula-  
 tum tetraphyllum. *Corolla* monopetala infundi-  
 buliformis, limbo quadrifido erecto. *Stamen* fla-  
 mentorum quatuor longissimorum receptaculo in-  
 ferta. *Antherae* cordatae. Feminini flores in axil-  
 lis foliorum sessiles, cum pedunculo masculi adgre-  
 gati. *Calyx* nullus, nisi squamas sumas; *corolla*  
 monopetala conica, ore minutissimo obsolete tri-  
 dentato; persistens. *Pistillum*, *germen* superum,  
 oblongum. *Stylus* longissimus. *Stigma* acutum.  
*Pericardium*, fructus corolla tectus. *Semen* nux vni-  
 locularis. Species vnica est *litorella iunceae*. Est plan-  
 tago (vniflora) scapo vnifloro. LINNAEI species  
 plantarum 167.

P. 344. 6. *Morbum equorum, cui nomen scrophula farci-*  
*men* (gallice farcin) describit P. HEERENQUIST,  
 ex iis, quae in schola veterinaria Lugdunensi didi-  
 cit. Morbus est chronicus, externus, contagiosus,  
 in eo primum magnae indurationes apparent sub  
 cute, circa venas, in regionibus interioribus pe-  
 dum, nulla tamen cutis parte excepta. Tarde ma-  
 turescentes abeunt in pus acre, vnde nascuntur vl-  
 cera, humore fetente plena, cancrum referentia,  
 sequitur phthisis et tandem mors. Causae sunt:  
 stabulum, in quo aër impurus, fetens quiescit, tran-  
 spiratio post motum vehementem suppressa, pabu-  
 lum pingue ex frugibus, recenter ex agro collatis,  
 praebitum statim, cum animal adhuc sudat post mo-  
 tum vehementem. In libris additur, acrimonia,  
 aciditas.



aciditas, falsedo sanguinis. Noster, quomodo hoc p. 345. morbo vehementissime afflictum mulum sanauerit, prolixè narrat. Vfus vero est diaeta, quae sanguinem puriorem redderet, euacuantibus, vlcera secuit, et ferro candente vssit.

7. *Pisces Guaperua* describit GUST. FRID. p. 350. HIORTBERG. Iudice LINNAEO est *Lophius histrio* (*Systema naturae* p. 403.) ante descriptus et pictus, sed ex exemplaribus siccis, aut in spiritu vini seruatis. Noster vtrumque exactius praestat, cum pisces viuum ceperit, in planta marina Sargazo, in qua habitat.

8. *Praestantissimos effectus medicamenti mercurialis, quod Calomel appellant*, enarrat NIC. GISLER, M. D. Log. et Phys. Lect. in Gymnasio Hernosando. Calomel ipsum ita praeparat GEORGII, nosocomii Holmienensis pharmacopaeus: mercurii, destillatione satis depurati, vncias nouendecim cum vnciis viginti quatuor mercurii sublimati triturat, donec disappearant omnes globuli mercuriales, mixtura aequabili, et moderato igne digeritur, vt eo melius cedat sublimatio, quae plerumque per horas sex durat. Postquam adscendit calomel, vas adhuc in illo gradu caloris, quem habebat ab igne ultimo, relinquitur hora dimidia, deinde paulatim frigescit. Quod in fundo residuum est, abiicitur, firmum vero calomel, ab adhaerente puluere et mercurio depuratur. Id medicamentum plerumque Cl. Auctor in pilulis praebuit, hac forma: Rec. calomel opt. drachm. tres. camph. croci ana drachm. vn. theriac. androm. vnc. sem. M. f. pil. gr. duor. pondere. Adhibuit autem illud cum fructu in fistulis, inprimis a pleuresia natis, vel apud puellas 6, 9. annorum. Indurationes eius ope emollitae sunt, et in vlcera abierunt.

In

- p. 359. In maniacis sanandis et paralyticis summa eius vis  
p. 364. est. Infantes, nisi cachectici sint, aut cacochymi-  
ci pilulis praeparat, quarum haec est formula: Rec.  
extr. aloes. panchym. CROLLII ana drachm. vn. res. ia-  
lapp. croc. angl. ana drachm. fem. calomel scrup.  
vn. camph. gr. xv. M. f. pil. ad gr. duo. Harum  
tot praebet, quot annorum est infans, usque ad 10  
aut 12, dosin adultorum. Cachecticos decocto  
praeparat. Medicamentum apud plerosque opera-  
tur leni sudore, et aucta perspiratione, apud alios  
saluatione, apud alios vrina. Delicatiores et iunio-  
res alternis vicibus sudores habent et deiectiones.  
Perspiratio igitur diaeta etiam sustentanda est. Mul-  
tis nihil incommodi in collo sentitur; quibus vero  
p. 366. id contingit, illi gargarismate vtuntur. Dosis pilu-  
larum calomel die quavis tertia, quarta aut quinta,  
vnica pilula augetur, non vltra septem pilulas ascen-  
ditur. Cum debilitari se sentit aeger, aliquot diebus  
nonnisi 2 aut 3 dentur. Infantibus, si duabus aut  
tribus deiectiones 2 aut 3 habeant, praebentur vti-  
lius vna aut duae effectu, sudore se tunc ostendente,  
quod magis optatur. Qui paralyti diuturna infe-  
p. 367. stantur, simul ptisana vtuntur: item qui diu conuul-  
sionibus laborarunt, qui opus habent diuturno cal-  
lomel vsu. Cum maxime procedit resolutio et com-  
motio materiae peccantis, male olet sudor, post  
hanc crisin 5 aut 6 pilulae vix edunt effectum adeo  
sensibilem, vt 2 aut 3 initio. Si pertinacior mor-  
bus cedere renuat pilulis calomeli, aliae fiant ex ae-  
quis partibus calomel et mercurii dulcis, quarum  
duae sub initium praebeantur. Profuit etiam medi-  
p. 368. camentum in morbis oculorum, ipsa cataracta; au-  
ribus exulceratis, tonsillarum vlceribus; rhachitide,  
strumis colli, morbo hypochondriaco, mictu cruen-  
p. 369. to. Rustico vrina, per fistulas duas in hypochon-  
driis exhibat, vsu calomel duodecim dierum rediit  
vrina



vrina in viam naturalem, et fistulae septimana tertia sanatae sunt et occlusae. Similia expertae sunt feminae, quibus post partum vrina continuo stillauit. Cariem ossium non sustulit medicamentum, sanando p. 371. vlcera effecit, vt facile tolli posset os cariosum. Iunioribus facile medicamentum Noster prae-buit, circumspēctior fuit in senioribus, an forte cachectici essent; habet tamen exempla sanatorum vlcerum in femina 65 annorum, rustico 70 fere annorum. Quo medicamento vterentur, aegri ipsi plerumque nescierunt, nihil tamen in vsu conquesti sunt, si praecepta medici satis obseruarunt. Infantes duo rha- p. 372. chitici annorum 5 et 9, dorso colloque curuis, costis interiora versus contractis, vt et humero, vsu calomel, rectiores facti sunt, vt, emollitis ossibus, quae deformata erant, vincula et thoraces cum fructu possent applicari.

9. *Quaedam de formica fusca* LINN. Fauna Suec. p. 373. n. 1722. obseruat FRID. GERDES. Cum harum formicarum oua, pabulum auibus, quas nutriebat, quaereret, quaedam aliter vidit, ac narrantur a LINNAEO Comm. Ac. Su. 1741. Ita formicas in collibus argillae reperit, et oua ad boream; sed qua- p. 374. dam die vidit oua ad australe latus translata, incidit post vehemens pluuia cum vento boreali, et illam praesensisse formicas, indicio erat, quod postea, quam cessasset, oua rursus ad boreale latus detulerint. Alio tempore oua reperit ad latus occidentale, profundius demersa; venit cum vento orientali pluuia, durans dies quatuor, quae ouis fuisset nocitura, nisi profundius in terra fuissent sita. Eam curam ouorum constanter vidit vsque ad initium septembris, vbi, ob tempus frigidius, oua perpetuo ad austrum reliquerunt; sed sub finem septembris paucula oua supersunt. Quid faciant, cum alia dies hoc vento,  
alia

alia pluuiam ingruit, expiscari non potuit. Post plurimum dierum pluuiam, oua nec in vlllo laterum cumuli, nec in medio reperit. Suspiciatur ergo deferri ad loca profundiora. Ita vero formicis, tempestatis praenunciis, plus vno anno vsus est. Examina formicarum exire, quod suspicatus erat LINNAEUS, Noster non credit, cum alias ita crescere ciuitates formicarum non possent, nam vnā, tribus annis, ad duplum fere excreuisse reperit.

VIII.

JOHANN FRIEDRICH ZÜCKERTS, *der Arzney-Gelahrheit Doctors, der Römischkayserlichen Akademie der Naturforscher, und der Churmayn- zischen Akademie nützlicher Wissenschaften Mitglieds, systematische Beschreibung aller Gesund- Brunnen und Bäder Deutschlands. Berlin und Leipzig, in der Rüdigerischen Buchhandlung. 1768. 4. mai. pl. 19.*

i. e.

IO. FRIDERIC. ZÜCKERT, M.D. *descriptio systematica omnium fontium medicatorum et thermarum Germaniae.*

Cl. ZÜCKERT boni publici et medicorum praefertim commodo nihil melius facere potuisset, quam quod systematicam, qua adhuc caruimus, delineationem omnium fontium medicatorum Germaniae elaborauerit, et cum republica communicauerit literaria. Medicos enim, hac elaboratione, aptos reddidit, vt non solum melius de huius vel illius fontis medicati natura, proprietate, viribus ac effectibus iudicare, sed etiam facilius nunc definire possent, quem prae ceteris suo aegroto commenda-

re



re aut dissuadere ex tam multis deberent fontem. Opusculum in *duas* diuidit partes. *Prima pars* continet generalem pertractationem fontium medicatorum, tam frigidorum, quam calidorum: et in *duo* de nouo diuisa est *capita*, quorum *primum* de partibus agit fontium medicatorum constitutiuis. Quum Cl. Auctor generalia tantum, et quae ex aliis aquarum mineralium scriptoribus excerpfit, exhibeat, ea praesertim, ex his collegit, quae omnibus fontibus communia, et quae huic vel illi tantum propria essent. Hac ratione recenset modum, quo thermae fiant, quo acidulae oriantur, quo perennes sint, cuius generis sit vitriolum, quod in acidulis reperitur: refert porro, quid mineralium aquarum sit spiritus, eumque a principio elastico aethereo distinguit, concedit tamen, quod ambo intime mixta sint. Enarrat omnes eas diuersas species terrarum ac salium, quae in aquis mineralibus inueniuntur, qua occasione simul sulphuris meminit, quod eis interdum inest: quamuis et dentur fontes, medicati dicti, qui nihil, praeter paucam terram leuem, contineant.

In inquirendis partibus constitutiuis ad sex imprimis circumstantias, secundum Cl. Auctorem, respici debet aquarum mineralium examinatio. 1. Quomodo adiacens comparata sit terra, et quaenam mineralia in ea contineantur? 2. Quam habeant rationem aquae minerales respectu limpeditatis et leuitatis prope fontem, et quam alibi? 3. Qualem ineant mutationem tum, cum diuersis corporibus chemicis, quae reagentia vocant, miscentur? 4. Quem edant odorem et saporem ad fontem? 5. Quid aquae eliminant in earum superficie prope fontem ipsum, eiusque canalibus: quid ad fundum vasis deiiciant, quando loco quieto reponantur? 6. Quas partes fixas post coctionem et destillationem relinquant? His praemissis omnes fontes medicatos et thermas Germaniae in classes ordinat.

Prima

p. 42. Prima classis. Huc pertinent

Aquae Saponaceae, vt

Aquae Plombieres, in Lotharingia

Schlangenbadenses, in comita-  
tu inferiori Catimelibocensi.

Mochinenses in Bauaria.

Secunda classis

Aquae Natrosae, seu amarae

1. Simples

Aquae Sedlizenfes ] in Bohe-  
Seydschützenfes ] mia.

2. Compositae ex natro, alioque sa-  
le medio

Aquae Hornhausenfes, in Prin-  
cipatu Halberstadiensi

Rasseburgenfes, in Duca-  
tu Vinariensi.

Tertia classis

Aquae Alcalinae

I. Simples

1. Bertligenfes thermae in Episcopatu  
Treuirensi

2. Burgbernheimenfes aquae in Marchio-  
natu Onaldino

3. Dietzenbachenfes in Bauaria

4. Elsterenfes acidulae in Variscia

5. Emsenfes thermae in Wetterauia

6. Fachinenfes aquae in Principatu Nas-  
souiensi

7. Gresbachenfes in Sueuia

8. Heilsbronnenfes in Marchionatu On-  
aldino

9. Hirschbergenfes thermae in Silesia

10. Kenzenfes, in Pomerania

11. Wildungenfes in Principatu Waldec-  
censi.

Ad



Ad has etiam pertinent thermae Bollenfes, (Boller-bad) in Ducatu Würtembergico: Bilinenfes, Coftenenfes, Turnizenfes et Cummernenfes in Bohemia: Werfingaurenfes in Silefia: Leitzkauenfes in Marchia media, et Bielfeldinae in Weftphalia, quas autem Cl. Auctor fpecialiter non pertractauit.

## II. Compositae.

1. Bilinenfes acidulae
2. Buchenfes
3. Carolinae thermae
4. Doennfteinenfes in Epifcopatu Colo-  
nienfi
5. Montis Pyrmontani acidulae in Princi-  
patu Waldeccenfi
6. Aquae Selteranae in Epifcopatu Tre-  
virenfi
7. Teplizenfes thermae in Bohemia.

## Quarta claffis

### Aquae muriaticae.

1. Badenfes thermae in Marchionatu Ba-  
denfi
2. Canftattenfes in Ducatu Würtember-  
gico
3. Heilbronnenfes in Bauaria
4. Aquae, quae a ceruis nomen habent in  
Ducatu Würtembergico
5. Keftenholzenfes thermae, in Alfatia  
fuperiore
6. Niederbronnenfes aquae in Alfatia
7. Wisbadanae thermae in Principatu  
Naffouienfi
8. Ferinae thermae
9. Zellenfes thermae

} in Ducatu Würtem-  
bergico.

## Quinta claffis

### Aquae sulphureae.

1. Aquisgranenfes thermae

2. Ferinae thermae in Bauaria inferiore
3. Altenburgicae thermae prope Viennam
4. Badensis thermae in Austria
5. Bahlingenses aquae in Ducatu Würtembergico
6. Landeckenses thermae in Silesia
7. Pyrenwarthenfes thermae prope Viennam
8. Reutlingenses aquae in Ducatu Würtembergico
9. Sulzenfes. aquae in Bauaria superiore
10. Zaysenhaufenfes in Ducatu Würtembergico.

Sexta classis

Aquae martiales

I. Simples

1. Freyenwaldenses in Marchia media
2. Lauchstadenfes in Episcopatu Martisburgensi
3. Lignizenses in Silesia
4. Polzinenses in Pomerania vltiore
5. Ronneburgenses in Ducatu Altenburgensi.

Huc quoque pertinent aquae Bebrenfes in Thuringia: Bechinenfes in Bohemia: Buckenhofenses prope Erlangam: Danckelsriedenses in Sueuia: Dinkhollenses vel Braubachenses in Ducatu Hassio-Darmstadiensi: Francofurthenfes ad Viadrum: Halenses ad Salam: Hanoueranae: Hanouienses: Koefenenses ad Salam: Radebergenses in Misnia: Reibottgrünenses in Variscia: Weissenburgenses in Franconia: et Wittembergenses in Saxonia.

II. Compositae salino-martiales

2. Salino-alcalinae martiales

1. Veteraquenses acidulae in Silesia
2. Berolinenses in Marchia media

3. Bersta-



3. Berstadenfes in Wetterauia
  4. Gieshübelienfes in Saxonia
  5. Birckenfeldenfes in Palatinatu inferiore
  6. Birresbornenfes in Epifcopatu Trevirenfi
  7. Bockledenfes in Epifcopatu Herbipolenfi
  8. Calbenfes in Wetterauia
  9. Deinacenfes in Ducatu Württembergico
  10. Iaffernenfes in Mifnia
  11. Goeppingenfes in Ducatu Württembergico
  12. Grundhoefenfes in Ducatu Saxo-Meiningenfi
  13. Helmftadienfes in Ducatu Brunfuico-Guelferbytano
  14. Ibenhaufenfes prope Goeppingen in Sueuia
  15. Gradlizenfes, vulgo Kukusbad in Bohemia
  16. Kiffingenfes in Epifcopatu Herbipolenfi
  17. Liebenfteinenfes acidulae in Comitatu Hennebergico
  18. Marienbergenfes in Hannonia
  19. Nieder-Wierenfes in Saxonia
  20. Oelberenfes in Ducatu Brunfuicenfi
  21. Rippolzawerenfes in Ducatu Württembergico
  22. Ruhlenfes in Ducatu Ifenacenfi
  23. Stadthagenfes in Comitatu Schaumburgico
  24. Schwalbacenfes in Comitatu inferiore Catimelibocenfi
- F 2
25. Schwal-

25. Schwalheimenses in Wetterauia
26. Schwelmenfes in Comitatu Marchico
27. Sickersreuthenfes in Marchionatu Baruthino
28. Scaffinenfes in Silefia inferiore
29. Spadanae in Epifcopatu Leodenfi
30. Fannhaufenfes prope Schweidnitzium in Silefia
31. Eppachenfes inferiores in Comitatu Hohelohe
32. Wolkenfteinenfes in Saxonia
- b. Salino - martiales
  1. Cleuenfes in Weftphalia
  2. Driburgenfes in Epifcopatu Paderbornenfi
  3. Egranae in Bohemia
  4. Hofgeismarenfes in Haffia
  5. Pyrmontanae
  6. Quedlinburgenfes.

p. 48. Sequitur *fecundum caput*, quod de virtutibus, vfu et abufu acidularum et thermarum agit. Colligit Cl. Auctor in hoc capite cauffas, a quibus virtutes fontium medicatorum pendent: simulque oftendit, rectum vsum plurimum conferre ad bonum obtinendum ab illis virtutibus fructum. Cum his

p. 87. coniungit in *tertio capite* diaetam, quam aegri, qui aquis medicatis vtuntur, neceffario obferuare debent.

p. 101. Transit Cl. Auctor ad *partem fecundam*, quae specialem pertractationem eorum fontium medicatorum continet, quos in praecedenti tabula systematica recensuit. In dicto ordine omnes profequitur, indicando primum regionem et locum, quo profiliunt, Auctores dein nominando, qui de iis fcripferunt, eosque examinarunt et denique ex melioribus



bus et recentissimis perfectam et completam exhibendo epitomen, ex qua medicus sufficientem sibi comparare potest notitiam aquae mineralis, quam vel nosse tantum, vel suis aegrotis commendare vult. Medici igitur Cl. Auctori pro suscepto labore multas gratias habebunt.

IX.

Saggio di nuoue osservazioni e scoperte di NATAL. GIUSEPPE PALLUCCI, Dottore di medicina e chirurgia, chirurgo delle LL. MM. II. e RR. Aggregato-corrispondente delle reali accademie delle scienze e di chirurgia di Parigi, membro delle accademie di Parigi, membro delle accademie di bottanica, e de georgofili di Firenze. In Firenze 1768. nella stamperia Bonducciana. 8. mai. pll. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Continuazione del saggio di nuoue osservazioni e scoperte cet. con indice vniversale in fine; e varie figure incise in rame. In Firenze 1770. Nella stamperia di S. A. R. per Gaet. Cambiagi. 8. mai. pll. 9. c. tab. aen. 3.

i. e.

NATALIS IOSEPHI PALLUCCI tentamen nouarum obseruationum et inuentorum.

EIUSDEM continuatio tentaminis huius cum indice vniuersali et variis figuris aere expressis.

**I**n priore libro caput primum de spina ventosa in genere agit et in principio exempla eiusdem, cum ex aliorum, tum ex ipsius Cl. Auctoris observationibus.

- P. 23. vationibus recenset. Vidit ille ab hoc morbo nunc functiones animales laesas, nunc mydriasin a compressis nervis opticis, nunc laesiones actionum vitalium ob horrendam thoracis deformitatem, nunc actionum naturalium ob vitium ossium palati, cartilaginis xiphoidis, ossis sacri cet. In eius descriptione,
- P. 26. ne, ratione ortus et incrementi successiui, tria stadia constituit; primo tumores oriuntur plus minus duri, plerumque elastici, indolentes, cutis colore nondum mutato; postmodum haec rubescere incipit cum dolore, ac si acu puncta esset; tandem exulceratur, effluit materia plus minusue diluta, coloris varii, plerumque tamen nigricantis, foetidissima: vlcus perpetuo vlterius serpit, superficiem, cancro similem, referens; destruitur contextus cellulofus, ac denique os ipsum carie corrumpitur et plerumque nigricat.
- P. 27. Sedes mali frequentissima est in articulationibus, potissimum extremitatum, vbi, nisi tempestiue occurratur, celerrime, quaecumque tangit, corrumpit. Nomen *spinae ventosae* ab inflammatione in genere, ab Arabibus spina dicta, et ab aere deriuatur, cuius concursui Auctor Noster multum omnino, vt in aliis, ita et in hoc morbo generando tribuit, eum nimirum in corpore animali non prorsus priuari elasticitate sua et ab eius actione resolui humores subtilissimos, vt vaporis instar in ossa ipsa penetrent, eaque inflare ac denique rupturam partium efficere, asserens. Acrimonia haec
- P. 36. indolis alkalinae est et aequae ac vrina vlceribus internis corrupta cum acidis efferuescit. Morbum hunc plerumque haereditarium esse, cum SEVERINO adfirmat et copiose existentiam morborum haereditariorum argumentis euincit. Cariem, ex
- P. 42. causa interna natam, semper antecedit intumescencia ossis; non autem vice versa hanc caries semper sequitur. Errant igitur, qui cariem vel ab intumescen-



mescentia vel excauatione ossis oriri putant. Di. p. 44.  
 stinctio tamen admitti debet inter cariem et corru-  
 ptionem seu putredinem ossis; illa enim sistit tan-  
 tum frequentissima foramina in osse; haec vero pa-  
 rietes horum foraminum destructos et in putrila-  
 ginem resolutos. Clarior fit differentia exemplis  
 ossium cariosorum, in quae humor gelatinosus effu-  
 sus est, post ea concretus et cartilagineam consisten-  
 tiam adeptus. Insignis est affinitas morbi nostri p. 45.  
 cum rhachitide et humores rhachitici, inflammati et  
 exulcerati, semper ad spinam ventosam referri debent.

Caput secundum de curatione spinae ventosae  
 exponit. Remedium scopo indicato, ut nimirum p. 49.  
 miasma in loco affecto stagnans vincatur et remo-  
 veatur, satisfaciens, Cl. Auctor inuenit *unguentum*  
*helcoticum* a se dictum, cuius praeparationem alio  
 tempore se communicaturum pollicetur et hoc loco  
 tantum monet, illud sistere vnguentum coloris albi,  
 ex variis ingredientibus, iisque, pro ratione circum-  
 stantiarum, variandis, confectum, sine tamen addita  
 pinguedine quacumque; hoc vel per se, vel in hac  
 illaue aqua destillata solutum, applicari potest et ad  
 alios etiam morbos complures, uti postea videbi-  
 mus, conducit. Eo maiori pretio habendum est,  
 quo minus hucusque genuinum remedium ad re-  
 bellem hunc morbum vincendum innotuit; neque  
 enim amputatio ipsa limites malo ponere potuit, p. 54.  
 neque efficacissima ceteroquin medicamenta eidem  
 suffecerunt. Quo autem dictis fides concilietur,  
 enarrat curationem, huius remedii ope in puero se p. 57  
 ptem annorum factam, qui in deploratissimo statu  
 fuerat, in qua, digressionem facta, monet, ne tumores p. 65  
 in hoc morbo aperiantur, quod iam superius incul-  
 cauerat. In genere putat, nullum tumorem a ma-  
 lignitate interna ortum aperiri, sed suo remedio  
 tractari debere, quod materiam ex profundis sedibus

- euocatam et rite concoctam, descriptione facta, optime eliminat. Aegri huius frater, maior natu, contractura et atrophica brachii sinistri laborauit, frictionibus oleosis ferme incurabili reddita; idem tamen ope remedii huius curatus fuit, adhibitis antea balneis emollientibus, frictionibus et suffumigiis ex succino.
- p. 71. His exemplis enarratis, pergit Auctor in demonstranda et explicanda remedii vtilitate et ulterius rationem eo vtendi, cautiones, regimenque internum exponit. Conducunt serum lactis, decocta depurantia cet. sed prospiciendum simul, ne his vires digestionis nimis deiciantur.
- p. 75. Si purgandum est, praescribit bolum ex aequalibus partibus aloes, p. 78. rhei et salis Anglici vel similis. Sub finem huius capitis verbotenus insertum est testimonium de restitutione aegrorum prius memoratorum.
- p. 80. Sequuntur obseruationes super malo venereo, cuius vestigia quaedam iam in ARETAEO, PAULO AEGINETA et CELSO inuenisse sibi videtur Noster. Vti scabies, lepra, elephantiasis cet. inter se multa communia habent, sic etiam hi ipsi cum
- p. 83. lue venerea; et scabiosum virum feminam sanam morbo, venereo simillimo, afficere posse, ex obseruatione propria didicit Cl. Auctor. Ex cancro et
- p. 118. iam mammae femina cum marito acrimoniam tantam communicauit, vt vlcera in glande penis efficerentur; et femina viri, herpete affecti, lintea lauando, fluxum vehementem ex vtero sibi contraxit et idem malum cum marito suo communicauit. His omnibus vtitur Noster ad demonstrandam antiquitatem morbi venerei, ad cuius postmodum descriptionem et curationis modos progreditur, quibus
- p. 121. tamen recensendis nunc supersedebimus. Vesiculae seminales nonnumquam rumpuntur et abscessus formant, ex tensione tantum et dolore in perinaeo cum stranguria et symptomatibus febrilibus cognoscen-
- scen-



scendos; ex quibus facile transitus fit ad fistulas ani. Morbi istius exemplum affert Noster, quem adstante Cl. PLENCITZ, incisione facta, feliciter profligavit. Ad curationem morbi venerei commendat pilulas, ex aequalibus partibus mercurii viui purissimi, saponis alicantici et micae panis albi formatas, quae ingredientia in mortario lapideo, adpersa interdum guttula aquae vel syrupi capilli Veneris, ita commiscenda sunt, vt mercurius prorsus dispereat, postmodum in pilulas tres vel quatuor granorum formanda. Dosis pro adulto est pilula vna bis vel quater de die; asserit, aegros, pro re nata, successiue ad centum vsque pilulas deglutire posse, neque tamen inde saluationem moueri, nisi mercurius iam in corpore praeexistit. Saponem alicanticum p. 148. praecellit is, qui a Cl. DE SAUBOIN ex oleo lentisici conficitur. Noua methodus, mercurio sub forma clysmatum vtendi \*), Auctori Nostro neque p. 151. multum arridere, neque sanae physiologiae conformis esse videtur. Externe vnguento suo sub varia, pro rei conditione, forma vtitur. In priapismo vehementissimo pilulae de cicuta commendantur, paucis ab initio per diem granis, postmodum per vices ad decem vel duodecim fumendae, et crebrius, interposito purgante ex aloe, rheo et nitro. Hoc etiam remedio se in ipsarum febrium decursu cum successu vti, monet Auctor. In priapismo et stranguria hirudinibus laudes debentur; incidantur etiam venae in propinquitate penis, sanguine turgidae. Bubbles fomentis et gonorrhoeas aequae ac fluorem album iniectionibus cum vnguento suo paratis sanat, adiuncto interno vsu decoctorum ex cortice Peruviano, sassaparillae, chinae radice cet. Tubercula intus ad prostaticam et vesicam posita, quae vrinae profluuium impediunt et interdum calculum men- p. 168.

F 5

tiun-

\*) Vid. Commentar. horum Vol. XVI. Part. III. p. 460.

tiuntur, cereolis, vnguento suo illitis, tractanda iu-  
 p. 172. bet et, adiecto curationis exemplo, assertum suum  
 confirmat. Postmodum de vsu eiusdem vnguenti  
 in variis aliis affectibus tam venereis, quam aliis di-  
 sputat, nempe in ophthalmiis, ozaena, gummati-  
 bus, doloribus rheumaticis et arthriticis, odontal-  
 gia, ambustionibus, paronychia, vlceribus scorbu-  
 p. 199. ticis in ore, affectibus scabiosis et his analogis, scir-  
 rho porro et cancro, vbi, etsi non semper morbum  
 fustulit, tamen miro modo leniuit; in tumoribus et  
 abscessibus, vulneribus contusis, gangraena, vlceri-  
 bus malignis, carbunculis, vitiis auditus cet. quae  
 fuse exponuntur, inspersis nonnumquam morbo-  
 rum historiis declarantur, et testimoniis allatis fir-  
 mantur.

In continuatione, seu parte secunda obseruatio-  
 num primo recensentur exempla quaedam curatio-  
 num scirrhi mammarum, cuius morbi memorabilis  
 casus in mamma vtraque fere in cancerum iam mu-  
 tata Tab. I. depingitur. Ab vsu vnguenti inceptit  
 tumor moueri, malum auctum fuit carbunculis ori-  
 entibus, iisque ruptis et faniem foetidissimam effun-  
 dentibus, superueniente etiam carne luxuriante;  
 continuatus vero remedii vsus omnia haec incom-  
 moda vicit. Cl. Auctor vidit, aliquando eutem in-  
 flammata in mamma scirrhusa adeo sensibilem fu-  
 p. 4. isse, vt vnguentum ferre nequiret; quare pannum  
 subtilissimum, ex lacte tepido vel aqua rosarum ex-  
 pressum, inter cutim et medicamentum interposuit.  
 p. 16. Digressione facta, enarrat curationem vlcerum duo-  
 rum cacoethicorum, materia rheumatica vel arthri-  
 tica simul totum corpus occupante, eoque ideo fe-  
 p. 18. re iam ad extremum perducto. Postmodum ad ca-  
 sum, quem Tab. II. sistit, vbi in femina, post ampu-  
 tationem mammae dextrae, cancer recruderat cum  
 p. 21. dirissi-



dirissimis symptomatibus, et iam etiam in sinistra  
 scirrhus formatus haerebat. Curatio in mamma  
 dextra aequè felix fuit, ac casus prius descripti; in  
 sinistra, cum euulgaretur liber, nondum finita,  
 quamquam optimam spem felicitis euentus praebe-  
 bat. Concedit tamen Auctor, vires remedii sui de-  
 terminatas esse, nec ubique morbo, iam profundissi- p. 23.  
 mis radicibus infixis, sufficere, quod exemplo cancri  
 linguae probat, cui curando impar fuit. Has nar- p. 34.  
 rationes excipiunt animaduersiones de morbis mam-  
 marum, eorum ortu et causis et de ratione, qua  
 remedium, saepius laudatum, iis medeatur. Dispu- p. 38.  
 tat de abusu poscae seu oxycrati, cum lac in mam-  
 mis stagnat, quo eae saepe indurantur; fotu e con- p. 41.  
 trario aquae calidae nimis emolliuntur et ad suppu-  
 rationem disponuntur. Et si inepta horum medi-  
 camentorum applicatione acuta quoque mala eui-  
 tantur, tamen inde subsequuntur chronica, scirrhi  
 nempe cum tristissimis sequelis. Recensetur post-  
 modum morbus aegrae, quem Tab. III. ante ocu- p. 52.  
 los ponit, qui vero ob varias causas vehementio-  
 res non cessit, sed cum Cl. Auctor eius descriptio-  
 nem publici iuris faceret, indies ingrauescebat.  
 Tum communicat historiam morbi ex nouis littera-  
 riis Florentinis, ab aegro ipso conscriptam, qui fuit p. 68.  
 tumor insignis rheumaticus, a genu usque ad verte-  
 bras lumbares extensus et inunctionibus mercuria-  
 libus peior redditus, ab Auctore autem Nostro feli-  
 cissime curatus, qua occasione comparisonem in-  
 ter hunc aegrum et eum, de quo superius ego-  
 rat, instituit. Sequitur nunc breuior recensio co- p. 81.  
 piofiorum aliarum curationum, remedio hoc externe  
 adhibito, praestitarum, quae loco commentarii ve-  
 luti inseruit tractationis de virtutibus eiusdem in  
 prima parte recensitae; et sic finis imponitur volu-  
 mini primo harum observationum, quarum conti-  
 nua-

nuationis spem nobis facit Cl. Auctor, promittens, iisdem chirurgiam medicam nouam formam et perfectionem esse adepturam.

X.

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum, coloribus naturam referentibus expressae. Vol. I. et II.

et

D. IACOB CHRISTIAN SCHAEFFERS *natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer Insekten. Regensburg, gedruckt bey Heinrich Gottfried Zunckel 1766. Vol. I. P. I. et II. pl. 15. tab. aen. viuis coloribus pictae 100. Vol. II. P. I. et II. pl. 15. tab. aen. 100.*

**I**am alio loco \*) laudauimus Cel. SCHAEFFERI, tot ad historiae naturalis incrementum susceptis laboribus clari, consilium edendi figuras insectorum Ratisbonensium, huiusque operis priora duo volumina, pluribus aliis sine dubio augenda, nunc indicamus. Cum vero Cl. Auctor pleniores insectorum descriptiones, quas addere figuris his promiserat, mutato consilio omiserit, breuiter tantum de hoc opere ad Lectores referre sufficiet. Continent singula volumina quinquaginta plagas, in vtraque pagina insectorum imaginibus refertas, vt centum eiusmodi tabulae volumen constituent. In figuris ipsis insectorum ordinandis Cl. SCHAEFFERUS, nec classium, nec generum rationem habuit, sed prout varia insecta ei in manus inciderant, ea pingenda curauit. Hinc factum est, vt nonnunquam insecta omnium classium

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 148.



classium in vna eademque tabula reperiantur. Saepe enim ad quindecim et ultra in vna eademque tabula delineata videmus. Figurae elegantes sunt, superantur tamen a Cl. ROESELII figuris, cuius artem et elegantiam nemo adhuc opifex imitando assequi potuit. Addita sunt nomina generica, quae Cel. Auctor quondam in fundamentis entomologicis \*) proposuerat, ex LINNAEO et GEOFFROY vt plurimum sumpta. Species, numeris additis, distinguit, ita vt *scarabaeus primus, secundus, tertius* etc. hic occurrant, plane nullo aut incerto factis ordine seruato. Inter insecta delineata nonnulla noua nobis visa sunt, quorum tamen numerus non adeo magnus est. Additus quoque singulis voluminibus est index, in quo latina et germanica generum nomina reperiuntur.

Haec sunt, quae de hoc opere, in vniuersum considerato, dici possunt, quod inter splendidissima opera entomologica omnino referri meretur, regali-que liberalitate, qua Cl. Auctor in eo adornando suffultus est, non indignum iudicamus. Interim duo sunt, quae Cel. Auctorem neglexisse vehementer dolemus. Verendum enim nobis esse videtur, ne vtrumque haud parum impediat vsum, egregium alias ab hoc libro expectandum. Primum quod Cl. Auctori haud placuerit, veluti alio quoque loco de fungorum iconibus, ab eo editis, conquesti sumus, in tam splendido opere addere synonyma, vel allegare descriptiones ab aliis constructas. Ita enim aliter fieri non potest, quam vt plerique entomologi, vel nullum prorsus fructum ex hoc opere haurire, vel longo demum eoque non parum taedioso labore, quod sentiant hic deesse, supplere possint. Deinde, quod sine vlllo ordine insecta diuersorum generum pro pictoris lubitu coaceruata sint, cum tamen, si  
vnius.

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 150.

vnus generis insecta simul oculis adspicientis se praebeant, ex diuersarum specierum comparatione accurata insectorum cognitio adquiri possit, quae nunc ex omnibus tabulis conquirenda sunt. Serio igitur rogamus Cl. Auctorem, vt, quae hic scripsimus, si forte ad eum peruenerint, digna attentione in continuatione huius splendidissimi et pretiosissimi operis censeat, gloriamque partam augeat accommodando figuras suas communi entomologorum vsui. Quid enim iuuat figuras insectorum coaceruare, pretiosorumque operum entomologicorum numerum augere, si ex hac re vel nullus, vel serior tantum fructus ad publicum vsum redundet.

XI.

Traité des maladies des gens de mer, par Mr. POISSONNIER DESPERRIERES, Conseiller Médecin ordinaire du Roi, Censeur royal, & Médecin de la Grande Chancellerie. à Paris, chez la Combe, libraire. 1767. 8 maj. pagg 429. absque dedicatione et praefatione, cum tabula aeri incisa.

i. e.

Tractatio de morbis hominum mari viuentium, Auctore Cl. POISSONNIER DESPERRIERES.

**S**i perpendimus, diuersam penitus vitae rationem esse nautarum ab hominibus terram continentem inhabitantibus, necessarium omnino iudicabimus, vt ad illorum morbos diligentius respiciatur. Quod quamquam a variis iam celeberrimisque viris factum fuit, tantum tamen abest, vt hoc scientiae caput ex omni parte absolutum dici queat, vt potius grates habeamus Cl. Auctori, quod hanc materiam adeo sollicito



sollicite atque erudite exposuerit. Cum nuper opus auctoris cuiusdam Gallici \*) indicarem, monebam, eum praecipue in gratiam nautarum ipsorum scripsisse; Cl. Auctor autem, quem tamen prior ille non videtur conspexisse, magis medentes ipsos instruit, theoriam cum observationibus propriis aequae aliorum coniungendo, et inde systematis quasi medicinae naualis, ut ita dicamus, fundamenta ponendo. Introductio notionem generalem nutritionis p. 26. corporis, effectusque aëris et atmosphaerae in illud sistit et haec omnia ad conditionem nautarum applicat, in qua quidem tractatione multa repetuntur ex libro ipsius auctoris, cuius nuper iam memorata occasione mentionem fecimus. Caput primum de scorbuto exponit, ubi Noster ad celeberrimum tractatum Cl. LIND prouocat et commentarii quasi p. 27. loco quaedam subiungit. Causa una est, quae necessario requiritur ad eum producendum, nempe aer frigidus et humidus; sunt autem duae aliae, quae illam multum intendunt, nempe alimentorum praua indoles, et motus, aut defectu, quod tamen rarius utique contingit, aut excessu peccans. Nec solum frigus sufficit, utpote quod non adeo impedit perspirationem, sed humiditatem cum eodem coniunctam esse oportet. Cohibita his causis perspiratione, quae fere vnica causa dici debet morborum nautigantium, a resorpto humore, per transpirationem non excreto, tota massa humorum inficitur et inde omnia scorbuti symptomata facile explicantur. Neque inflammatio locum habet, quia causa laedens successiue neque vno impetu applicatur, nec relaxata solida adeo viuide in fluida agere, neque haec resoluta

\*) Essai sur les maladies, qui attaquent le plus communement les gens de mer, par G. M. \*\*. vid. Comment. horum Vol. XVI. Part. III. p. 452.

soluta adeo facile stagnare possunt; quid? quod febris, scorbuto superueniens, teste Cl. LIND funestissimum symptoma sistat. Alimenta durioris digestionis scorbutum non generant, sed, dummodo rite elaborentur, sanguinem densiorem producant, et ideo ipsum quodammodo anteuertunt, deficiente autem motu corporis omnino deprauantur, et humores inquinant. Sic etiam ingrati animi affectus, immundities, exhalationes putridae ex fundo nauium cet. nonnisi pro causis accessoriis haberi debent. Cum igitur aër humidus et frigidus frequentius in mari, quam in terra obseruetur, inde liquet, cur morbus noster illic frequentior, quam hic sit, ubi tamen, concurrentibus causis iisdem, etiam oriri potest, adeo ut in quibusdam regionibus vel fuerit, vel adhuc sit endemicus: praesertim vrbes maiores ei multum fauent, quod vel ipsius Lutetiae exemplum confirmat.

Distinctio inter varias morbi nostri species, v. c. terrestrem et maritimum, frigidum et calidum, acidum, alcalinum, muriaticum cet. fundamento caret, quod iam Cl. LIND cognouit; sed tres morbi gradus sollicite inter se discerni oportet, originem nempe, incrementum et summum denique fastigium. In primo morbus noster aegre ab hypochondriaco malo dignoscitur: symptomata primaria sunt lassitudo spontanea, dolores artuum, rheumaticis similes, motum vel leuissimum insequentes, tristitia insolita, tumor gingiuarum, nonnumquam cum dolore, appetitus naturalis quidem, sed abdomen in nonnullis paulum tensum absque dolore cum aluo segniore, cutis sicca, perspiratio sensim imminuta. In secundo ingrauescunt haec symptomata, accedentibus aliis: cutis aridissima, interdum aspera, saepe etiam paruis obsita tuberculis, maculae primo flauae, postea, cum confluunt, plumbei et nigricantis coloris; gingivae



gingivae exulceratae et sanguinem plorantes; dentes excidentes; anima foetidissima; salivatio copiosa; dolores pectoris; ulcera variarum partium saniosa, liuida carne fungosa, tacta sanguinem fundente, repleta; urina saepe pinguis et oleosa; sanguis ex vena secta difficillime exiens, resolutus et cito in putrilaginem versus, emollitio musculorum, ossium, quin ipsius calli. Tertius morbi gradus omnia haec symptomata summopere aucta sistit: os maxime foetet; debilitas summa ne e lecto quidem surgere aegros finit; interdum, hoc tentantes, syncoptici moriuntur, interdum haemorrhagiis, interdum post nimium quemcunque motum, interdum etiam solum aërem liberum hausturi. Si etiam scorbutus ipse aegros non trucidat, enecantur tamen hydrope, phthisi vel aliis morbis, inde natis. Febris ex observatione Cl. ROUPPE in principio morbi nonnumquam salutaris, ceteroquin perniciosissima est.

Recensitae ergo morbi historiae varias observa-  
 tiones Cl. Auctor subnectit. Symptomata primi  
 gradus sistunt effectus spissitudinis humorum et plethorae; prior sequitur relaxationem solidorum, quae  
 crudum chylum satis perficere nequeunt; altera  
 suppressam transpirationem: ipsa tamen fluida  
 a resorpta acriori materia perspirabili breui post re-  
 soluuntur et solida ipsa ad aliquam contractionem  
 stimulant, vnde morbus in hoc stadio vinci adhuc  
 potest. Gradus secundi symptomata aperte probant  
 resolutionem humorum, et ipsa crepitatio articulo-  
 rum a synovia resoluta, neque ideo ossium capita  
 sufficienter lubricante, pendere videtur. Diagnosi  
 morbi facile ex vno alteroque horum symptomatum  
 (neque enim omnia semper adesse oportet) cum  
 consideratione caussarum patet. De prognosi se  
 quentia notanda sunt; corpora teneriora, fibrae la-  
 xae et mollis, vel quae haud ita pridem ab alio mor-

bo conualuerunt, praecipue quae mercurialibus medicamentis tractata sunt, prae reliquis morbo nostro obnoxia sunt; in ultimo casu tamen ab usu in-  
 crassantium v. c. lactis eiusque feri facile morbus vincitur, fibris, pristinum tonum recuperantibus, modo simul reliqua auxilia applicari queunt. Qui semel scorbuto laborarunt, semper occultam quamdam ad eum dispositionem retinent. Curatio difficillima est, nisi aëris vitia simul corrigi possint, quare, his sponte mutatis, tota res ad sensum melius cedit. In genere primus gradus facile curatur, nisi vel causae perpetuo subsistant, vel remedia apta adhiberi nequeant: secundus iam maius periculum portendit, interdum tamen vincitur: in tertio curatio difficillima, imo vix vlla, licet arduum sit inuenire terminum, in quo morbus plane insanabilis pronunciari debeat. Ipsa autem curatio in duo momenta dispescitur, alterum, quomodo praeuertatur morbus, alterum, quomodo iam praesens curetur.

P. 75.

Prophylaxis in terra faciliior est, quam in mari. Aër humidus et frigidus corrigitur, accensis lignis resinosi aut suffimigiis eius indolis, perflatu liberioris aëris, contignatione pauimenti conclauium in ima domus parte et alkali fixum in eorum angulis reponendo. Sedilia et lecti ad pedis altitudinem super solum eleuata esse debent et, si necessitas vrgeat, ut somnus capiatur in eiusmodi conclauibus humidis, lectos multum eleuatos, quam longissime remotos a muro et quam proxime ad caminum collocatos esse oportet, stragulis saepius renouatis. Pedes perpetuo caute obtegendi sunt. Opus praeterea est alimentis bonae digestionis, recentibus, praecipue ex vegetabilibus antiscorbuticis; pauca aqua vtendum, sed vino, praesertim, qui chinae cortici infusus fuerit. Summus etiam usus est exercitii moderatio-  
 ris. Reliquis omnibus autem incassum adhibitis,  
 vnum



unum remedium restat efficacissimum, mutatio domicilii. In mari omnia haec auxilia difficilius, imo quaedam prorsus non applicari possunt, eoque maiori ideo attentione opus est. Ante omnia munditiei vestimentorum ratio habeatur; aeris puritati quocumque modo studeatur, suffimigiis, ventilationibus cet. Alimenta, quantum fieri potest, bonae indolis assumantur; commendatur vinum. reprobantur spiritus ardentis. Ad victum praecipue oryza p. 89. laudatur, in cuius crebriore usu causam ponit Auctor Cl., cur Itali adeo parum scorbutum obnoxii sint. Vegetabilium acidorum eorumque succi, syrupi in modum inspissati, summus usus est. Laudatur etiam cereuisia, quae si debilior fuerit, acui potest succis iam memoratis et adiumento pauxillo spiritus, ex saccharo, frumento aut vino destillati; hoc enim modo noxia horum spirituosorum indoles corrigitur, si ipsa cum mucilaginosi coniunguntur: suadet etiam cereuisia cum cortice chinae vel absinthio parata, vel ea, qua Suecicus olim exercitus usus est, decoctum nempe ramulorum teneriorum abietis rubrae vel pinus sylvestris. Vegetabilia ex alliaceorum genere insigni etiam virtute pollent, ideoque cepae, aceto vini et sale maceratae, per strata in sale communi reponendae et ita per iter asseruandae, si vero iis vesci velint nautae, sola aqua calida ablundae sunt. Acida mineralia v. c. elixir vitrioli tantos effectus non edunt, quam vegetabilia, cum partibus mucilaginosi subtilioribus coniuncta, licet in symptomatibus scorbuti non contemnendi usus sint; si ergo ipsa vegetabilibus substituere cogimur, adiungendum est sufficiente quantitate saccharum et compositio haec alimentis farinaceis immiscenda. Neque acetum prius dicta acida virtute aequat. Aqua marina scorbutum non generat, sed alium purgando in principio illius potius proficit. Ad aquam

a corruptione praeservandam varii variis modis vfi sunt; praestare tamen videtur methodus Cl. L I N D, qui eam, addito succo aurantiorum, limoniorum cet. acidulam reddit. Accedere tamen oportet cautiones in ipsis doliis implendis observandas. Sin autem corrumpitur, non sufficit sola ebullitio ad eam corrigendam, cum eadem perdat principium quoddam volatile, quod ex eo patet, quoniam talis aqua ventrem obstipat, non laxat. Methodus Cl. L I N D, aquam, excitato interno motu, ad depurationem disponendi, nimium temporis requirit, quare idem finis breviori tempore obtineri poterit, si dolio, in locum calidissimum navis collocato, sufficiens quantitas aquae bullientis immittitur, idque per vices repetitur; iniecta postmodum solutione ichthyocollae, materiae putrefactae et heterogeneae praecipitantur et aqua bonae indolis subtrahi poterit. Tandem etiam exercitium corporis summe necessarium est, ad quod praefecti navis nautas, si laboribus destituantur, omni modo incitare debent; hoc autem moderatum tantum esse oportet.

Convalescentes ab aliis morbis, qui corpus movere nequeunt, frictionibus iuvandi sunt. Progre-  
dimur nunc ad rationem medendi, in ipso morbo iam praesente adhibendam. Diversissimae indolis sunt remedia, ab Auctoribus proposita, eaque sibi saepe e diametro opposita; in eorum autem vfu determinando ad varios morbi gradus respiciendum est. In primo venaesectio, si corpus robustum, humoribus plenum, neque antea scorbutum affectum fuit, in principio instituenda est; postmodum purgantibus, acidulis potissimum, vt tamarindis, cremore tartari, manna, cum amaris, chinae cortice, rheo cet. combinatis, vel etiam salibus neutris vtendum, aut vomitus, vino scillitico movendus; applicanda etiam sunt vesicatoria, si status aegri ea postulat: et  
tum



tum ad antiscorbutica ex nasturtinorum classe, spiritus volatiles, diaphoretica acriora v. c. infusum serpentariae Virginianae, contrayeruae, chamaedryos, lignorum sudoriferorum, theriacam, camphoram, progrediendum, quibus et cardiacorum acidulorum, potus fermentati, Peruvianus corticis, absinthii aliorumque stomachicorum usus subiungatur. His enim omnibus et solidorum vires restaurantur, et fluida ipsa exagitantur, et ad celeriores circulationem disponuntur, diaphoresi simul auctiori reddita, cui scopo etiam balnea mirifice fauent. In secundo morbi gradu diaphoretica acriora, quae nimis a Cl. ROUPPE laudibus extolluntur, pariter ac sola mucilaginosae exulare debent; sed commendantur plantae saponaceae ex nasturtinorum potissimum classe et his analogae, fructus acidi eorumque succi, addito saccharo inspissati, potulenta fermentata, quorum antea iam facta est mentio, praecipue illud, quod *cidre* appellant. Suadet etiam Cl. Auctor remedium ex cremore tartari drachma vna, sacchari crudi vncia vna, resina guaiaci granis quatuor, longa trituratione inter se coniunctis, cuius quotidie vncia vna in iusculo aut potu quocumque assumatur. Rob prunorum, addito saccharo paratum, in aqua solutum, aluum apertam feruat, quo remedio ea etiam, si opus est, moueri debet; fortiora enim purgantia aliena sunt. De acidis mineralibus cum solis tum dulcificatis idem valet, quod in primo morbi gradu monitum est.

In omni praeterea scorbutico causarum eius arcendarum rationem haberi oportere, facile quisque perspicit. In gradu tertio, si quis curationi locus est, ea in principio instituatur remediis dulcibus, vntuosos, saponaceis, ubi summum laudem merentur fructus aurantium dulcium eorumque succus et potus *cidre*; resolutione humorum iis quodammodo cohibita, progrediendum ad ea, quae in secundo gra-

du morbi excitare vigorem solidorum valebant, v. c. succos acidos, cereuisiam meraciorem, potum punchet. et demum finiendum amaris stomachicisque v. c. absinthio, chinae cortice, vel in infuso cum vino aut cereuisia, vel in decocto adhibendis. Symptomata scorbuticorum praecipua sunt asthma, ulcera gingiuarum aliarumque partium corporis et dysenteria. Asthma, nisi in summo morbi gradu accedat, curationem admittit, potissimum oxymellis sciliciti vsu primum largiori, vt vomitum excitet, postea mitiori, cuius efficacitatem augent infusa et decocta ex cepis et porro. Ulcera decoctis amaris et adstringentibus tractanda sunt, imo acido vitrioli diluto; in gingiuis huic addatur mel rosatum. Dysenteria interdum reliquas euacuationes suppressas compensat et, iis restitutis, sponte cessat; nonnumquam tamen remediis opus habet. Infusum ipecacuanhae cum spiritu vini, quod Cl. ROUPPE suadet, paucissimis in casibus locum habet; commendat potius Auctor Cl. parcas doses rhei, diascordium, infusum chamaedryos et corticis Peruuiani, imo ne fortiora quidem adstringentia reformidat, v. c. infusum corticis quercus, alumen ad quatuor vel quinque grana prodosi cum conserua rosarum in bolum redactum. Transpiratione per corpus bene obtectum stragulis et vestibus, symptoma hoc etiam cessat. Forte quoque vesicatoria aequae commode tonum intestinis reddere posse putat, ac vesicae eum restituant. Tandem obseruationes quasdam generales subiungit. Scorbutus non est contagiosus. In ipsis nauibus, modo tertium gradum nondum attigerit, curari potest: eiusmodi ergo aegri summa cautione, ne sub motu vehementiori aut aëri libero expirent, in terram continentem exponendi sunt. Neque scorbutus iam adeo faeuae indolis est, quam olim, quod peruersae curandi methodo et potissimum adhibito quon-



quondam largiori spiritus vini vsui tribuendum videtur.

Cum scorbuto non solum ratione caussarum et p. 151. symptomatum, sed etiam curationis, saltem quantum primum illius gradum spectat, febres intermittentes proxime conueniunt, de quibus ergo in capite secundo, primo loco exponitur. Praemittitur theoria cum februm in genere, tum imprimis intermittentium, earumque diuersitas in plus vel minus vitiato robore solidorum potissimum ponitur, ita, vt hoc omnium minime imminutum sit in quotidiana, magis in tertiana et maxime, vna cum lentore insigniore fluidorum, in quartana. Ex hoc etiam facilior vel difficilior specierum harum curatio cognoscitur. Postmodum sigillatim de tribus his morbis agitur, in qua tamen tractatione nihil, quod ad nautas solos pertineat, inuenimus. Cautè omnino has febres tractandas esse Cl. Auctor monet, neque adeo immoderate febrifugis vtendum. In quartana pertinaciori vesip. 181. catoria, furis imponenda, commendat. Post haec, cum integrum hoc caput morbos, chronicos suo modo dicendos, complectatur, de dysenteria nautarump. 184. exponit, quae cum aequè ac iam descriptae febres a suppressa perspiratione oriatur, praemissis praemittendis, laudat diascordium tamquam anodynum et sudoriferum. Deinde ad rheumatismos progredip. 193. ditur, vbi infusa et decocta diaphoretica leniora, antimonium diaphoreticum, kermes minerale in minima dosi, embrocationes cum aqua marina calida et vesicatoria prae reliquis commendat et tandem paucissima de tumore tonsillarum et glandularum salivalium subiungit.

Caput tertium de morbis nauigantium acutisp. 197. agit. Sicut ii pleuritidi multum obnoxii sunt, ita

eadem ipsis plerumque funesta est et frequentius gangraena terminatur. Differentia inter phlegmonosam et erysipelaceam inutilis esse videtur Nostro, sed magis attendenda ea inter superam, vel quae superiorem pectoris partem et vasa subclauia afficit. et inferam, vel quae simul diaphragma et saepius etiam hepar tangit. In spuria venaesectionis et emeticorum usus a statu aegri indicari debent; praeterea autem topicis, infusis et decoctis diaphoreticis lenioribus et in grauiori casu potissimum vesicatorio, loco dolenti applicando, opus est. Eadem remedia cum debita cautione etiam in pleuritide vera valent; resolutio tamen, per expectorationem praestanda, omnimodo iuuari debet, ad quam oxymel scilliticum, adiuncto infuso calido plantarum pectoralium cum paucis melle et conueniente dosi kermes mineralis, praecipue facit: exulare autem debent pingua, ut oleum amygdalarum dulcium, sperma ceti cet. Iisdem remediis peripneumonia tractanda est, ubi tamen oxymel scilliticum principatum tenet. Febris catarrhalis itidem plerumque per expectorationem soluitur: abstinendum tamen a potu nimio. Solidis nimis debilitatis, roborantia et purgantia tonica, ut rheum, cum manna coniuncta, adhibenda sunt. In hoc autem morbo abusus venaesectionis et eorundem pinguium, quae antea repudiauerat Cl. Auctor, iterum reprehenditur.

Praeter hos acutos morbos sunt etiam tres alii, vere tantum gradu diuersi, nempe synochus simplex, febris putrida et febris putrida maligna siue pestilentialis, quam etiam febrem nauium dicere possis. Potissimum in posteriori morbo describendo copiosior est Cl. Auctor, monstrando eiusdem affinitatem et similitudinem. Cum febre nosocomiorum a Cl. PRINGLIO descripta, et plura eiusdem exempla ex temporibus bellorum nuperrime  
ab



ab annis 1740 - 48 et 1756 - 62 gestorum adducendo; inprimis autem viuidissimam, licet tristissimam simul, descriptionem huius morbi exhibet, p. 262. qui, exeunte anno 1757, per classem ducis maritimi DUBOIS DE LA MOTHE, ex promontorio Britonum reducem Brestiam delatus fuit et horrendissimas ibi strages edidit. Ex omnibus symptomatibus morbi cum causis eiusdem collatis, subiunctis simul cadauerum extispiciis, summa eius malignitas patuit; ipse tamen triplici potissimum modo considerandus erat: vel sponte natus a sola actione causarum generalium, vel sola contagione, vel vtraque simul. Inde in aliis in principio inflammatorius tantum, in aliis simul putridus observabatur, quod certe discrimen diuersam curationis methodum exigebat. Remedia praemittenda generalia, v. c. venaesectio et vomitoria, ab indiuidui cuiusvis conditione determinabantur: reliqua curatio in omnibus purgantia lenissima cum tonicis coniuncta, analeptica et cardiaca acidula, antiseptica cet. postulabat. Accedere autem omnino debebant auxilia reliqua, in nauibus omnino nonnisi difficillime administranda, v. c. mundities aegrorum, loci, in quo versarentur, opportunitas et aëris depuratio, ad quae praestanda vtilissima monita exhibentur.

Haec tamen omnia fufius recensere non possumus, quo ad caput quartum progrediamur, quod p. 320. morbos pertractat, nautas infestantes, cum in nonnullis regionibus calidis appellunt, aut in quibusdam litoribus vel portubus commorantur. Maligna huius illiusue regionis indoles nonnisi partialis causa dici potest: generalis enim ponenda est in calore aeris atmosphaerici, qui in terra continente semper maior est, quam in mari, quia solum ipsum reflectit radios solis et continuo vnam eandemque

G §

ipsis

ipsis superficiem praebet, cum superficies aquae omni momento mutetur. Ideo etiam venti, trans mare flantes, nautis salubriores sunt, quam qui a continente adueniunt. Accedit etiam motus navis ipsius, quouis temporis puncto aliam aeris columnam secantis, atque igitur subitae mutationi huius aeris multum omnino tribui oportet. Naues ergo non nisi summa vrgente necessitate appellant et tunc etiam, si fieri possit, altum mare ad debitam distantiam teneant, loca autem inter montes sita, nec liberum aerem admittentia, summopere vitent. Sin autem opus est nautis in terram emittendis, ii, si vlla ratione fieri potest, quavis vespera nauim reptant, vel si hoc prorsus impossibile fuerit, in tentorio, ad maris litus exstructo, cuius apertura illud ipsum respiciat, in lectulo pensili dormiant. Morbi, his causis orti, remediis generatim propositis indigent, potissimum autem mutatione loci, qui eos tamquam praecipua causa induxit.

p. 347. Accedimus tandem ad caput quintum idemque vltimum, de remediis conseruandae sanitatis nautarum agens. Primo loco dicitur de renouatione et depuratione aeris, vbi complura saluberrima consilia dantur de multitudine hominum imminuenda, quandoquidem Angli multo minore eorum copia tantam praestant, quantum Galli maiore; porro de nimia copia animalium, quae nonnisi ad luxum, in mensis praefectorum navis fouendum, in nauì detinentur, vbi iterum frugalitas Anglorum ad imitandum proponitur. (In genere per totum hoc caput Cl. Auctor pluris facit instituta rei nauticae Anglorum, quam Gallorum et vt hi illorum exempla sequantur, semel atque iterum admonet). Postmodum ventilator Cl. H A L E S I I describitur, eiusque constructio in icone exhibetur; porro machina  
eidem



eidem vsui inferuiens a Cl. SUTTON inuenta et a Cl. DUHAMEL nauibus Gallicis accommodatior reddita, cuius vltiorem emendationem ipse Cl. Auctor proponit, quae tamen nec paucis verbis satis explicari, nec nisi adiuncta figura, ab eodem hunc in finem addita, clarius sisti potest. Fundi nauis praeterea repurgatione crebriore multum opus est. Neque demum posthaberi debent suffimigia, putredini aeris opposita, quorsum etiam explosio tormentorum maiorum iure meritoque pertinet. Proxime cum his auxiliis mundities in naui ipsa et cum hac mundities nautarum in specie coniuncta est, ad quam isti homines inspectione praefectorum adigendi sunt. Balneorum summus est vsus; venae sectio prophylactica locum habere debet, cum appropinquando ad aequatorem ventus motum nauis non sufficienter adiuuat, neque satis calorem solis temperat. Ad nutrimentum quod spectat, alimentis digestionis durioris addi debent corrigentia ex vegetabilibus, vt allium, cepae, lauri folia, piper, acetum vini et praecipue sinapi. Legumina prius decorticari deberent, quam naui committerentur: lardum vero carnesque salitae per aliquot momenta ante praeparationem et vsum vltiorem in aqua feruente macerari, quo rancorem contractum deponant. Panis bis coctus non nisi optimam farinam frumenti ad sui praeparationem requirit, et recentius coctus breuissimo ante primordia itineris tempore in nauim deferendus est. Loco carnis salitae aequae ac recentis in nauibus summo cum fructu adhiberi possunt tabellae ex gelatina eiusdem coacta paratae, quae Anglis iam frequentissime in vsu sunt. Casei vsus, nautis Belgicis adeo familiaris, tolerandus est, isque certe carnibus salitis praefendus. Oua in naui a corruptione praeseruantur, si vernice quodam leuiore obducantur. Mos Anglo-

Anglorum, aquam, iniecta calce viua, conseruandi, laudandus est et imitandus; neque vero alia auxilia, v. c. transfusio in vas aliud, agitatio fortior, immis-  
 sio globulorum ferreorum ignitorum cet. negli-  
 genda sunt. Vinum tam purum, quam quod ab-  
 sinthio aut chinae cortici infusum fuerit, omnino  
 ad nauim bene exstructam necessario requiritur:  
 alia vero ratio est liquorum destillatorum, qui ma-  
 gis nocent, quam profunt. Animi tandem etiam  
 affectuum rationem habere conuenit. Postmodum  
 de conditionibus in naua requisitis, de modo tra-  
 ctandi aegros, de remediis in naui seruandis et iti-  
 neribus longioribus aptis, de requisitis eorum, qui  
 nautarum morbis mederi debent, differitur, vtilis-  
 simis vbique monitis inspersis, quae tamen singula  
 repetere breuitas nos prohibet: quae quidem si  
 obseruentur, nullum est dubium, quin morbi nauig-  
 antium feliciori in posterum cum successu, quam  
 haecenus plerumque factum est, impugnari et vinci  
 queant.

---



XII.

Expériences & observations sur la cause de la mort des noyés, & les phénomènes, qu'elle présentes faites publiquement à l'Ecole royale Vétérinaire de Lyon, sous les yeux des Commissaires nommés; approuvées par leur rapport & le jugement de l'Academie royale de Chirurgie. Par Mr. Mr. CHAMPEAUX & FAISSELE, Gradués Maîtres en Chirurgie de Lyon & Chirurgiens du Roi en cette ville &c. A Lyon, de l'imprimerie d'Aimé de la Roche. A Paris, chez Didot le jeune. 1768. 8 maj. alph. i. cum plag. dimidia, absque praefatione et indice rerum contentarum.

i. e.

Experientiae et observationes super causa mortis eorum, qui in aqua submersi perierunt, phaenomenisque ab eadem oblatis, publice in schola regia veterinaria, quae Lugduni Galliae est, factae coram Commissariis denominatis, approbatae horum relatione et iudicio Academiae regiae chirurgicae. Auctoribus Cll. CHAMPEAUX et FAISSELE cet.

Causa, quae huic operi occasionem dedit, adeo celebris fuit, tantoque studio agitata, ut nos certe vituperium meritori videamur, si nullam huius libri mentionem faceremus, praesertim cum nulli dubitemus, scientiae nostrae et ei inprimis parti, quae ad forum iuridicum applicatur, multum inde lucis affulsurum. Puella octodecim annorum, Lugduni die 25 iunii 1767 hora nona vespertina disparuit,

ruit, et postmodum die 30 eiusdem mensis cadauer ipsius, a patre aliisque cognitum \*), ad nouem miliarium Gallicorum distantiam in Rhodano prope villam Condriacum (Condrieu) inuentum et, postquam per dimidiam horam libero aëri expositum iacuisset, ac deinde in arena sepultum fuisset, postmodum praesentibus iudicibus a chirurgo huius villae GIRAUD inspectum et inde relatum est, linguam ad duos minimum pollices extra os propendisse, circa collum obseruatas esse depressiones in carnem penetrantes et contusiones laqueo adscribendas; testes, qui cadauer ex aqua extraxerunt, confirmarunt, depressionem in carne circa collum fuisse figurae irregularis aut rotundae, et visum esse productum a laqueo aut catena. Post haec cadauer humatum est, sed die 10 iulii denuo effossus et a viris, quibus praesertim librum debemus, sectus, ubi caput sine tegumentis, cranium integrum, faciem, collum, extremitates superiores et pudenda externa, quae sine pilis erant, vermibus depasta, extremitates inferiores mire inflatas et cuticula fere destitutas, pectus contra et abdomen non mutataprehenderunt; vasa encephali sanguine turgidissima, cor in naturali ferme statu, pulmones collapsos maxime, et in interioribus illorum aquam nullam; viscera abdominis in statu naturali, ventriculum massa viridescente repletum, quae videbatur esse coena ex herbis recentibus, vna circiter ante mortem hora sumpta; ex quibus hi viri colligebant, feminam istam mortem violentam subiisse et mortuam in aquam iniectam esse. Magistratus

\*) Recentius tamen euulgatum scriptum, cuius iuriconsultus ELIAS DE BEAUMONT Auctor est, ideo totum controuersiae statum inuertere annititur, quod cadauer istud non fuerit feminae supra nominatae; quare, corpore delicti incerto reddito, omnem inquisitionem frustraneam fuisse, probare tentat.



stratus ergo varios vtriusque sexus homines, in quas aliqua cadebat suspicio, comprehendi iubebat, quorum defensores, viri iuriumconsultissimi BLOND et LOISEAU, vrgebant insufficientiam conclusionis, ex praemissis supra indicatis petita. Iam igitur Auctores nostri primo epistolam ad Cl. LOUIS super hac materia typis exscribendam curabant; quae cum tres excitasset aduersarios, omnes quidem Lugdunenses, nobis tamen incognitos, P. et P. R. chirurgos et V. medicum \*), simulque distributa essent omnia prioris ad Cl. LOUIS epistolae exemplaria, nunc Auctores nostri praesenti volumine integrum commercium litterarium tradunt, quod ipsis cum celeberrimo hoc viro intercessit et cuius vltiorem recensionem nunc suscepturi sumus.

Prior epistola ad Cl. LOUIS, primo loco statum p. 2. causae exponit et postmodum examinat, quaenam sint distinctionis notae in cadauere eius, qui in aqua submersus periit et eius, qui mortuus demum in eam fuit iniectus? quem in finem multa experi- p. 22. menta facta sunt in animalibus, potissimum in canibus, qui in aqua, vel pura vel varie tincta, submersi sunt, vel laqueo suspensi, vel ictu inflicto interemti, vel inter pannos suffocati et mortui demum in aquam proiecti. In iis, qui in aqua perierant, constantissime reperta est aqua, in spumam resoluta in bronchiis et pulmonibus, epiglottide erecta, cerebro  
vix

\*) Hic tamen procul dubio idem est, qui p. 261. expresse nominatur, Cl. VITET. Tituli horum libellorum sunt. Réponse de Mr. P. R. . . . Gradué en l' Université de Paris et Maître en Chirurgie de la ville de Lyon, à la lettre de Mr. Mr. FAISSE & CHAMPEAUX, sur le rapport, qu' ils ont fait des causes de la mort de la prétendue fille R. Secundi: Consultation de Chirurgie ou examen d' un rapport Juridique par Mr. P. . . . Chirurgien Gradué &c. Tertii: Dissertation sur les noyés, par Mr. V. . . . Méd.

- vix mutato; in ventriculo parum vel nihil aquae. Vltimum vitae momentum in inspiratione vehemētissima positum erat. Animalia e contrario suffocata et mortua in aquam iniecta, pulmones offerebant collapsos, at e contrario vasa cerebri sanguine maxime turgentia. Humanum etiam cadauer, quod
- p. 28. per 24 horas aquae immersum fuerat, nullum eius vestigium in ventriculo, bronchiis aut pulmonibus obtulit. Friuole ergo aduersarii obiiciunt, quamuis aqua in corpus demortuum penetrare nequeat, fieri tamen posse, vt homo viuus in aqua pereat sine eo, vt ipsam hauriat. Cum ergo de mortis violentae genere agendum sit, quaeritur: num vestigia strangulationis, quae chirurgus GIRAUD in collo cadaueris inuenerat, antequam istud a putredine et vermis absumeretur, vere id probent, quod probare
- p. 46. debebant? Aduersarii dicebant, totum cadauer maxime inflatum fuisse, adeoque collare sericeum, turgescētia hac breuius redditum, hos effectus edidisse, idque eo magis, quia periscelides eadem ratione maculam nigram produxerint. Sed facile est,
- p. 49. inuenire discrimen inter effectum laquei vel cuiuscumque instrumenti, partibus ligandis viui vel mortui corporis applicati: in hoc enim vestigium quidem aliquod remanet, sed non adeo pertinax, neque cum contusione atque ecchymosi coniunctum, quod olim iam celeberrimus aevi sui DEVAUX ostendit. Neque Auctores nostri vestigium vllum a periscelidibus inductae laesionis animaduenterunt.
- p. 52.
- p. 57. Responso Cel. LOUIS singula litis huius momenta repetit et primo certitudinem corporis delicti extra omne dubium ponit. Putredinem coërcuit sepultura in arena, quam summum aduersus illum remedium prophylacticum esse GARMANNUS probauit. Inspectio chirurgi GIRAUD iam satis certe probat, feminam istam occisam esse et postmodum aquae



aquae iniectum: idem tamen etiam disquirere potuisset, num ipsi forsan stuprum violentum illatum esset, quo de causa homicidii clarius constaret. Mutatus cadaueris putrescentis status Auctoribus nostris nihil permisit praeter lustrationem partium internarum: inde nihil absolute statuere poterant de genere mortis, sed sufficebat demonstrasse, eam non fuisse positam in suffocatione sub aqua. Experimentis adductis Cl. LOUIS maximam fidem tribuit, quippe quae cum iis, quae ipse olim instituerat, exactissime conueniant: recenset postea sententias Auctorum, qui cum ipso consentiunt, aquam spume-  
P. 75.  
scentem in bronchiis et pulmonibus praesertim signum suffocationis in aqua esse, virorum Cll. SENAC, HALLERI, EVERS, DE COURCELLES, ROEDERERI, et aperte in nostrorum Auctorum partes descendit.

Secunda epistola ad Cel. LOUIS maximam par-  
P. 81.  
tem totius operis complectitur, vbi primo mentio fit trigae illius scriptorum in aduersam partem editorum, cuius supra mentionem fecimus: in genere hic monemus, nos acriter doluisse, in tam ardua re, vbi dissensus modestus isque doctis et ingenuis viris, dignus certe multo plus vtilitatis allaturus fuisset, vtrimque tamen iniuriis, quinimo conuiciis et calumniis non parci; quod quidem omnes boni eo aegrius nobiscum ferent, quo minus vllum partium studium nos trahere aut irretitos tenere potest, sed veritas sola, eaque nuda, absque eorum, qui secus sentiant, illusione et obtreptione, quaerenda sit atque amplectenda. Verum haec obiter. Ne vllum con-  
P. 85.  
tra experimentorum fidem dubium moueri posset, in schola veterinaria, praesentibus commissariis in eum finem denominatis, ea capta sunt admodum copiosa et circumstantiis multum variatis, quo, quantum fieri posset, obiectionibus quibuscumque ob-



- p. 91. viam iretur. Relationes horum experimentorum prolixissimae sunt et ad verbum hic loci transcriptae,
- p. 110. ne fidei eorum quidquam derogari posset. Aduersarius P.R. postulauerat, vt, insciis Aucto-ribus nostris, duorum canum alter in aqua suffocaretur, alter strangulatus in eam iniiceretur, post quinque dies vterque corpore inuerso in tecto ad plagam meri-dionalem suspenderetur, et tunc Auctorum nostro-rum examini subiiceretur, quod etiam post duodecim dies, licet summe foetentibus cadaueribus, factum est, et differentia inter suffocatum et suspensum ex statu pulmonum et encephali clarae luci exposita.
- p. 124. Ligaturae fortes in femore et crure cadaueris huma-ni depressiones distinctas satis induxerunt, sed, licet laqueis per quinque dies ibi relictis, colorem cutis non mutauerunt: eadem experimenta in cadauere alio facta, quod postea duodecim dies aquae immis-sum fuit, eundem fere effectum monstraerunt, lingua a collari sericeo, quo collum constrictum fue-rat, neque inflata, neque extra os emissa, et cuti su-pra et infra ligaturam corrugata quidem et plicata, coloris tamen prorsus non mutati. His praemissis, Auctores nostri ad tria momenta diiudicanda sese accingunt: primo, *feminam, de qua agitur, mortuam demum in aquam proiectam esse; secundo, illam unam circiter ante mortem horam comedisse herbas virides; tertio, eam morte violenta periisse.*
- p. 134. Ad primum momentum declarandum variae quaestiones pertinent. 1. *Estne praesentia aquae spu-mescentis in bronchiis caussa mortis in aqua submerso-rum?* Mechanismus pectoris et pulmonum inspira-tionem etiam praeter voluntatem nostram exigit: sub aqua ergo neque aër egredi ex pulmonibus, ne-que eosdem intrare potest, sed aqua intrans cum aëre, exitum moliente, commiscetur, simulque cum muco, superficiem internam canalium aëreorum lu-bricante,



bricante, vnitur, adeoque spumam istam sistit in pulmonibus et bronchiis eiusmodi cadauerum reperiundam. Huius ergo praesentia cum pulmones impediat eodem modo sese expandere, ac si aer elasticus intrasset, destruitur respirationis mechanismus, et subsequitur suffocatio. Falsum ergo est, quod vnus p. 139. ex aduersariis vrget, in quocumque mortis genere expirationem vltimam esse corporis actionem; neque sermo popularis hac in re probationis esse loco potest. Neque haec aqua sufficiens est ad musculos, glottidem claudentes, adeo irritandos, vt haec ingres- p. 146. sum eius impediat; minime enim et in iis subiectis, quae ex suffocatione in vitam reuocantur, copia ipsius determinari poterit, cum vomitu reiecta misceatur cum materiis ex ventriculo egredientibus et salua, quae tum copiosior excernitur. Haec autem p. 149. spuma cum similibus fluidis, a morbo productis, confundi nequit: huius enim in pulmonibus sedes facile ex ipsorum dissectione patuit. 2. *Potestne haec p. 151. aqua spumescens longo post mortem tempore adhuc adesse?* Hoc ex experimentis captis satis clare iam patet: sectio autem cadaueris, post nonaginta quinque a suffocatione dies ex aqua extracti, rem extra omne dubium ponit, in quo notemus adhuc, inuentam esse in ventriculo massam chymosam ex pluribus particulis radice solani tuberosi compositam. Neque haec aqua spumescens transsudare potest, cum cartilaginea et membranaceo ligamentosa ipsorum bronchiorum structura illud prohibeat, et ipsa illius indoles viscosa ab admixto muco bronchiorum profecta obstat. Idem de egressu eius per os sentiendum est. Fermentationem eandem non destruere exemplum cadaueris istius probat; neque p. 162. resorptio quaedam locum habet, quippe quae in corpore demortuo nulla est. 3. *Estne defectus huius spumae signum certum, personam hanc non esse viuam*



- submersam?* Hoc itidem experimenta facta, et magis
- p. 166. adhuc sectio cadaueris affirmant, quod nouemdecim post mortem dies ex aqua extractum demonstravit, mortem subsequutam esse post laesiones capitis et
- p. 170. constrictionem colli; alia huic similis sectio eiusdem tenoris est. Provocant aduersarii ad fetum, in liquore amnii natantem, quippe qui sine inspiratione in bronchia eius ingrediatur: liquor autem is non est amnii, qui collapsa sine inspiratione bronchia intrare nequit, sed mucus ex glandulis secretus, ob ipsum
- p. 178. respirationis defectum copiosior. Collapsa itidem sub articulo mortis bronchia ingressum aquae quovis modo arcent, et si et is possibilis esset, tunc tamen aqua limpida apparere deberet, non spumescens.
- p. 180. Asthmatici sectio ab aduersariis obiecta facile refutatur, quia tunc certe sedes morbi clare satis patebat. Eadem est ratio obiectionis subtilissimae de vomica: supponendus enim est aeger eo ipso momento, quo vomica rupta fuerit, in aquam iniectus, et antequam inspirare potuerit, mortuus esse; vix tamen vomica rupta ne minimum quidem temporis ad inspirandum relinquit: praeterea haec omnia pulmonum inspectio detectura esset. Con-
- p. 186. vulsio, vti vrgent porro aduersarii, omnes musculos oris ita constringere potest, vt inspiratio intercipiatur: at tum ea per nares fiet. Verum omnes hae obiectiones in praesenti casu sponte cadunt, cum nullum umquam exstiterit indicium, feminam istum morbo pulmonum laborasse.
- p. 191. Accedimus ad secundum momentum, eam vna circiter ante mortem hora herbas virides comedisse. Nec fermentatio, nec putrefactio chymosam hanc massam adeo subito inuvertere potuerunt. Obiecerunt aduersarii, obseruationes, hunc in finem in experimentis factas, ideo non mereri fidem, quod homo omnium animalium citissime in putredinem abeat:



cat: verum haec assertio quotidiana scholae veteri-p. 193.  
nariae experientia refutatur, quae equum omnium  
citissime putrescere docet. Chemicum examen chy-  
mi eiusmodi, quod aduersarii suadent, insufficiens  
est, imo impossibile. Digestio longius requirit tem-  
pus, donec absoluator, nec sine adiumentis mecha-  
nicis partium solidarum potest effici; fermentatio-  
nem autem putridam per longum temporis spatium  
abesse posse, experimenta euincunt. Bilis admissio p. 200.  
massae huic colorem viridem conciliare non potuit,  
partim quia sponte ingredi ventriculum nequit, par-  
tim quia, etiamsi hoc factum esset, flauum potius  
quam viridem colorem productum fuisset. Solutio  
metallica potius rubrum aut nigrum, quam viridem  
induxisset, ipsumque ventriculum corrosisset, qui  
posterior effectus etiam sequuturus fuisset a venena-  
ta assumtorum vegetabilium indole.

Tertium momentum restat declarandum, femi-p. 209.  
nam nimirum, de qua quaeritur, morte violenta  
periisse. Probationes huius asserti ex inspectione  
externa et interna cadaueris desumendae sunt. Ad  
priorem quod attinet, quaerendum est: 1. *Anne li-  
gatura corpori viuo applicata necessario producat de-  
pressionem pro ratione violentiae adhibitae plus minus  
insignem, semper coniunctam cum inflatione et ecchymosi  
supra et infra ligaturam?* quod affirmatur; in stran-  
gulatis effectus hi semper euidentiores sunt, quam  
in suspensis, et maxime in ea regione, vbi ambo fi-  
nes laquei contorti inter se fuere. 2. *Possuntne de-* p. 218.  
*pressiones quaecumque, post mortem factae, inducere in-  
flationem, contusionem et ecchymosin?* negatur, et ad  
ea, quae in epistola prima dicta sunt, prouocatur.  
Cum autem aduersarii compressioni per collare insi-  
stant, ad maculas nigras in dorso cadauerum vel  
aliis, quibus ea incumbunt, partibus conspiciendas  
prouocant Auctores nostri, hasque citius oriri in iis p. 222.

- corporibus, quae per longius, quam quae per brevius tempus aegrotarunt, demonstrarunt, adeoque stasi sanguinis in viuo iam corpore factae adscribunt. Quantum autem efficiant compressiones et ligaturae in mortuo corpore, observationes in cadaueribus factae euincunt.
- p. 229. 3. *An depressio semel in corpore viuo facta post mortem deleri potest?* Omnino, sed non nisi deleta simul forma naturali partis affectae, ideoque sola putrefactione totali. Neque exsiccatio, neque injectio in aquam, neque inflatio, neque intumescentia sub incipiente putredine eam extinguunt.
- p. 231. In museo Cel. s u e et in officina pharmaceutica Lazaristarum Parisiis exstant cutes integrae, praeparatae, infarciendo molem formamque naturalem adeptae, in quibus vestigia laquei, regioni colli firmissime impressa, conspiciuntur.
- p. 243. 4. *Numne partes colliculae et contusae citius reliquis in putredinem abeant?* Affirmatur, quia ipsae iam in statu quodam destructionis sunt. Abdominis tegumenta omnium citissime in putredinem vergere aduersarii obiiciebant, et mirabantur, in praesenti casu extremitates inferiores iam putredine tactas, superiores aequae ac col-
- p. 247. lum, faciem et cranii tegumenta ab eadem pene consumptas fuisse; sed causa in eo sita est, quod haec partes liberiori radiorum solis contactui expositae fuerunt, reliquae vero vestimentis obtectae. In ipsa autem ad putredinem maiori vel minori propensione distinctio admittenda est inter abdominis tegumenta et viscera eiusdem: haec enim, ut omnes partes membranaceae, difficillime putrescunt, praesertim cum aer ex fermentatione contentorum euolutus per anum magno saepius cum strepitu exeat.
- p. 250. 5. *An lingua turgida et extra os prominens potius signum praebeat submersionis, quam strangulationis aut alius cuiuscumque mortis violentae generis?* Prius negatur ex observationibus in submersis factis et silentio



tio omnium Auctorum: posterius in strangulatis  
constanter affirmatur, additis plurium Auctorum p. 279.  
testimoniis; potest tamen etiam effectus esse vene-  
ni. Alterutram tamen causam vel praesentia vel p. 282.  
defectus vestigiorum laquei circa collum euincunt. P. 285.

Probationes, ex consideratione partium interna- p. 293.  
rum petendae, partim ad cerebri, partim ad pulmo-  
num conditiones pertinent. Aduersarii duobus mo-  
mentis insistebant: 1. cerebrum in tanto temporis  
interuallo mutatum esse et minus idoneum ad iu-  
dicium de mortis genere inde sumendum; 2. vasa  
cerebri in iis, qui in aqua pereant, turgidissima re-  
periri. Prius refutant experimenta in canibus, quo- p. 297.  
rum cerebrum post viginti tres dies, cum cadauera  
putrescerent, in statu naturali inuentum fuit. Al-  
terum refutatur omnibus experimentis ideo captis;  
in duobus tantum sinus in basi caluae pleniores  
erant solito, neque tamen vasa cerebro propria. Ali-  
ter res sese habet, cum homo, in aquam irruens, ca-  
pite ad corpus durum impingit; sed tum causa  
huius effectus facile conspicitur. Neque ebrieta-  
tem impedire satis posse, quo minus effectus sub-  
mersionis in pulmonibus appareat, neque nimium  
sanguinis ad cerebrum impulsus producere, cum  
experimentum in cane, tum sectio humani cadaue-  
ris probat. Neque frigus insigne aquae in pulmo- p. 304.  
nes ingressum impedit, etsi animal immediate ex lo-  
co calidissimo in eam immittatur. Cum ergo in fe-  
mina saepe commemorata sanguis vasa cerebri maxime p. 312.  
distendens pro causa mortis haberi debeat, nec vini  
aut veneni effectibus (vtrumque enim in ventriculo  
detectum fuisset), nec contusionibus vllis, quippe de  
quibus relatio chirurgi GIRAUD prorsus silet, ad-  
scribendus; sola strangulatio aut suffocatio superest,  
absentibus signis submersionis ex pulmonibus re-  
petendis.

- p. 320. His conclusionibus assensum praebet collegium chirurgorum Lugdunensium, quod testimonium itidem ad verbum hic exscriptum est. Et haec quidem omnia constituunt secundam epistolam ad Cel. LOUIS scriptam, quem rogant Auctores, ut totam litteram academiae regiae chirurgicae proponat. Haec
- p. 355. examen huius rei commisit viris Cll. BORDENAVE et GOURSAUD, quorum relatio aequae, ac iudicium totius academiae Auctoribus nostris fauet.
- p. 365. Vltimam totius voluminis partem epistola Cel. LOUIS sistit, quae vero nihil propemodum, nisi congratulationes, continet, vltioreque commemoratione non indiget.

### XIII.

Memorie sopra i muli di varii Autori. In Modena, 1768. Nella stamperia di Giovanni Montanari. 8 maj. pl. 4. cum praefatione plag. dimidiae.

i. e.

Variorum Auctorum tractatus de animalibus neutris.

**L**ibellus hic, ab amico Cl. SPALLANZANI editus, quinque diuersos tractatus continet.

- P. 3. I. Cl. BONNETI de hoc argumento tractativncula, ad Cl. SPALLANZANI missa, repetit, quae in consideratione corporum organicorum \*) tradiderat. Quae cum potissimum disquisitionem illius animalis spectent, quod ex asina et tauro, aut ex tauro et equa nascitur, Italis *bosmulo*, Gallis *jumar* dictum, et in Pedemontio satis frequens: optat, ut ab anatomico exercitato et pingendi facultate pol-
- lente

\*) Succincte haec indicata sunt in Comment. nostr. Vol. XIII. P. I. p. 38.



lente dissectio eius suscipiatur; inprimis vt organo-  
rum digestionis et generationis, et ex partibus exte-  
rioribus capitis, ossis sacri et extremitatum, deni-  
que organi vocis ratio habeatur, cuius vltiorem  
etiam in asino et mulo distinctionem a Cl. HERIS-  
SANT expectare deberemus, cum ille huius partis  
in animalibus disquisitioni adeo egregiam operam  
impenderit \*). Vota Cl. Auctoris maximam par-  
tem impleuit Eminentissimus DELLE LANZE, p. 11.  
romanae ecclesiae pater purpuratus, cum animal  
tale ex vallibus Pedemontii accersitum Augustae  
Taurinorum sub directione duorum anatomicorum  
habilissimorum secari iuberet; vnicum desideraba-  
tur, nempe relatio de ortu eiusdem. Ipsum autem  
animal nil erat, nisi mulus ordinarius, qualis ex equo  
et asina gignitur. Inde sententia virorum Cel. BUF-  
FONII et HALLERI robur acquirit, qui de ex-  
istentia eiusmodi animalium dubitant: cum vero ex  
altera parte in diario Gallico, *l'Avant-Coureur* di- p. 13.  
cto, anatome eiusdem animalis per Cl. BOURGE-  
LAT facta occurrat, in qua expresse dicitur, ventri-  
culus simillimus fuisse equino, sed multo maior;  
dubia omnino tota res remanet, nonnisi repetitis  
experimentis dilucidanda.

2. Cl. SPALLANZANI respondet Cl. BON- p. 16.  
NETO, referens, professorem illustris vniuersita-  
tis in Italia iam in eo esse, vt disquirat, num, quod  
proditum fuit a quibusdam, ex anate et gallo vere  
prodeat animal hybridum, pedibus patris instru-  
ctum. Praesertim inuitat ad capienda in insectis ex-  
perimenta: sunt nempe ex phalaenis quaedam, qua-  
rum mares coitus sunt appetentissimi, feminae au-  
tem eo pigriores. Phalaenae ergo feminae ex eru- p. 23.  
cis vlmi coniungi deberent cum phalaenis feminis  
ex bombyce, quo hae, illarum quasi effluuiis imbu-

H 5

tae,

\*) vid. Comment. horum Vol. VII. p. 268.

- tae, phalaenas mares ex vlmi erucis, vtpote salacissimos, eo facilius allicerent; quia porro corpora phalaenarum feminarum vlmi pilis copiosissimis obsita sunt, in aliqua horum pilorum copia circumuolui
- p. 27. possent phalaenae feminae ex bombyce. Possent et aliae phalaenarum species ita inter se commisceri; eligendae tamen essent eae, quae, simulac natae fuerint, illico ad propagationem sui progrediuntur.
- p. 29. Lumbrici terrestres, quorum diuersae inter se species diuersum solum inhabitant; cochleae et limaces, omnes iam hermaphroditī, sed vere distinctas species offerentes, iisdem experimentis subiici possunt: requiritur tamen summa dexteritas in animalculorum horum sectione instituenda.
- p. 31. 3. Cl. HEBENSTREITII epistola ad BRUHLIUM Comitem (quem editor in praefatione acrius iusto perstringit, cum non Henricus, Saxoniae olim Minister primus, sed frater eius Iohannes Adolphus, supremus equitum magister, eam rem direxerit) iterum hic typis exscripta est, cum in Italo idiomate
- p. 37. nondum exstitisset. Causa sterilitatis in maribus defectui animalculorum seminalium, vbi, in notula addita, editor inuehitur in HEBENSTREITIUM, quod animalculis istis pedes et caudas adscripserit, cum tamen priores negauerint prorsus, et de posterioribus adhuc dubitent physici; in feminis infertioni vrethrae in vaginam \*), defectui ouulorum in ouariis, viis ex his in vterum angustissimis, et denique structurae vteri ipsius, non adeo compactae, sed tenuiori et vesicae vrinariae aemulae, tribuitur.
- p. 42.
- p. 49. 4. Epistola Cl. KLEINII, annotationes ad epistolam HEBENSTREITII continens, quae itidem nunc primum in linguam Italicam versa prodit. Ob-
- seruata

\*) Eadem tamen structura equas gaudere, nuperrime demum Cl. BOURGELAT in elementis hippiatriae docuit.



seruata tantum generaliora sistit, non ad praecipuum epistolae subiectum pertinentia, et licet nulla ex tribus hypothesibus de generationis negotio Cl. Auctori placeat, maxime tamen systema ouulorum impugnat.

5. Animaduersiones Cl. SPALLANZANI sup. p. 58. per binas praecedentes epistolas. In obseruationibus de corporibus organisatis annotauerat Cl. BONNET, displicere sibi in HEBENSTREITII epistola, eum particulas se mouentes in spermate non habere pro veris animalibus, et dixisse organa generationis in mulo aequae bene facta esse atque in equo aut homine: at defectus animalculorum in spermate certe pendet a vitio quodam organorum, praeparationi eius inferuentium, quod omnino ita potest esse comparatum, vt omnem oculorum aciem eludat. Cl. BONNET memorat duo fragmenta ex epistolis Cl. DE REAUMUR, altera ad Cl. TREMBLEY, altera ad se ipsum directa, in quibus vera vita animalculorum infusionis, eorum propagatio, incrementumque successuum probantur. Neque prorsus inaudita esse exempla propagationis animalium hybridorum, aues testantur ex Canariensi et fringilla progenitae, ex obseruatione Cl. SPRENGEL, referente Ill. HALLERO in epistola, ad Cl. BONNETUM scripta, et huic ipsi operi iam commendato inserta. KLEINII iudicium Cl. BONNETO non satis exactum videtur; et multum omnino lucis theoriae generationis ex ouo accessit experimentis Ill. HALLERI de formatione pulli.

---

XIV.

Verhandelingen uitgegeeven door de Holland-  
sche Maatschappye der Weetenschappen te  
Harlem, VIII Deel, 1 Stuck, 1765. 2. Stuck  
1765. te Harlem. 3 alph. 7 pl. tab. aen. 10.

h. e.

Commentarii Societatis scientiarum Harlemen-  
sis Tom. VIII. P.I. II. 8.

p. 1. 1. *Commentarius de munitionibus irregularibus,*  
Auctore Cl. N. YPEY.

p. 13. 2. *Commentarius de nonnullis ad astronomiam*  
*pertinentibus,* Auctore EODEM.

p. 33. 3. *Specimen theoriae molendinarum, ab aqua acta-*  
*rum,* Auctore Cl. I. F. HENNER T.

p. 169. 4. *Singularem deformitatem in sectione fetus re-*  
*pertam,* refert Cl. VAN GEUNS, cui accedunt quae-  
dam, quae ad herniam thoracicam spectant. Parisiis Cl.  
Auctor 1760 fetum, partu difficili mortuum editum  
secans, in abdomine exiguum tantum intestinorum  
tenuium partem, visceribus fere omnibus deficien-  
tibus, inuenit. Desiderata in pectoris latere sinistro,  
nec non viam, qua adscenderant, in diaphragmatis  
sinistra parte detexit, vbi stratum tantum angustum

p. 175. musculosum, cum magno hiatu conspiciebatur. Lo-  
bum hepatis sinistrum in pectore, dextrum in abdo-  
mine reperit. Ventriculi fundus sursum, orificia  
deorsum spectabant, cum duodeno ad renem dex-  
trum continuato. Lienis sedem obliquam et ven-  
triculo inferiorem reperit; cauum vero superstes  
intestina replebant, excepto pulmone sinistro, qui  
ad



ad supremam pectoris partem protrusus erat. In dextro latere mediaſtinum cartilaginibus coſtarum affixum, cor ſitu, vt in brutis, erecto, cum vasis eius naturaliter poſitis vidit. Pulmo vero dexter retro cor fere abſcondebatur. Huius vero viſcerum ab- p. 182.  
dominalium in thoracem prolapſus duas Cl. Auſtor ſtatuit cauſſas, alteram ex mala formatione fetus, integro diaphragmate, quam *aberrationem* dicunt; alteram ex laeſo vel deficiente diaphragmate, ſub nomine *herniae* cognitam, ad quam hoc exemplum *herniae thoracicae* Noſter refert. Vtriusque cauſſae veritatem exemplis probat, iconemque minus concinnam, adiicit. Colligit Cl. Auſtor, herniam thoracicam, vt vitium in vtero iam delineatum, omnino accidere, cum aſthmate vero ſemper et morte, ſi infans iam reſpirauerit, eſſe coniunctam.

5. *Commentatio, qua ex ipſa arte aequationum* P. 197.  
*cubicarum cauſſae demonſtrantur, cur pro tribus aequa-*  
*tionum radicibus formulae uniuerſales dari nequeant,*  
Auſtore Cl. I O S. BLASSIERE.

6. *Poſſibilitatem perpetui mobilis demonſtrat* Cl. P. 221.  
I O. DE GORTER.

7. *Obſervationes de fallacia vulnerum capitis, tri-* P. 257-  
*bus exemplis declaratae,* Auſtore Cl. I A C. VAN LIL.  
Serua viginti annorum, ex alto ad latus dextrum lapſa, vulnus digitum latum, a futura coronali ad alveolos continuatum, cum magna haemorrhagia ſibi contraxit. Noſter, pulſu paene nullo percepto, aegram, paucis horis poſt, inter conuulſiones, quaedam murmurantem, particula ſubſtantiae cerebri corticalis prominente diſſecta, nulloque alio praeternaturali ſymptomate deprehenſo, conſueto more deligauit: ſymptomatibus ad decimum diem, praeter  
ter



- p. 261. ter debilitatem, nullis conspicuis, conuulsiones in latere affecto apparebant, paralyfi relicta. Particulam
- p. 262. ossis temporum multis acuminibus sub os temporum protrusam Noster remouit, ex quo symptomata peiora facta, conuulsionesque cum interuallo trium horarum, vbi aegra bene se habere videbatur, ad vigesimum diem continuatae, eam interfecere.
- p. 263. Abscessum, capite aperto, ex eadem particula, vtramque meningem perforante, formatum in cerebro, cum duabus vnciiis puris detexit. Admirandum est, aegram, ante decimum diem, inflammatione et abscessu iam formato, nullis grauibus affectam fuisse symptomatibus, ex quo Cl. Auctor colligit, sanationem particula hac occulta detecta, trepanoque remota,
- p. 266. omnino contingere potuisse. Remix trigenarius, ex instrumento acuto, in cranium eius ad futuram lambdoideam ex alto naus loco delapso, vulneratus, cum magna haemorrhagia, symptomatibusque confuetis afflictus est. Noster praeter paruum vulnus et dolorem nil percipiens aegrum consueti more tractauit. Aegro post, quartum diem de doloribus pectoris quæsto, laesionem Noster disquirens, corpus durum, duram matrem valde premens detexit; sed aeger, symptomatibus statim peioribus factis, mortuus est antequam particula trepano posset extrahi.
- p. 270. Particula haec tribus orificiis per trepanum exempta est, nullo sanguine supra meninges effuso, qua tamen post laesionem statim extracta, aeger seruari potuisse Cl. Auctori videtur Pleura valde inflammata, sed gangraena nondum foedata erat. Iuuenis octodecim annorum, Nostro traditus, partem integumentorum ossis bregmatis sinistri plane destructam cum inueterata cicatrice habebat, laborans surditate et eiusdem lateris paralyfi. Cognouit Cl. Auctor, aegrum ante annum in sentinam naus lapsum a chirurgo vero, epilepsia relicta, restitutum esse. Destructa



Et a parte remota, vnciae duae puris exierunt, aegerque, cortice Peruviano interposito, melius se habuit. Fungo propullulante resecto, cataplasma imposuit; symptomatibus vero peioribus redditis, fungoque iterum maiore excrecente, aeger periit. Cranium apertum in affecto loco destructum, ipsiusque cerebri partem corruptam vidit. Ex hoc exemplo concludit Cl. Auctor curationem vulnerum capitis, ex causa incognita, raro succedere. p. 284.

8. *Celer progressus aphtharum gangraenosa* p. 291.  
*rum in ore infantum in duobus exemplis.* Auctore EODEM. Puella sexennis, facie tumida, p. 294.  
 molli, gingivis maxillae inferioris nigris, spongiosis, cum insigni foetore; apice linguae pallido, carne maxillae inferioris valde turgescens, et ad tactum sanguinem plorante cet. summa denique debilitate cum continuis febris insultibus laborabat. Externe Cl. Auctor elutionem, interne antiscorbutica, excepto cortice Peruviano, cuius usum, in hoc morbo, tum ignorabat, adhibuit, sed nullo, praeter foetorem imminutum, fructu. Hinc ad operationem accedens p. 297.  
 maxillae superioris latus dextram, sinistri lateris duas tertias, dentibus euulsis, exemit; inferioris maxillae dextrum latus. Adstringente elutione cet. usus, p. 299.  
 postero die, partibus aegris, colore viuidiore conspicuis, ossa deperdita, ob continuam oris humiditatem Cl. Auctori non videbantur restitui posse; septimanis tamen quatuor post, os internum nova iterum membrana obductum, formatum deinde calum et paulo post maxillas fere restitutas vidit, superiore paulo retrorsum flexa cum tribus dentibus incisoriis rursus prodeuntibus. Infans quinque annorum, variolis confluentibus superatis, maculam purpuream, in labio superiore relictam, habebat, gingivis ad dentes incisorios nigris. Externis et internis frustra

frustra adhibitis, macula haec et totum labium cum parte faciei ad nasum sinistri lateris, gingivis, nigrae conspiciebantur, dentibus fere omnibus sponte elabentibus. Decoctum chinae sine fructu dedit. Sphaecelo ulterius progresso, naso inferiore et gena dextra infestatis, os internum plane destructum est, ita, ut nil amplius posset ingeri, et aeger quinto die exspiraret.

p. 307. 9. *Luxationem femoris ex causis internis*, obser-

p. 309. vauit Cl. IAC. VAN DER HAAR. Tres statuit

Cl. Auctor causas internas, duas simplices et vnam compositam. Prima est morbus quicumque in acetabulo natus, caput femoris, post aliquot tempus ex acetabulo protrudens. Altera est conuulsio, quam vero in patella tantum, nunquam in femore, Cl. Auctor observauit. Per compositam intelligit primor vim externam, ex qua deinde inflammatio, exulce-

p. 312. ratio et ipsa tandem luxatio sequatur. Inter causas

luxationis huius, quae ab aliis Auctoribus, inprimis PETITO et DUVERNEYO propositae sunt, ea, quae ex Nostri mente maxime vulgaris est, abscessus scilicet in articulo natus, a nemine ante PLATNERUM nostrum indicata est. Ut enim inter centum aegros, qui luxationem femoris passi sint, vnicum tantum esse, in quo collum femoris non fractum sit, RUYSCHIIUS autumauit, ita Noster ex centum nonaginta nouem abscessu interno vitium hoc contraxisse putat. His propositis, Cl. Auctor exempla

p. 317. quaedam addit luxationis huius, ex causa interna ab

eo observatae. Puella octo annorum variolis malignis laborans, iis superatis, varios abscessus ad claviculam et cubitum experta est, ex quibus ossium cariosorum frustra Cl. Auctor, in auxilium aegrae vocatus, exemit. Femur etiam sinistrum luxatum et acetabulum pure plenum, abscessumque ad superficiem



ciem externam ossis ilei inuenit, incisioneque facta, aegram cum antibrachio anchylofi concreto, et femore, ex neglecta repositione, luxato, restituit. Hoc p. 333. etiam in puerperis ex metastasi lactis, vel ex aliorum sententia, ex suppressione lochiorum obseruavit. Femina satis robusta, primo puerperio feliciter superato, grauitatem in pelui sensit. Cum vrina, quae in triginta horis semel tantum prodibat, pus exibat. Noster vitium ex vesica vrinaria deriuans, catheteris vsum suasit. Post quindecim dies regionem inguinalem et montis veneris duram et tumidam reperit; cognouit inde materiam purulentam in tela cellulosa peluis, vesicae et vteri collectam esse, et cataplasma emolliens, et corticem Peruuianum adhibuit. Induratione imminuta, post aliquot dies magna copia puris, ex orificio, ad marginem internum femoris prope inguina exorto, effluens, symptomata leuabat. Orificio huic cataplasma imposuit, puris effusione continuante; eo vero concreto, dolores in femore aegra sensit, atque, vesicatorio apte applicato, pes immobilis cum tumido femore mansit. Aegram post aliquod tempus Noster (nam in vicina vrbe habitabat) cum femore, plane retrorsum luxato, inueniens, parte eius anteriore valde crassa, materiaque purulenta, nondum fluctuante, referta, eam breui, vfu corticis Peruuiani, duplici dosi propinati, restituit sic, vt, magna copia puris ex articulo femoris effusa, fulcita, posset incedere. Feminam vero hanc ex metastasi lactea, materia intra vterum et vesicam primum collecta demumque ad articulum translata, laborasse, fusius probat. Vir viginti trium annorum, p. 344. sanus et vegetus, doloribus in femore sinistro affectus, a chirurgo vero, ex indicatione mali ischiadici male tractatus, Nostro cum femore, retrorsum luxato, tradebatur. Sedem mali, ex vrina missa, intelligens, corticem Peruuianum adhibuit, aegrum-

*Tom. XVII. Pars I.* I que

p. 360. que breui eodem effectu restituit. His exemplis l  
xatione femoris ex causis internis probata, ad inc  
cationem curatoriam, quam fusius pertractat, tra  
sit. Commendat vero, si ex rheumatismo frigid  
ut vocant, vel metastasi oriatur, scarificatione  
cauterii applicationem, a veteribus iam commend  
tam, nouisque Iaponensium circa moxam, alioru  
que eos imitantibus, experimentis confirmatar  
frictionem, purgantium drastikorum, mercurialiu  
et vesicatoriorum vsum; imo, iis, quae in vario  
ad praecauendam suppurationem fieri debeant, e  
positis, incisionem, qua facta pureque emissio,  
luxatum iterum in pristinum locum reponi debet.

p. 380. 10. *Observationes de metastasi lactis, et de causis*

p. 382. *mortis puerperae cuiusdam, Auctore EODEM.* Debi  
femina, triginta nouem annorum, per aliquot ann  
scrophulis induratis laborans, febre, scrophulos fe  
vente, corripiebatur. Grauida paulo post facta, filiu

p. 383. sanum, scrophulis non mutatis, enixa est. Nost  
quinto die eam cum doloribus colicis vehementi  
mis, vomitu bilioso cet. inuenit. Clysmate adhi  
to, magnam copiam materiae tenuis, acris, brun  
eduxit; symptomatibus vero paulo post cum tu  
ingenti grauioribus redditis, abdomine non tum  
do, nec lochiis cessantibus, in suspicionem infla  
mationis erysipelaceae intestinorum vel uteri ven  
et, clysmate alio non succedente, epithemata cali  
applicuit. Postero die aegram admodum debilem  
delirantem cum aliis malis signis reperiens, non a  
pius de metastasi lactis in abdomine letifera dubi  
vit, praesertim cum mammae nondum lacte turg  
scerent. Vt itaque eam ad locum ignobiliore  
transferret, camphoram adhibuit, sed aegra post pa

p. 386. cas horas obiit. Abdomine aperto, peritoneum  
totus intestinorum tractus regionis epigastricae m

ter



teria albida, flocculenta, cremori lactis simili, ad tres vel quatuor libras obducta, vidit. Ileum in quibusdam locis inflammatum erat: vterus bis maior, quam extra grauiditatem esse solet, orificio non arcte clauso. Mammæ et encephalum disquirere locus non permisit. Subsumit ex his Cl. Auctor, partem aliquam lactis, ad cerebrum et nervos delatam, mortem celerem produxisse, et ad Cel. Puzos prouocat, qui idem in tribus puerperis obseruauit, et contendit, metastasi lactis ad partem nobiliorem translata, mortem semper subsequi \*).

II. *Effectum arsenici albi crystallini communicat* P. 394. Cl. C. A. KLOEKHOF. In femina, veneno enecata dicta, publicaue auctoritate dissecta, fundum ventriculi ad viciniam pylori valde crassum, cum colore ex bruno purpureo vel nigricante, Noster detexit, mediam vero huius fundi partem cineream, et a tunica interna separatam. Totum præterea ventriculi ambitum multis granulis paruis, albis, duris, oculorum cancri ad instar, obsessum vidit, intestinis ceteroquin sanis. Ventriculus, per aliquot dies in spiritu vini seruatus, in superficie interna multa punctula rubra ostendit, quæ petechias simularent. Granula hæc verum arsenicum album fuisse, experimento cum his et vero arsenico instituto probat, et confirmat eius veritatem ex actis publicis, quibus constat, seruam aegrae tribus vicibus arsenicum dedisse. Admiratur id potissimum Cl. Auctor arsenicum a d. 7 nou. 1760. ad d. 6 ian. 1761 in ventriculo pene immutatum seruatum esse. Maritus eius, vi veneni, bis accepti, largiore et continuato potu aquoso, superata, post duos annos restitutus est. Subiicit sub finem monita quaedam, ad quas

I 2

medi-

\*) Vid. EIUSD. Traité des Accouch. p. 387. Comment. suppl. dec. I. p. 505.

medicus physicus in disquisitione cadaueris attendere et relationes debeat instituire.

- p. 417. 12. *Commentarius de multiplici refractione radiorum lucis, per vitrum transeuntium*, Auctore Cl. c. U. BLEY.
- p. 464. 13. *Curationem tendinis rupti muscoli recti femoris exponit* Cl. FR. WYNANTS. Pictor quinquagenarius, scala descendens, pede sinistro in ea implicitus, dextro vero, extra aequilibrium positus, casum euitans, tendinem muscoli recti supra patellam rupit, ut nec pedem extendere, nec corpus, eo insistendo, posset fulcire. Noster patellae motum laxiorem, et attractione muscoli finem utrumque tendinis rupti cum cauitate, quam duo digiti vix poterant explere, detexit. Fasciis spleniisque duobus, ut moris est, applicatis, pedi ferulas accommodauit, aegrumque per sex hebdomadas in hoc situ seruauit.
- p. 468. Callo hinc nato, aeger paulo post plane restitutus est. Variorum deinde Auctorum sententias de eiusdem tendinis laesione adiungit, rupturaeque ipsius rationem exponit.
- p. 475. 14. *Vsum olei, ex asphalto parati, in ulceribus viscerum* tradit Cl. HOFKENS DE COURCELLES. Parat Noster hoc oleum ex bruno nigrum destillatione ex asphalti libr. i. salis decrep. libr. semis et arenae purae libr. i. semis. Propinatur mane, ventriculo ieiuno, ad guttulas 10. 14. saccharo exceptas, et tempore noctis eadem dosi. Probat vsum eius tribus exemplis. Iuuenem viginti annorum, sano et vegeto corpore, variolis superatis, febre lenta cum eiectione puris aliisque malis symptomatibus correptum, Noster, oleo hoc, ei d. 7 iul. 1761 cum bona diaeta commendato, d. 26 iul. restituit. Femina duodetriginta



ginta annorum plethorica, a primis annis asthmatica, terrore perculsa, pleuritide afficiebatur; neglecta venaesectione, vlcus in pulmonibus ortum Noster ex puris fetidi eiectione cet. cognouit. Aegram, oleo d. 1. iul. adhibito, circa finem iul. cum fluxu menstruo, antea amisso, restituit. Femina trigena-P. 480. ria, post casum conuulsionibus in lumbis affecta, a chirurgis male tractata, cum dolore in lumbis relicto, asthmate, febre lenta, magnamque copiam puris ex viis vrinariis et ore eiiciens, Nostro tradita, ab eo, aliis bonis medicamentis frustra adhibitis, oleo hoc sub initium maii propinato, ante finem iunii restituta est. Eundem effectum habuit in sene, sexaginta-P. 483. sex annorum, qui, cum post lapsum in latere dextro, magno dolore, febre, tussi cum eiectione puris afficeretur, usu huius olei breui curatus est, relicta tamen respiratione difficili.

15. *Observationes super numero, in quinquennio*P. 485.  
1759. 60. 61. 62. et 63. mortuorum, in quorum duobus ultimis annis contagium variolosum Hagae comitum grassabatur, Auctore Cl. TH. SCHWENCKE. Iam-P. 488.  
inde ab anno 1719 Cl. Auctor obseruauit, contagium variolosum post singulum quinquennium epidemicum esse factum, vt adeo praediceret, variolas annis 1762 et 1767 eandem scenam epidemicam esse lufuras. Stadia in epidemiis eadem fuere, et cuique nouae epidemiae variolosae morbilli cum purpura antecessere, in prioribus epidemiis magis, quam in hac, funesti. Nam ex T. V. Comm. Soc. Sc. Harl. patet, 499 morbillis periisse; in hac vero epidemia variolis 483, morbillis 73 tantum mortui sunt, vt ex calculo, quem in fine adiecit, elucet. Numerus variolis mortuorum ad numerum Hagae p. 491. quotannis natorum ei est, vt 1-10.

- p. 495. 16. *Relatio de hernia umbilicali incarcerata, in femina octuagenaria feliciter curata*, Auctore Cl. G. TEN-  
 p. 497. H A A F. Femina octuaginta annorum, valde obesa, hernia umbilicali iam a multis annis laborans, hac semper repressa, anno 1763 in scalam ascendens, herniam magis prolapsam duriolemque sentiens Nostrum, auxiliis consuetis frustra adhibitis, consuluit. Is, variis, immissione fumi tabaci, venaesectioe cet. frustra tentatis, ad operationem accessit.  
 p. 504. Intestinum, gangraena affectum, in angusto loco prodiens, annulo discisso, in abdomen magno cum impetu retrocessit. Paucis horis post aegra vehementissima febre corripiebatur, quae tamen tertia die sponte cessauit. Verum senili corpore, multo profuso sanguine, debilitato, post quatuor menses exspirauit. Afferit Cl. Auctor, non in tali hernia de aetate, nec de tempore, per quod incarcerata sit; nec de salute esse desperandum.  
 p. 511. 17. *Tractatio super Hakeldamah siue de prouidentia Dei cet.* Auctore Cl. G. C. H. VAN DER AA.  
 p. 533. 18. *De vaticinio Zachar. XI. v. 12. 13. comparato cum historia ex Matth. XXVII. v. 5. differit* Cl. HERRMANN VENEMA.

In parte secunda voluminis octauo continentur:

- p. I. I. Cl. I. LE FRANCKE VAN BERKHEY commentarius de optima methodo terram patriam ex ipsa sui natura et situ optime colendi, quae primum praemium a Societate propositum reportauit. Omissis aliis, quae minus ad nos pertinent, notamus, Cl. Auctorem etiam suas de famoso illo incrustato Rakanienfi observationes communicare, quo scilicet in lacu quo-



quodam in peninsula *Voornana* ad pagum *Rakanje* fito, non solum caricis culmi obducuntur, sed ex qua etiam massae, variae magnitudinis, per aream sparsae, formatae reperiuntur. Putat vero Noster hoc incrassatum tophum esse argillaceum, et ex depositis argillosis particulis aquae, eo in loco, vbi copiosius accrescit, in vorticem continuo agitatae oriri. Cl. vero PALLAS in *zoophytorum elencho* \*) incrustatum hoc calcareae esse indolis et coralliorum naturae analogum, vti alio loco iam indicauimus \*\*) probat.

2. *Responsio ad eandem quaestionem*, Auctore Cl. p. 191.  
W. VAN HAAZEN, altero praemio ornata.

Relationes cum Societate communicatae: p. 203.

1. *Particulam costae bouinae, ultra viginti duos menses in pulmone haerentem, tussieiectam, obseruauit* Cl. TH. SCHWENKE. Vir duodequadraginta annorum d. 6. nou. 1761. inter iusculum carneum, ex carne bubula, cui costarum fragmenta inhaerebant, paratum, deglutendum, duri quid, tussim faciens, intrasse sensit. Multis abhinc doloribus perpeffis, tempore p. 205. aestatis 1763 Nostri adiit, qui, re perspecta, iustis remediis datis, tussim cum eiectione puris augens, particulam tandem, costae bouinae, quae pulmmoni inhaeserat, inter screatum extraxit. Adiecit delineationem cum descriptione eiusdem particulae.

2. *Contagium variolosum, via naturali reciduum*, p. 206.  
*exemplis illustrat*, Cl. SERVANS VAN-DE COPELLO. Noster anno 1752, contagio variolosop. 209. grassante, in familiam accersitus, duos infantes, variolis benignis laborantes breui sanauit. Alter p. 210. eorum, cum post quatuor septimanas eodem contagio

\*) p. 268.

\*\*) Vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 161.

- tagio iterum infectus diceretur, signa consueta ostendit, ex quibus tamen Noster certi quid nondum determinare ausus est; sed postero die variolas in toto corpore, praecipue in extremitatibus prodire vidit, ex quibus aeger, stadiis, vt solent, celebratis, breui restitutus est. Variolis anno 1744. in familia mercatoris grassantibus, filia primo maior, deinde iunior, ab iis infectae, breui sanatae sunt. Anno 1760 contagio rursus grassante, Noster, cum ex eo, quid de contagio reuersuro sentiret, quaeretur, hoc fieri posse asseruit. Neque errauit; nam, vtraque filia variolis post aliquod tempus correpta, vtramque quoque restituit. Illustrat hoc exemplis ex aliis Auctoribus, qui idem obseruarunt, et concludit, contagium variolosum, naturaliter communicatum, homines iterum omnino inuadere. De infinitis variolis hoc nondum obseruauit.
- p. 219. 3. *Relatio de ventriculo rupto*, Auctore Cl. WIND. Puellam quatuor annorum, subito mortuam, publica auctoritate Noster dissecauit. Antea mortem, praeter leuem febrem, bene se habuit; post mortem vero abdomen ita intumuit, vt etiam suspicio veneni nasceretur, colore tamen naturaliter seruato. Abdomine aperto, magna copia aëris cum ingenti vi prorupit, vt ventriculus, antea distensus, valde collaberetur. Orificium paruum, iuxta cardiam, in superficie anteriore detexit; ventriculum vero interne ad orificium hoc inflammatum et sanguine grumoso nigricante oblitum, obseruauit. Crassa intestina distenta et inflammata inuenit cum liene iusto maiore et indurato. Colligit ex his Cl. Auctor, ventriculum ex rarefactione aëris ruptum; causam vero huius rupturae, vel in veneno, vel in alio maligno humore quaerendam esse.
- p. 223. 4. *Encheiresin, qua in ligno quodam variae figurae regionum, urbium, ruinarum cet. delineatae videntur*



*antur, (Steede Hout)* communicat. Cl. I. C. PAL-  
LIER. Serra Noster varios ramos ex malo, arbo-  
re, bene exsiccatos, quorum medium centrum 4. 5.  
6. et ultra digitorum erat, in discos discidit, vesti-  
gia vero, a serra relicta, cultro obtuso vel vitro ae-  
quavit, et polita reddidit. Hinc saepius detexit,  
centrum vel medullam et stratum subsequens colo-  
re bruno, tanquam fuligine figurato, conspicuum  
esse. Hic vero discus, in vtraque superficie bene  
politus, easdem figuras ostendit. Causam harum  
figurarum in annorum serie, per quam arbor cre-  
vit, strataque varium et firmiter robur acquisivere,  
Noster quaerit. Hoc notatu dignum censet, ra-  
p. 225.  
mos se inuenisse, in quorum parte bruna maculae,  
portas, aedes cet. simulantes, detegerentur, quae  
vero saepius ad partem exteriorem usque albidam  
penetrarent. Disci talis in quatuor partes, per  
centrum iuste dissecti, singula pars rotunda reddita  
et polita regionem aliamque figuram offert. Pu-  
tat Cl. Auctor, eadem phaenomena et in aliis lignis  
posse detegi.

5. *Observationes de mutatione colorum, in chame-* p. 226.  
*leonte conspicuorum,* Auctore Cl. B. HUSSEM.  
Fusius probat Cl. Auctor, animal hoc non ex solo  
aëre nutriri, sed infectis, quod iam pluribus aliis re-  
centiorum testimoniis confirmatum est. Longam  
inediam, ad quinque vel septem menses, pati posse,  
variis exemplis probat. Alium quoque errorem, a  
pluribus assumptum, animal scilicet hoc colorem as-  
sumere illarum rerum, quibus infidet, pluribus ex-  
perimentis refellit. Putat, colorum mutationem  
potius a variis affectibus, quibus animal hoc agita-  
tur, ira, metu, coeundi libidine cet. pendere. Post  
mortem semper ex griseo nigrum colorem acquirit.

6. *Observationem de curatione, per emphysema ar-* p. 235.  
*tificiale, feliciter peracta,* a chirurgo ex Angola acce-

- ptam tradit Cl. H. GALLANDAT. Quae de methodo per emphysema artificiale variis morbis medendi, inter nigritas, Guineenses vsitata, Cl. Auctor alio loco \*) proposuit, experimento hic confirmat. Adolescens nigrita decem annorum, pleuritide spuria affectus, medicamentis cum venaesectiōe, bis instituta, adhibitis, melius se habuit, modo vt dolor quidam per totum corpus sentiretur. Post tres dies rigor totum corpus occupauit, ita, vt, omnibus in- et externis remediis frustra adhibitis, nil amplius per os posset ingeri, et aeger, frigore quasi tactus videre-
- P. 237. tur, cum aliis malis signis. Operationem Noster per emphysema artificiale instituit: incisione in pede facta, tubulo membranam cellulose inflauit, vt flatus paulo post per totum corpus distribueretur.
- P. 238. Post horam aeger reuiuiscens, succum ex fructu quodam resorbere coepit. Maxillis postero die relaxatis, aeger postea restitutus est.
- P. 239. 7. *Curationem ex periculosa cranii laesione communicat*, Cl. ABR. VAN DALEN. Miles quadraginta quatuor annorum d. 2 iul. 1762 ictu, ex gladio obtuso, in cranio percepto, duplici vulnere in osse bregmatis dextro afficiebatur, altero leuiore ad musculum temporalem, altero grauiore, duos digitos lato, supra dextrum supercilium ad sinus frontales, extrorsum paruo, introrsum latius hiantes. Noster, venaesectiōe instituta, vulnus, symptomatibus nullis stipatum, deligauit. D. 11. iul. magna copia feri ex vulnere effluxa, postero die, vulnere ampliato et disquisito, corpus durum firmum detexit, quod, liquore spiritioso immisso, d. 16. iul. cum pure multo fetido extraxit; d. 17. duabus iterum particulis osseis, et subsequente die, quarta cum multis minoribus eductis, vulnus, nullis nondum subsecutis sym-

\*) Vid. Tom. VI. P. II. p. 676. Comment. Vol. XII. p. 284.



symptomatibus, deligavit. Relictis tandem paulop. 249.  
maioribus particulis, d. 21. amotis, vulnus, inter-  
posita lamina metallica, multis foraminulis pertusa,  
clausit, aegrumque brevi restituit. Persuadet sibi p. 250.  
Cl. Auctor, humoribus, in cerebro extrauafatis, ibi-  
demque iam dudum collectis, vulnere hoc inflicto,  
viam, qua effluerent, datam esse. Particulas deli-  
neatas adiecit.

8. *Delineatio instrumenti noui, fenum tabaci in p. 252.*  
*intestina immittendi*, Auctore Cl. H. V. NOKKEN,  
cum icone.

9. *Duos calculos, sponte ex vesica rupta cicatrice*  
*prodeuntes*, communicat Cl. IAC. BOTH. HEN-  
DRICKSEN. Iuueni duodetriginta annorum, a prima p. 256.  
aetate doloribus nephriticis affecto, anno 1741. pri-  
mus calculus ex vesica operatione exsectus est; anno  
1759. alter magno dolore cum vrina sponte exiit.  
Tertio, anno 1761, per operatorem exento, anno p. 257.  
1762 magnos dolores ad regionem natum sini-  
stram, cum vrinam mitteret, sensit aeger. Abcessu in  
cicatrice nato, post tres dies calculum, sponte prodeun-  
tem, post quinque dies alius subsecutus est, ex quo  
aeger melius se habuit. Figura adiicitur calculorum.

10. *Commentatio de variolis infantum*, Auctore p. 260.  
Cl. I. FR. DRYFHOUT. Ex Comm. Soc. Sc.  
Harl. T. IV. p. 90. seqq. \*) patet, Nostrum vario-  
las filiae suae decennariae 1755. inseruisse; eam ve-  
ro a contagio varioloso anno 1761 admodum graf-  
sante, non infectam fuisse, ex T. VI. P. I. p. 448. \*\*)  
constat. Anno 1764. eam, marito suo variolis de-  
cumbente, ab eodem contagio iterum infectam, ve-  
risque variolis per stadia sua perpeffis, conualuisse  
asserit, teste Cel. HOFIO. Interim putat, filiam,  
variolis ex insitione non grauiter affectam, eas ve-  
ras demum expertam esse.

11. *Ino-*

\*) vid. Comment. nostr. Vol. IX. p. 571.

\*\*) ibid. Vol. XII. p. 276.

- p. 267. II. *Inoculationis variolarum, Roterodami factae, cursum, Soc. Sc. Harl. traditum* communicat Cl. DE
- p. 267. MOMCHY. De bonitate infitionis variolarum multis, immo trium suorum liberorum, exemplis Noster persuasus, vnius malum euentum, a Cél. DE HAEN, inoculationis aduerfario, sibi obiectum, communi-
- p. 270. cat. Totam operationem, in filiis duobus, trium et quatuor annorum, institutam, maioris bono euentu, minoris malo, per omnia stadia describit. Ex phaenomenis in iuniore die octauo quaedam praeternaturalia Noster vidit, vt inde malam formaret prognosin. Hinc, medico alio in consilium vocato, bonisque medicamentis datis, aeger nihilominus conuulsione periit. Corpore dissecto, nullis vestigiis variolarum detectis, nil, nisi voluulum in
- p. 277. intestinis tenuibus in duobus locis inuenit. Corticem Peruuianum paulo serius se adhibuisse Noster sibi ipsi obiicere videtur, quem vero ob febris vim validiorem non ausus est dare. Cum probabilitate asserit: tempore criseos regimen frigidius accessisse, vbi, sub ipso ingenti sudore, aeger, ex lecto remotus, frigido pectorali sericeo indutus sit; perspiratione inde suppressa, rheumatismum productum esse, qui, febre absoluta, relictus manserit. Probat hoc Cl. Auctor tribus argumentis: primo, febrem, quae in omnibus fere variolarum speciebus tempore criseos, imminui solet, hic auctam fuisse obseruatam: deinde, dolorem et intumescentiam brachii magnam conuenientiam habuisse cum dolorificis et tumidis buccis, ex suppressa perspiratione orta: tertio, probabilitatem, causarum duarum, in corpore simul latentium, alteram post alteram agere, non dubiam esse, quippe cum hoc ex infitione variolarum, materia morbillosa in corpore iam haerente, constet.

Adduntur obseruationes meteorologicae Swanenburgenfes anni 1762. et 1763.



XV.

Mémoires de Chirurgie, avec quelques remarques historiques sur l'état de la Médecine en France & en Angleterre. Par GEORGE ARNAUD, Docteur en Médecine, ancien membre de l'Académie royale de Chirurgie de Paris & un des Professeurs en l'école de St. Cosme, membre de la Société des Chirurgiens de Londres. à Londres chez J. Nourse. 1768. T. I. 2 alph. 12 pl. tab. aen. 11. T. II. 2 alph. 15 pl. tab. aen. 11.

i. e.

Commentarii chirurgici, adspersis quibusdam observationibus super statu medicinae et chirurgiae in Gallia et Anglia. Auctore GEORGIO ARNAUD. Vol. I. et II.

CEL. ARNAUD, chirurgus Francogallus, qui Londini nunc praxin chirurgicam exercet, variisque scriptis herniarum imprimis et morborum vrethrae curationes illustrantibus, a nobis suo loco indicatis, inclaruit \*), hanc variorum operum chirurgicorum minorum collectionem, tertio volumine augendam, senescens iam publicavit.

Primo loco exhibuit nobis versionem Gallicam P. I. p. 1. egregii commentarii Cel. HUNTERI de herniis congenitis \*\*), cui praefixa est brevis de vita Cel. huius viri narratio, ex qua perspeximus, diu expectatum istius viri de vtero opus, iam fere totum ad finem perductum esse. Continebit illud quinquaginta

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XIV. p. 433.

\*\*) vid. Medical Commentaries P. I. p. 75. et Comment. nostr. Vol. XI. p. 288 seq.

- ginta circiter tabulas aeneas, quas Cl. RYMSDYCK delineavit, praecipuique in arte sua sculptores Angli Gallicque aeri inciderunt. Commentarium ipsum hic impressum Cl. ARNAUD variis annotationibus auxit, in quibus nonnulla loca paullo obscuriora illustrat. In his autem gloriam inuentionis herniarum congenitarum, quam Ill. HALLERO debemus, soli fere HUNTERO tribuit; cum tamen ipse HUNTERUS fateatur, se HALLERI observationibus de
- p. 4. herniis congenitis excitatum fuisse, ut in hanc rem accuratius inquireret. De tunica vaginali a peritonaeo orta, docet, non totum fasciculum vasorum spermaticorum eam includere, sed tantum in anteriore parte operire. Et cum fieri interdum soleat, ut in neonatis in illo sacco, quem peritonaeum cum teste descendens, format, aquae colligantur, quae speciem hydroceles forment, Cl. ARNAUD eam hydrocelem congenitam vocat. Hae aquae, si infantes in dorso cubant, in abdomen retrocedunt. Saepe etiam cum enterocele haec hydrocele complicata est. In fine huius commentarii inter varias observationes etiam HUNTERI et HALLERI de herniis congenitis et sacco peritoniaei descendente, observationes ad explicationem variorum phaenomenorum, quae in curatione herniarum occurrunt, adplicantur.
- p. 49. Si hernia congenita est, id est, si intestinum peritoniaei saccum ad testem descendentem, nondum perfecte clausum intrauerit, nunquam per operationem radicalem curam obtineri asserit, quae in ea herniarum specie, quae peritonaeo praeternaturaliter per anulum cum intestino descendente continetur, saepe, uti notum est, herniotomiam sequitur. Nec in priore specie sacculus, post intestini reductionem, vinculo constringi potest, cum in operatione anterior tantum sacculi lamina aperiatur, posterior vero vasiss spermaticis, quae tegit, arcte adhaereat. In puellis etiam



etiam aliqua peritonaei productio faccum formans, cum ligamentis rotundis per anulum descendit, quam NUCKIUS diuerticulorum nomine descripsit, quae forte causa est, cur etiam puellae et quidem feminis longe frequentius, inguinali hernia laborent.

Sequitur Cl. ARNAUD commentarius de her-P. 83. niis in presbyteris et monachis ecclesiae Romano-catholicae addictis. Lege Mosaica herniosi, eunuchi alique, qui vitiis variis in partibus genitalibus laborabant, a ministerio diuino arcebantur, ideoque etiam nonnunquam in hac ecclesia ab eo arcentur. Cl. vero ARNAUD demonstrat herniosos, si remediis aptis prophylacticis tractentur, officio presbyteri fungi posse, aliaque, quae huc pertinent, fusius explicat.

Tertius commentarius de diuerso situ et numero P. 115. testium agit, in eoque inprimis disquiritur, num testium in abdomine situs, vel vnus testis defectus diuortii causa esse queat. Veros triorchides inueniri probat, canemque vere triorchidem se vidisse narrat, cuius testiculus tertius in abdomine latens, proprio vase deferente, instructus fuerit. Quae de testium serotino descensu variorum symptomatum morbosorum causa, de testium spontaneo in abdomen regressu cet. Auctor Cl. monet, omittimus. Testem sub ligamento FALLOPII ad crus descen-P. 153. dere et herniam cruralem referre vidit. Varios deinde morbos enarrat, quibus testes destrui possunt. Abscessu sponte nato, vtrumque testem in pus reso-P. 161. lutum, vulnusque perfecte consolidatum obseruauit.

Quarto commentario de aneurysmate et in pri-P. 181. mis de ea specie, quam Ill. HUNTERUS primum descripsit\*), disputat. Aegri commemorat exemplum, in

\*) London Med. Obs. and Inquir. Vol. II. p. 390. et Vol. I. p. 323. vid. Comment. nostr. Vol. XII. p. 467. et Vol. VIII. p. 315.

- in quo post herniae operationem feliciter peractam sex aneurysmata in arteria crurali sensim enata, deprehendebantur, quorum vnum ad genu articulum positum illum summis doloribus excruciat, tandemque ruptum interemit; fasciamque addit, quae p. 219. fasciamque tortilem imitatur, cuius ope, aneurysmata vera comprimendo progressum eorum retardare tentavit, et in aneurysmatibus spuriiis perfectam curationem assecutus est. Annexa est dissertatio Cel. HUNTERI citata de tertia aneurysmatum specie et Cl. CLEGHORN epistola ad HUNTERUM de eodem argumento \*).

Ultimus huius voluminis commentarius de hermaphroditis inscribitur, in quo Cl. Auctor plura, quae ad hermaphroditorum historiam pertinent, ex veterum et recentiorum scriptis collegit. Ill. verò HALLERI dissertationem de hoc argumento Commentariis Societatis Gottingensis insertam \*\*) non nouisse videtur. Commentarius hic a. 1733 in Academia chirurgica Parisina praelectus et a. 1750 Londini Anglico sermone impressus est. Inter exempla, ex aliis adducta, varia fabulosa sunt. Varias tamen obseruationes singulares sibiue proprias habet. Qualis est, quam de femina habet, quae, licet viro similis esset, quoad externam fabricam partium, verum tamen fluxum menstruum per intestinum rectum experiebatur. Vagina sectione patefacta est, vulnere vero neglecto, iterum coaluit. Ad-  
p. 296.  
p. 328. ditae quoque sunt aliae obseruationes de hermaphroditis recentioribus v. c. de famoso illo *Drouin* ar, alioque *Grand-Jean* dicto, cuius causa varia quoque in Gallia scripta, hic inserta publicata sunt, cet.

\*) vid. Med. Inqu. Vol. III. p. 110. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 137.

\*\*) vid. Vol. I. p. 9. et in opusculis minoribus T. II. P. I. p. 9. vid. Comm. nostr. Vol. II. p. 5. et Vol. XV. p. 528.



et. et adiiciuntur excerpta ex commentario Cl. LE  
CAT de hermaphrōditis nondum typis impresso.

Secundi voluminis initium facit amplissimus T. II.  
commentarius de herniis omenti, qui plures Cl. p. 401.  
Auctoris aliorumque obseruationes continet.  
Omentum primum variasque morbosas mutationes,  
quae in eo obseruantur, fusius describit. Omen- p. 406.  
tum in cadaueribus magis dextrorsum quam  
sinistrorsum se vertit, contrarium tamen in viuo ho-  
mine obseruatur, in quo fundi ventriculi sinisterior  
pars altius posita est. Nonnulli veterum putant  
illud iusto pinguius factum pondere suo conceptio-  
nem impedire et sterilitatem inducere posse, quam  
sententiam, a HIPPOCRATE iam propositam, Cl.  
Auctor fusius refellit. In homine, colica saturnina p. 409.  
laborante, omentum circa se ipsum reuolutum de-  
prehendebatur, inferiore parte ad superiorem ag-  
glutinata, quod tumorem formabat, qui scirrhum  
tumorem mentiebatur. Haec vero reuolutio ex  
conuulsivis intestinorum motibus pendere videba-  
tur. In alio qui hernia omentali laborabat, totum p. 410.  
omentum in chordam quasi angustatum et contra-  
ctum erat. Scirrhum quoque in omento in abdo-  
mine adhuc posito, aliumque in omento per annu-  
um egresso obseruauit. Atque in vniuersum omen-  
portio, quae herniam format, insigniter crasse-  
cere solet, regressu humorum per vasorum com-  
pressionem impedito. Pondus omenti per morbos p. 414.  
nonnunquam ita augetur, vt triginta libras aequet,  
t chirurgus quidam Parisinus in exomphali opera-  
tione portionem omenti nouem fere librarum rescie-  
rit. Omittimus, quae de vsu omenti variorum- p. 420.  
que Auctorum de eo sententiis Cl. Auctor habet,  
um plurima ex aliis iam scriptoribus cognita sint.  
cirrhus in omento nasci, illosque in tumores la- p. 428.

pidææ duritiæ mutari, posse, probat obseruatio Cl. MONGIN de scirrho omenti petrificato quasi (petrifé), ponderis 13 librarum quem femina, per 37 annos sine magnis incommodis tulit. Ictu tandem in abdomen accepto, hydropica facta, periit. Putat vero Cl. MONGIN lapideam hanc massam ex coagulatione succorum ab acido ortam esse. Osseam quoque duritiem omentum in herniam prolapsam acquirere potest.

- P. 446. His de omento in vniuersum propositis, Cl. Auctor iam ad hernias omenti transit, primumque docet, quibus signis epiplocele a cirsocele vel hydrocele, cum quibus herniis spuris nonnunquam coniuncta est, dignosci queat. Cura palliativa herniarum omenti longe difficilior est, quam curatio earum herniarum, quæ ex intestinorum descensu oriuntur.
- P. 451. Radicalem curam sectionis ope in hernia omenti simplici, quam varii proposuerunt, incertam esse sæpeque funestam variis exemplis probat.
- P. 458. Cohæsiones quoque omenti cum sacco successum operationis dubium reddere solent. In homine in quo eiusmodi cohæsiones, quas epiploon ad saccum contraxerat, molestissimos vomitus excitabant, operatio, in qua hæ adhaæsiones soluebantur, sine fructu facta est.
- P. 470. Descensum omenti scarificatione annuli impediri posse, varii quidem Auctores proposuerunt; sed tendineas columnas nunquam, neque vel post dilatationem annuli in herniæ operatione inter se coalescere, scarificationemque difficulter tantum in superiore, nunquam in inferiore columna fieri posse, Cl. Auctor fusius probat. In enteropiplocele, si intestinum fasciæ vel bracherii ope reprimatur, temporis etiam successu, omento cum annulo concrecente, plenaria curatio obtineri potest.
- P. 475. Quo maiores herniæ omenti sunt, eo facilius curantur, quod Cl. Auctor feminae exemplo probat;



bat, quae entero epiploocele insignis magnitudinis laborabat, quam ventriculus et colon quoque, ut Noster suspicatur, intrauerant, et quam diaeta tenuissima, ex solo iusculo vitulino, potu aquoso, usu mercurii dulcis in dosi refracta, clysmatum et externa applicatione emplastri emollientis ita minuit, ut commodè tandem intestina prolapsa reprimere, aegramque restituere posset. Eadem methodo et p. 482. iam alias hernias insignis magnitudinis, compressione etiam externa in usum vocata, curauit, in quarum vna ipsa vesica quoque in scrotum descendebat. Nonnunquam post reductionem eiusmodi p. 494. herniarum, quae diu iam durauerant, si subito ea reductio fit, spasmi insignes et dolores colici oriuntur, quod minime accidit, si muscoli abdominales cataplasmatibus et fomentis relaxati antea fuerunt, et haec reductio non subito, sed sensim instituitur. ipsam deinde reductionem herniarum omenti seu p. 506. maxime fusius describit, regulasque in ea obseruandas tradit. Herniae omenti minores longe difficilius p. 513. maioribus reponuntur, quoniam in iis annulus non tantum dilatatus est, quantum in herniis maioribus esse solet. Interim vel has, fasciarum ope eas comprimendo, sensim imminuit, tandemque feliciter reuexit. His de herniis omenti simplicibus et cum enterocele etc. compositis, propositis Cl. ARNAUD p. 521. et hernias complicatas, i. e. scirrhasas, inflammatas cet. transit; in quibus curatio, quae ferro fit, instituenda est, quam in simplicibus noxiam esse diximus. Sic epiploocelen induratam, imo carcinomaticam felici successu extirpatam esse, obseruationes Cl. Auctoris fusius hic descriptae probant. inflammari quoque omenti herniae possunt et in p. 534. abscessum mutari aegro funestum. Metastases etiam criticas ad omentum fieri exemplo confirma- p. 536. tur. Tandem de incarceratione (*Etranglement*) p. 538.

amenti Auctor Cl. differit, cuius incarcerationis signa, cum iis, quae intestinorum incarcerationem comitantur, nonnunquam conueniunt, cum ex spasmis vel ex habituali causa alius etiam obstructa esse possit; haud raro tamen sine eiusmodi symptomatibus

- P. 552.** putredine corripitur. Possunt etiam in omento prolapso hydatides nasci, qua occasione Cl. Auctor singularem curationem enarrat, qua hydrocele empiricus quidam, sola compressione ita adhibita, ut testiculus ab ea immunis maneret, vno temporis momento, disrupta vesica, aquam continente, dissipauit. Similem quidem curationem in hydrocele adhibere, Cl. Auctor nunquam ex metu laesionis testiculi ausus est, usus tamen est ea in hydatidibus, quibus omenti portio, in herniam prolapsa, repleta erat. Transiit deinde ad intestini, in herniam descendi, incarcerationem, quatenus ab omento pendere potest. Vidit Cl. BOUDOU fasciam circularem
- P. 571.** quasi ab omento formatam, quae intestini coli portionem comprehendens et constringens, mortis aegri
- P. 574.** causa, intestino sphacelo corrupto, fuerat. Aliud exemplum probat, adhaesiones eiusmodi omenti ad intestinum, quae incarcerationis causa sunt, intestino in herniae operatione paullulum, protracto scalpelli ope, maximo aegri cum fructu, separari. Potest
- P. 586.** est etiam omentum nimis distentum dilacerari, intestinumque hoc foramen ingredi et ab omento constringi, uti, variis historiis hic additis, confirmatur.
- P. 593.** Duplex epiplocele in utroque latere, licet rarissima sit; tamen nonnunquam obseruatur, qua occasione Cl. Auctor breuem historiam herniarum omenti tradit, docetque, CELSUM iam, FALLOPIUM, REALDUM COLUMBUM et VESALIUM eas cognouisse. Potest etiam duplex hernia in vno eodemque latere accidere, si vna ex intestini vel omenti portione cum peritoneo descendente oritur,



tur, altera vero congenita est. In femina quoque p. 605.  
 duplicem enterocelen, cruralem in adolescente prae- p. 607.  
 ter enterocelen inguinalem etiam epiploocelen cru-  
 ralem, et in viro duplicem epiploocelen inguinalem  
 et cruralem obseruauit. Nonnullae fibrae, quae a  
 fascia lata in nonnullis hominibus ad os pubis ten- p. 606.  
 dunt sub ligamento FALLOPII fascias tendinosas  
 formant, quae incarcerationis causa existere pos-  
 sunt. His propositis, Cl. Auctor ad celebrem illam p. 609.  
 de ligatura omenti in herniae operatione instituen-  
 da, controuersiam, quam, uti notum est, Cl. VER-  
 DIER et PIPELET impugnarunt, pergit, quam p. 614.  
 non plane reiicit, cum ea haemorrhagiam et gan-  
 graenam impediat vel cohibeat, Auctorque Cl. in- p. 627.  
 ter 230 et ultra aegros, in quibus ligatura usus est,  
 ne vnicum ex ligaturae vitio mortuum viderit.  
 Omentum vero, ligatura constrictum, non reponit, p. 619.  
 sed extra abdomen seruat, cautionesque fusius de- p. 624.  
 scribit, quae in ligatura instituenda obseruari de-  
 bent. Si ligatura in abdomen recedit, saepe natura  
 sponte eam expellit. Vidit tamen Cl. Auctor ex li- p. 648.  
 gatura, quae quatuordecim menses in abdomine la-  
 tuerat, intestinum disruptum, foecesque ex abdomi-  
 ne per aperturam fistulosam egredientes. Foecum  
 vero copia imminuta vulnereque clauso, aeger con-  
 valuit. Alius vero, cui simile infortunium accide- p. 652.  
 bat, periit. Docet deinde, ligaturam non causam es- p. 659.  
 se adhaesionum omenti, quae post eius rescissionem  
 obseruantur, nec abscessus et callositates ex hac li-  
 gatura oriri, atque in vniuersum ex experimentis a  
 Cl. PIPELET in canibus institutis non ad ea, quae  
 in homine fiunt, concludendum esse; tandemque p. 665.  
 probat alia remedia, a variis Auctoribus ligaturae lo-  
 co proposita, ut cauteria actualia et potentialia, ole-  
 um terebinthinae (quod tamen non noxium esse iu- p. 677.  
 dicat) vel ipsam omenti sine omni vltiore cura re- p. 825.

- positionem, longe superari a bonis ligaturae effectibus. Repositio in specie omenti sine ligatura non
- P. 678. modo haemorrhagiam, sed et corruptionis ipsius omenti causa esse potest.
- P. 698. Hanc dissertationem excipit amplissima sellae cuiusdam chirurgicae, a Cl. Auctore excogitatae, descriptio, in qua omnes operationes chirurgicae commode instituuntur, aegerque in lectum deportari potest.
- P. 745. Speculum deinde vteri delineat, quod vulgari quidem speculo praeferendum est; attamen non incommodis caret, quibus omnia eiusmodi specula subiecta sunt.
- P. 754. Sequitur elegans de iis, quae in operatione herniae cruralis in viris instituenda observanda sunt, commentarius. In eo docet, vasa spermatica omnino in hac operatione, facillime discindi posse, iconemque addit, ex qua patet, arteriam spermaticam, ante suum ex abdomine progressum fere totam sub ligamento FALLOPII latere, qua occasione GÜNZIUM Nostrum inprimis refutat, qui hoc accidere posse in eleganti *de herniis* libello negavit. Hamulum quoque describit, cuius ope ligamentum in herniae operatione attollit, non discindit, sicque vasorum discissionem praecauet, quae eo magis metuenda est, quo magis ab intestino in herniam egresso vasa versus interiorem ligamenti marginem vrgeri solent. Arteriam quoque epigastricam sub hac operatione discindi posse, fusius probat, acumque, cuius ope ligatura eius instituat, forficemque ad incisionem sacci callique eius dilatationem addit.
- P. 793. Hunc commentarium excipit descriptio staphyloptomi vagina inclusi, quo etiam Cl. Auctor condyloma, ex ano propendens, feliciter extirpauit.
- P. 800. Finem huic volumini imponit oratio Anglica a Cl. ARNAUD Londini *de usu anatomiae* habito, cuius versio Gallica addita est.

Adiecta



Adiecta est appendix, in qua Cl. Auctor contra Cel. LOUIS, \*) defendit, etiam post herniae reductionem saccum herniae reductum incarcerationis intestini causam esse posse.

XVI.

Svar på kongl. Vetensk. Academiens Fråga huru all slags Frisæl kan förekommas och botas, så hos Barnfångs-Hustruv, som andra? Hvilken Fråga varit framställd, at besvaras År 1769. Stockholm, tryckt hos Direct. Lars Saluius 1770. 8. pgg. 39.

h. e.

Responsio ad questionem Reg. Academiae scientiarum, quomodo quaelibet purpura taina apud puerperas, quam alios aegros optime auertatur et curetur.

**A**uctorem huius scriptionis, quamquam nomen suum non adposuit, scimus esse Cel. A SCHULZENHEIM, cuius eximiae in variolarum insitione et arte obstetricia peritiae varia documenta commentariis nostris iam significauimus. Rationem p. 35. Noster inprimis exanthematis miliaris habuit, quod potius tanquam symptoma vel crisin mali moris, quam morbum sui generis considerat. Contra p. 2. giosum negat esse, etsi, collectis pluribus vno eodemque loco hominibus, et sub eadem tempestate febres eiusmodi incidere possunt, quibus miliares pustulae comites sese associant. In Suecia malum vix p. 3. ante triginta annos medicis cognitum satis fuit; ibi-

K 4

dem-

\*) vid. Memoir. de l'Acad. de Chir. T. IV. Reflexions sur l'opération de la Hernie. p. 199. vid. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 18.

demque versus aestatis finem luculentius, quam vere sese manifestat, hieme autem tum modo ingruit, quando calore conclauium eorundemque arcte nimis clauorum vitium commissum fuit. Haud exiguum autem originis mali culpam in medicos coniicit, qui febres mox et sub ipsa earum exacerbatione emeticis et drausticis aggrediuntur, vel alterantibus variis illarum genium peruertunt, vel evacuationem, quam natura sponte meditatur, intempestiue accelerare student, vel sudoriferorum calidorum, pellentium cet. prodigi sunt, aëris denique renouationem et mitia refrigeria: venaesectionem et eiusmodi alia praesidia reformidant.

p. 6.

His praemissis, febres Cl. Auctor nominat, quibus sub istis vitiis purpura accedit, et symptomata recenset, ex quibus imminentis mali suspicio capi potest. Sedulo simul admonet, ne apparenti, quod saepe eruptio huius exanthematis creat, leuamini fides tribuatur.

p. 8.

Modus, quo praeuertitur purpurae, pro diuersa quidem febris, cui sese adiungit, natura, quodammodo differt, venaesectione tamen, clysmatibus, rhabarbarinis, emeticis et antiphlogistica medela tempestiue adhibita, et commoda diaeta in subsidium sumta, prout febri ipsi, ita accessorio huic malo, ob-

p. 10.

viam itur. Seorsim vero Cl. Auctor puerperarum rationem habens, quid abortum vel partum praematurum perpeffis, quid demum feminis, iusto tempore partum enixis, obseruandum significat. Ampla hic patuit Nostro occasio, incongrua multa consilia, quae ab obstetricibus insciis et ignaris medicis tentantur, ipsarum quoque puerperarum errores, reprehendendi, quo pertinet partum accelerandi conatus, in secundinis extrahendis nimia festinatio, stragulorum nimis densorum abusus, opiatorum calidorumque et sudoriferorum remediorum incongrua



grua praescriptio, ventris, partu absoluto, iusto arctior constrictio, neglectum matris, prolem proprio lacte nutriendi, officium, aliaque, quae per partes eundo Cl. Auctor accurate definit, nobis autem ob breuitatem iniunctam repetere non datur.

In curatione regimini frigido et medelae, inflam- p. 27.  
mationi accommodatae, maximam vim tribuit, quan-  
tumque his praesidiis profecerit, exemplis Cl. Au-  
ctor demonstrat. A venaesectione, eruptione iam p. 33.  
facta, nihil adiumenti sperat. Et corticem Peruuia- p. 34.  
num damnum potius, quam vsum attulisse, expertus  
est, praecipue sub incremento morbi et vigore. Nec  
in vesicatoriis fiduciam ponit.

Purpuram rubram et chronicam, quae aliis p. 35.  
scorbutica dicitur, paucis tantum Cl. Auctor perse-  
quitur. Inter istam et miliarem idem discrimen sta-  
tuit, ac inter morbillos et variolas, proxime vero  
miliarem accedere ad sudorem anglicum. Nec ru-  
brae, nisi vitiis manifestioribus commissis, periculo-  
sum euentum tribuit. Ex connubio vero purpurae  
rubrae et miliaris periculum insignius, adhuc vero  
maius miliari cum petechiis iuncta, subnatum obser-  
vauit. Contra chronicam ea commendantur, quae  
scorbuto opportuna sunt; de venerea enim dicere  
huius loci non fuit.

XVII.

IOANNIS BERNHARDI DE FISCHER, Medic. Doct. et quondam Russiar. Imperatric. Annae gloriosae memoriae personae medici et per Russias res medicas dirigentis quondam archiatri, vt et Acad. Imper. nat. curios. Colleg. de febre miliari, purpura alba dicta, e veris principiis eruta et confirmata tractatus per longam experientiam collectus. Rigae, sumtibus Io. Frider. Hartknoch 1767. 8. pl. 9. cum praefamine et tractatus sciagraphia.

**E**x sciagraphia, huic tractatui a Cl. FISCHERO, summo senio iam confecto, aliisque scriptis clario \*), praemissa, patet, eum, febris miliaris descriptionem in se continentem, septem capitibus constare. Nimirum de vesiculis miliaribus absque febre, de febre miliari, seu de purpura alba puerperarum, de febre miliari, purpura alba dicta, idiopathica et symptomatica, de natura febris miliaris, ex symptomatibus eruta, de prognosi et praeservatione, ac demum Cl. FORDYCE historiam febris miliaris \*\*), qui in quibusdam locis contrariatur Nostro, refutat et suas partim, partim aliorum addit observationes.

P. I.

Ad vesiculas miliares sine febre refert Noster vesiculas illas crystallinas infantum neonatorum insigniter prurientes, quae florem cutis seu comedones, seu crinones alias appellant. Contra illos, qui hoc exanthema ex pathologia verminosa explicant, dicit, illudque, vermiculis plane dissimile, atque eminentes minimos neruorum apices esse monstrat. *Nervorum enim, inquit, apices papillas in cute facilius dari, quam*

\*) vid. Comment. nostr. decad. I. indic. triplic. sub voce *Fischer*.

\*\*) quae prodiit Londini 1753. 8.



*quam vasorum, anastomosi sese excipientium, in aprico est.* Quo fundamento nititur quoque distinctio purpurae idiopathicae et symptomaticae, a Cl. Auctore prolata. Purpura alba idiopathica ea est, quae immediate ex adfectis nervis oritur, febre ipsa ex his adfectis accensa. Symptomatica vero, in qua haec nervorum singularis affectio alius causae febribus accedit. Proximam itaque purpurae causam quaerit Noster in fluido nervico et, purpuram profecto interdum esse naturalem, nec semper artificialem, eamque aliorum morborum saepenumero esse symptoma, contendit et exemplis illustrat.

Inter observationes, quas Cl. Auctor proposuit, p. 32. liceat hanc potissimum commemorare. Vir annorum sex et triginta, tenero et laxo corporis habitu praeditus, cephalalgia, lassitudine et febricula corripitur. Vena secta, die sexto purpura alba apparebat cum delirio. Quo, altera venae sectione instituta, vesicatoriis clysmatibusque adhibitis et remediis antiphlogisticis exhibitis, cessante et redeunte, pustulisque miliaribus novis prioribus superuenientibus, die decimo tertio morbi mortuus est. Pertinacis huius delirii causa, cadauere aperto, detegebatur. Intra cranium nulla inflammationis signa, vasa sanguinea tam meningum, quam cerebri omni fere sanguine destituta; pia mater ob extrausam lympham paululum turgebat et ventriculi quoque lympham erant impleti. Plexus choroideus pallidus, in dextro latere pallidissimus. Glandula pinealis lapillis referta. Substantia cerebri sat consistens, medulla oblongata duriuscula. Sterno soluto atque seposito, cor cum pericardio ex humiditatis defectu concretum deprehendebatur. Ambo ventriculi atque auriculae cordis sanguine carebant. Summa ceterum corporis ficcitas, musculorum pallor, pinguedinis defectus, et sanguinis omnino inopia in toto corpore deprehendebatur.

Praemissis

P. 51. Praemissis itaque exemplis, miliaria exanthemata cum et sine febre spectantibus, a Cl. Auctore pariter, ac ab aliis obseruatis et collectis, in naturam huius morbi inquiri Noster. Cum, vti supra monuimus, in neruis atque fluido nerueo harum pustularum miliarium quaerat sedem Cl. Auctor, et HAMILTONUS et ALLIONIUS \*) ad neruos quoque respexisse videantur, hanc suam sententiam ideo fouet, quoniam naturam sanguinis et naturam fluidi neruei conuenire inter se, et sanguinem e. c. tenuem, seu acidum, seu alcalinum secretionem fluidi neruei, eodem modo vitiiati, praestare oportet.

P. 56. Quemadmodum Cl. Auctor inter purpuram et hypochondriacum, hystericumque malum omnino intercedere magnam conuenientiam, sic anxietatum et pectoris suppressionum variarum rationem esse habendam arbitratur. Suadet propterea sedulam attentionem ad viscera abdominalia, eorundemque, ac potissimum quidem mesenterii, dispositionem et varias anxietatis species pertractat, et laudat antispasmodica.

P. 74. His itaque pertractatis, antequam therapiam febris miliaris persequitur, haec habet: *milia vesicularia seu purpura alba, sunt neruorum excretiones halituosae, quibus, si spasmus febrilis adest, vel ex domestica corporis caussa, vel ex animi pathemate, vel ex aëre, succum neruorum alterante, sanguinem in visceribus coagumentans et primario plexum mesentericum in tumultum agens, adeo, ut ex his, in consensum actio paris vagi neruorum ramulo, ad praecordia anxietates, vigiliae, deliria, conuulsiones, aestus volatici, sudores et reliqua hypochondriacis et hystericis solemnia symptomata generentur, pro dato neruorum robore; facile vel difficulter sanabilia, quia in hoc posteriori casu, saepissime in apoplexiam vel in partium nobiliorum, vel in ipsorum*  
neruorum

\*) vid. Comment. nostr. Vol. VIII. p. 600.



*neruorum visibilem, aut inuisibilem necrosin, cum morte, raro sanitate terminantia.* Tum triplicem Noster proponit feбри miliari medendi methodum. Ac primum quidem, purgatis primis viis, inprimis per vomitoria, suadet Noster, spasnum febrilem sopire, dein vires vitae sustentare, h. e. neruorum genus roborare, ac tandem excretionis periphericae non primariam, pathognomonicam tamen habere rationem. Quapropter vt in omnibus exanthematibus, sic et in purpura, sustentatio toni systematis neruosi per frictiones, analeptica aliaque remedia primaria Nostro videtur esse indicatio. Aquae frigidae vsum externum in purpura temerarium iudicat, atque hydrophobiae similitudinem cum purpura, ab ALLIIONIO \*) prolatam, negat.

Quod ad primam indicationem, quae in spasmop. 78. sedando cernitur, attinet, inter alia antispasmodica, opio quoque circumspecte vsus est. Stupefacientem quidem opii effectum largitur Noster, quo frictio fibrarum exaestuans impeditur et humoribus acerbis eliminandis e corpore datur locus, se et excretionibus liberioribus redditus.

Tertia indicatio, ad exanthema hoc spectans, orta p. 90. est ex obseruationibus, a Cl. Auctore factis. Cum enim copiosissimam miliarium eruptionem, eodem modo, quo variolarum, petechiarum, morbillorum, carbunculorum largam excretionem, mortem accelerasse, neruis per nimiam hanc excretionem adeo debilitatis, et mediocrem purpurae eruptionem redintegrasse sanitatem viderit, praecipit, ad neruos potissimum esse respiciendum in purpura aequae, ac in omnibus exanthematicis morbis, ita tamen, vt exanthematis ratio quoque habeatur, nec vilo modo illud negligatur. Quapropter grauissima quoque symptomata morbi huius, vt pectoris oppressiones, faucium

\*) vid. Comment. nostr. l. 6.

faucium strangulatio, lipothymiae, vigiliae, pulsus arteriarum in cordis scrobiculo, vel in hypochondriis, deliria, conuulsiones, stupor comatosus, excretio gelatinosa per aluum, sudor effusus vrens, vrina parca, diarrhoea, frigus internum, lochiorum fluxus in puerperis, recenset eorumque medelam addit, ac in fine suadet, purpuram symptomaticam aequae, ac idiopathicae nunquam esse negligenter tractandam.

XVIII.

Diff. inaug. de vstione cranii in epilepsia. Praefide HENRICO FRIDERICO DELIO. Auctore et Resp. *Ioanne Philippo Iulio Rudolph*, Erlang. 1768. 4. pl. 7½.

- E**pilepsiae definitione, speciebus, causis, symptomatibus atque signis praemissis, ad observationes et epicrises in easdem Cl. Auctor sese accingit.
- p. 19. Ac cum limites disputationis non ferunt, cuiuslibet epilepsiae speciei methodum medendi persequi, de solo inustionis remedio, agere, eamque speciem epilepsiae, cui vstio inferuit, definire instituit Cl. Auctor. Postquam enim viderat, non vbique epilepsiae vstionem mederi, eo maiori attentione in hanc rem inquisiuit.
- p. 36. Atque vstionem salutarem inuenit in his speciebus epilepsiae idiopathicae, vbi vel stagnationes in minimis vasculis encephali liberum humorum transitum impediunt, vel vbi epilepsia a nimia sensibilitate systematis nervosi, vel vbi ab animi commotionibus, in sensibilibus praesertim nimis, oboritur.
- p. 40. Tum modus operationem instituendi a Nostro proponitur. Praemissis nimirum leniter laxantibus, reuellentibus, venaesectione, cauterio vsus est tali propemodum, quale HEISTERUS \*) in icone dedit.

Hoc

\*) Institut. chirurg. Tab. III. fig. XI.



Hoc candefactum, capillis sublatis, nullaue praegressa integumentorum incisione, capiti, quod fortiter tenebatur, applicuit ibi, vbi futura sagittalis attingit coronalem. *Ne autem cranium ferro candente nimis incalesceret, inquit, retraxi ferrum et aliquantisper exspectavi, mox denuo applicavi, vel idem cauterium, vel si mora frigefactum fuerit, aliud bene candens, ut ita breui temporis spatio, cutim satis profunde (h. e. usque ad pericranium et cranium) penetrauerit.* Tum suppurationi et exfoliationi cranii, tandem consolidationi vulneris Noster consuluit.

Hac methodo defensa, ad rationes Cl. DE HAEN, p. 42. qui hanc operationem plane reiicit \*), Noster progreditur, easque refellit, atque demonstrare annitur, ex nonnullis infauis exemplis, rem bonam non esse penitus repudiandam, atque verissime, vti Noster opinatur, statuit, vstionem capitis, nec semper et omnino, nec tamen quoque nunquam esse proficuum. Quod si vero causa morbi non in capite latet, iucundioraque remedia supersunt, et Noster reiicit hoc vstionis remedium. Alias idem sentit, quod olim CELSUS: Melius esse in desperatis morbis anceps remedium experiri, quam nullum.

## XIX.

D. IOH. AUG. WOHLFART observatio de vermibus per nares excretis. Hal. Magdeb. 1768. 4. plag. 4. cum praef. fig. aen. 1.

Quo grauiorum morborum latentem saepius causam vermes constituunt, eo digniores, quae cognoscantur, sunt observationes, quae de eorundem saeuitie testantur. Hinc laudandum est studium Cl.

WOHL.

\*) vid. Ration. medend. Part. VI. p. 239. Commentar. nostr. Vol. XII. p. 141.

WOHLFART, qui vermes ex sinistra cauitate narium senis septem et sexaginta annorum, per octiduum pertinaci cephalea et dextri capitis lateris tumore exagitati, praegressa narium per triduum continuante haemorrhagia, excretos hoc libello et concinna oratione descripsit, et aptis figuris aeri incidi curauit. Prodierunt vero cum leuamine aegri vermium eiusmodi duodeviginti, albidi omnes coloris, qui vase vitreo, terram continente, inclusi, paucis diebus interiectis in erucas subnigras et duras mutati, integro mense elapso, muscas dederunt, oculis lateritii ruboris, antennis filiformibus, proboscide inflexo, palpis hirsutulis et clauiformibus; quae singula aequae atque vermibus muscae, tum in magnitudine naturali, tum eadem per microscopium aucta depicta habentur. Vermis, undecies intersecto corpore instructi capiti duo vinci dati sunt unguliformes nigri, duri, mobiles, quibus dum inter rependum posteriorem corporis partem attrahere intendit, caput firmatur, quosque alias ita retrahit, ut plane lateant. Vltimae intersectioni depressio inest, cum duobus stigmatibus, totumque corpus pilis nigris breuibus et sparsis obsidetur. His enarratis, Auctor similes casus ab aliis obseruatos et memoriae proditos recenset, tandemque breuiter excussa vermium in corpore humano generatione, vermium senis istius genesin eam esse existimat, ut muco de naso dormientis forte propendenti imposuerit musca quaedam sua ouula, quae una cum muco retracta, inque sinibus frontalibus fota vermes excluderint, mole pariter atque irritatione indicata symptomata producentes.

---



Noua physico medica.

**F**acultatis medicae *Tolosanae* doctores et professores sunt:

Cl. LABOUR, Decanus facultatis et professor institutionum.

Cl. DAUBONS, professor institutionum.

Cl. DUBERNARD, professor botanices et materiae medicae et academiae regiae scientiarum *Tolosanae* socius.

Cl. MAYNARD, professor anatomiae et chirurgiae eiusdemque academiae sodalis.

Repetimus cum regia chirurgorum Academia *Parisiensi*, quae duplum distribuet illi praemium, cuius explanatio placebit, quaestionem a nobis iam commemoratam \*), praxin chirurgicam spectantem et ad annum 1772 pertinentem. Optat nimirum *Eadem*, ut, *disquirantur incommoda, quae oriuntur ex abusu unguentorum et emplastrorum et quaenam emendatio ulcerum tractandorum in praxi chirurgica possit recipi.* (*Exposer les inconvénients, qui résultent de l'abus des onguens & emplâtres & de quelle réforme la pratique vulgaire est susceptible à cet égard dans le traitement des ulcères*).

Singulum itaque praemium erit moneta aurea ducentarum pondo Gallicarum, quod expectare licet. Ceterum commentarii Latina vel Gallica sunt conscribendi lingua et Cl. LOUIS, qui Academiae ab epistolis est, mittendi ita, uti apud alias Academiae fieri solet; ideoque reliquis legibus enarrandis hic supersedebimus, hocque unicum addemus, quod commentarii ab Academia ante finem 1772 expectentur.

Caesareo

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 355.

Caesareo regia agriculturae et scientiarum Societas, quae *Clagenfurthi* in Carinthia conuenire solet, annum praemium, quod est moneta aurea triginta sex aureorum pondere, dicauit huic quaestioni: *Quaenam sit optimus modus lignum coquendi, seu ex eo in usum vstrinarum carbones conficiendi et quaenam ligni species ad hoc praestandum, quam optime conueniat?*

Comentarios, qui ante finem septembris 1771 tradendi sunt Societati, lingua Germanica, Gallica, Italica et Latina conscribere licet. Reliqua, quae sint obseruanda, ita constant, vt eas silentio praeterire facile possimus.

Inter quinque elaborationes quaestionis: *quomodo purpura puerperarum aequae ac purpura in uniuersum sit curanda et arcenda*, ea potissimum regiae Academiae scientiarum *Holmiensis* nata est assensum, quae a DAVIDE VON SCHULZENHEIM inoculatione variolarum claro \*) ideoque nobilitatis diplomate ornato, erat tradita. Cum autem per leges Academiae ei socio non liceat praemium reportare, in scheda obsignata non professus est suum nomen ideoque, celato Auctoris nomine, haec elaboratio est edita et a nobis \*\*) iamiam indicata.

CHRISTIANUS RUDOLPHUS HANNES medicinae Doctor et poliater Vesalianus, variis scriptis clarus, inter socios Academiae imperialis naturae curiosorum est relatus.

*Touanae in Murcia* DON ANTON. CAP. DE VILLA a Rege botanices et agriculturae professor est creatus. Docet agricolas agriculturam diebus sacris hora decima usque ad duodecimam, diuites per omnes

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 349.

\*\*) vid. Comment. nostr. Vol. hoc p. 151.



omnes hebdomadis dies. Ceterum examinabit et exhibebit herbas in horto regio non diu exstructo.

Potentissimi Regis Galliae clementia erga Cl. BUFFON, qui horto et museo regio praeest, erat tanta, vt, cum BUFFON ipse hoc humaniter peteret a Rege, Comitem DE LA BILLARDERIE D'ANGIVILLER sibi mortuo successorem dari, clementissime ei permetteret. Praeterea liberum aditum ad se Rex concessit BUFFONO, eiusque praediis comitatus priuilegia dedit. Quo insignis beneuolentiae signo atque beneficio non solum BUFFONUS, sed et eius posterii fruuntur.

Quamquam GEORGIUS CHRISTIANUS OEDER, botanica aequae ac oeconomica doctrina clarus, vti a nobis \*) relatum est, alio iamiam munere fungitur, tamen Flora Danica ab Eo continuabitur. Botanica autem professio, quam antea habuit Cl. OEDER cum omnium plausu, cum academia est coniuncta, et locus, qui horto regio erat dicatus, superiorum iussu aliis vsibus destinatus est.

Nec minus, Cl. OEDERO moderante, pericula contagii, quod inter armenta grassatur, transferendi continuabuntur.

*Lugduni Batauorum* successit b. BERNARDO SIGFRIED ALBINO \*\*) Cl. GUALTIER VAN DOEVEREN, Groeningensis antea medicinae, chymiae et artis obstetriciae professor, qui in posterum in hac Lugdunensi Academia professoris medicinae ordinarii munere fungetur.

*Ibidem* Cl. EDUARDUS SANDIFORT, Medicinae Doctor Hagae Comitum, Lector anatomiae et chirurgiae est denominatus.

L 2

Quam-

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XVI p. 710.

\*\*) ibid. p. 350.

Quamquam hoc munus, cuius adeundi causa IOANNES CHRISTIANUS POLYCARPUS ERXLEBEN artis veterinariae doctrina clarus orationem habuit atque programma scripsit, non huc pertinet, tamen ob rem veterinariam, quam spectant oratio aequae ac programma, liceat eorum hic mentionem facere.

Ultimo nimirum decembris 1770 die *Göttingae* Cl. ERXLEBEN munus extraordinarii professoris philosophiae adiit oratione, in qua *de arte veterinaria veteribus maxime aestimata, diu postea neglecta atque inculta, hodie vero laetissime efflorescente erroresque suos expurgante* dictum est, atque programme, in quo *dubitationes, quas Cl. BERGIUS contra translationem contagii, quod inter armenta grassatur, posuit, ab Eo sunt solutae.*

*Holmiae* Experientissimus IONAS BOECKMANN \*) archiater regius et Holmienſis ciuitatis physicus quinquagesimo quinto aetatis anno die 4. aprilis 1770. desiit viuere.

*Altorfi* die 11. aprilis 1771. IOANNES TRAU-GOTT ADOLPH \*\*) medicinae Doctor et professor publicus ordinarius pleuritide quadragesimo quarto aetatis anno obiit.

Rex Anglorum obseruatorio Academiae *Göttingensis* horologium donauit a IOANNE SHELTON, nobili artifice, confectum, quale a Britannicis astronomis *Regulator* dicitur, cuius penduli oscillationes frigoris et caloris vicissitudine non mutantur.

Huius structura huc redit, vt compositione et coniunctione plurium perticarum e chalybe et ori-chalco, quarum vna plus, quam altera extenditur

\*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 546.

\*\*) ibid. p. 551.



in eodem gradu caloris, longitudo penduli eadem maneat. Cl. HARRISONUS 1726. primus hanc methodum indicavit, vt DE LA LANDE in astronomia ab eo edita, paragrapho 1971. dicit, vbi etiam descriptio et icon, quamquam non accurate expressa, reperiuntur. Cum vero oscillationes huius *Regulatoris* vix percipi possint, additus est singularis index minutarum et secundarum.

## XXI.

Index scriptorum physico medicorum, quae anno 1768. prodierunt.

**C**atalogue hebdomadaire: ou liste alphabétique des livres tant nationaux qu'étrangers; des arrêts du conseil et des parlemens, déclarations et édits du Roi, extraits du conseil et des registres des parlemens, lettres patentes du Roi, ordonnances, sentences etc. cartes géographiques, musique et estampes, qui sont mis en vente chaque semaine avec l'indication des Auteurs, du nombre et du format des volumes et les adresses des libraires et autres, qui les vendent. Année 1768. à Paris. 8.

Natuur en geneeskundige bibliotheek, waarin in het kort voorgedraagen worden alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie buiten ons Vaterland vitkomen III. Deels 2 Stuck. In's Gravenhage. 8. (Auctore EDUARDO SANDIFORT).

Recueil de mémoires, ou collection des pieces académiques concernant la médecine, l'anatomie, la chirurgie, la physique expérimentale, la chymie, la botanique et l'histoire naturelle, tirés des meilleures sources. Tome troisième de la partie Françoisse, faisant le dixieme Tome de la collection académique. Vol. I. à Dijon et à Paris. 4.

Philosophical transactions, giving some account of the present undertakings, studies and labours of the ingenious in many considerable parts of the world. Vol. LVII. for the Year 1767. Lond. 4. c. tab. aen.

Medical Transactions published by the College of Physicians in London. Volume I. ib. 8. c. tab. aen.

*Arztneykundige Abhandlungen herausgegeben von dem Collegio der Aertzte in London. Aus dem Englischen übersetzt von CARL CHRISTIAN KRAUSEN. 1ster Band. Leipzig. 8 mit Kupfern.*

Histoire de l'Académie royale des Sciences, année 1765. avec les mémoires de mathématiques et de physiques pour la même année. Tirés des registres de cette Académie. à Paris. 4. c. tab. aen.

Mémoires de mathématiques et de physiques, présentés à l'Académie Royale des Sciences par divers savans et lus dans ses assemblées. Tome V. ib. 4. c. tab. aen.

Verhandelingen vitgegeeven door de hollandsche maatschapye der weetenschappen te Haarlem. X Deel. Te Harlem. 8. c. tab. aen.

Kongl. Vetenskaps academiens handlingar för år 1768. Vol. XXIX. Stockholm. 8. c. fig. aen.

*Der Königl. Schwedischen Academie der Wissenschaften, Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltung, der Mechanik auf das Jahr 1766. Aus dem Schwedischen übersetzt von ABRAH. GOTTHELF KÄSTNER. 28. Band. Hamb. und Leipzig. 8. m. K.*

Noui commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae Tom. XII. Petropol. 4. cum tab. aen.

*Auserlesene medicinische, anatomische, chymische und botanische Abhandlungen der Römisch Kayserlichen Academie der Naturforscher XVII. Theil. Nürnberg. 4. mit Kupfern.*

Stral-



*Stralsundisches Magazin oder Sammlungen auserlesener Neuigkeiten zur Aufnahme der Naturlehre, Arzneiwissenschaft und Haushaltungskunst. 2tes und 3tes Stück. Berlin und Stralsund. 8. mit Kupf.*

*Fränckische Sammlungen von Anmerkungen aus der Naturlehre, Arzneygelahrheit, Oekonomie und den damit verwandten Wissenschaften. 8ter Band. Nürnberg. 8.*

*Histoire de l'académie royale des sciences et des belles lettres de Berlin. Année 1766. avec les mémoires pour la même année. à Berlin. 4. mai. avec fig.*

*Eiusdem l'année 1761. ib. 4. mai. avec fig.*

*Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneiwissenschaft, Naturgeschichte, Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahineinschlagenden Literatur 1stes bis 6tes Stück. ib. 8.*

*Neues Hamburgisches Magazin, oder Fortsetzung gesammelter Schriften aus der Naturforschung, der allgemeinen Stadt und Land-Oeconomie und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. 4ter Band. Hamburg und Leipzig. 8.*

*Physicalisch ökonomische Auszüge aus den besten Schriften, die zur Naturlehre, Haushaltungskunst, Policy, Cameral und andern damit verwandten Wissenschaften gehören, 9ten Bandes 4tes Stück. Stuttgart. 8.*

*Zum Nutzen und Vergnügen. Eine medicinische Wochenschrift 3ter Band. Naumburg. 8.*

*Histoire naturelle et politique de la Pensylvanie et de l'établissement des Quakers dans cette Colonie, traduite de l'Allemand par P. M. D. S. Censeur Royal. à Paris. 12.*

*Histoire naturelle, générale et particuliere avec la description du cabinet du Roi. Tome XVI. ib. 4. c. tab. aen.*

*Allgemeine Historie der Natur, nach allen ihren besondern Theilen abgehandelt, nebst einer Beschreibung der Naturalienkammer Sr. Maj. des Königs von Franckreich. 6. Theils 2ter Baud. Leipzig. 4. mai.*

British Zoology Class. I. Quadrupeds. Class. II. Birds Vol. I. London. 8. c. tab. aen. (Auctore THO. PENNANT).

*Eiusdem Vol. II. Class. II. Genus XVIII. etc. Birds, with an appendix: an essay on Birds of Passage and an index. ib 8. c. tab. aen.*

*Mineralogische Belustigungen zur Behuf der Chymie und Naturgeschichte des Mineralreichs. 1ster und 2ter Theil. Leipzig. 8. mai. m. K.*

Florae Danicae iconum fasciculus septimus a tab. CCCLXI - CCCCXX viuis coloribus pictis (germanice et latine) Hafn. fol.

The fruit gardener, containing the method of raising stoks for multiplying fruit trees etc. directions for laying out and managing fruit gardens etc. Lond 8. mai.

Les Jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture. à Amsterdam. 8. (Auctore MARQUIS DE ST. SIMON).

*Der im schönstem Flore stehende Blumengarten oder Abbildung der lieblichsten Blumen in 43. illuminirten Blättern, nebst der ausführlichen Beschreibung, (latine et germanice) Nürnberg. fol. mai.*

Mémoires et obseruations recueillies par la société économique de Berne. Partie I - IV. pour l'année 1768. à Berne. 8.

Museum rusticum et commerciale, oder auserlesene Schriften, den Ackerbau, die Handlung, die Künste und Manufacturen betreffend, aus der Erfahrung genommen und von verschiedenen in dieser Verrichtung geübten Männern mitgetheilt, von einigen Mitgliedern



*Mitgliedern der Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste, Manufacturen und Handlung aber durchgesehen und herausgegeben. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerckungen begleitet 9ter und 10ter Band. Leipzig. 8. m. K. (germanice reddidit I. I. S.).*

*Allgemeines oeconomisches Forstmagazin, in welchen allerhand nützliche Beobachtungen, Vorschläge und Versuche über die wirthschaftliche Policey und Cameralgegenstände des sämmtlichen Wald-Forst- und Holzwesens enthalten sind; gesammelt von einer Gesellschaft, deren ordentliches Geschäftes ist Waldungen zu gewinnen, zu benutzen und zu erhalten 11ter und 12ter Band. Franckf. und Leipz. 8. (Auctore IO. FRIEDRICH STAHL).*

*Allgemeine Haushaltungs- und Landwissenschaft aus den sichersten und neuesten Erfahrungen und Entdeckungen geprüft und in Ausübung gebracht von einer oeconomischen Gesellschaft in Engelland, 5ter und letzter Theil. 8. mit Kupfern.*

*Betrachtungen über landwirthschaftliche Dinge in den Herzogthume Württemberg. 3. Stücke. Tübingen. 8.*

*Histoire des charançons avec les moyens de les détruire. Avignon. 12.*

*Naturgeschichte der Kohlraupe, samt den Mitteln dieselbe zu vertilgen. Mannheim.*

*Die beste Art Kornmagazine und Fruchtböden anzulegen, auf welchen das Getraide niemahls weder vom weissen, noch vom schwarzen Wurme angesteckt werden kann. Hannover. 4. m. K. (Auctore GEORG. FRIDER. DINGLINGER).*

*Von Bau auf Steinkohlen. Mit einer Vorrede von Hofrath MEDICUS. Mannheim. 8.*

*Traité complet sur la maniere de planter et de cultiver la vigne, extrait de MILLER, augmenté par un membre de la société économique de Berne. Yverdun. 12.*

Swar på wetenskaps academiens fråga: hvilka för-  
rättningar äro de bästa at vnderhålla tilräkelig til-  
gång på skog här i landet. Stockholm.

*Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu  
Lande. XIX. Theil. Leipzig. 4. mai. m. Kupf.*

*Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen  
in einen ausführlichen Auszuge. 7ter Band. Ber-  
lin. 8. mai. m. K.*

A six weeks tour through the southern counties of  
England and Wales, in several letters to a friend  
by the Author of the Farmer's letters. Lon-  
don. 8.

*Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollstän-  
dige Beschreibung derselben, gefertigt und gebilli-  
get von den Herren der Academie der. Wissenschaft-  
ten zu Paris. Mit vielen Kupfertafeln. 7ter Band.  
In dieser teutschen Übersetzung mit Anmerkungen  
herausgegeben von DANIEL GOTTFRIED SCHRE-  
BER. Königsberg. 4. mai.*

L'art du ferrurier, contenant soixante dix sept feuil-  
les d'impression et quarante planches. à Paris. fol.

L'art du cordonnier, contenant quatorze feuilles et  
demie d'impression et cinq planches. ib. fol.

*Vergleichung des Zustandes und der Kräfte des Men-  
schen, mit dem Zustande und den Kräften der Thie-  
re. In auserlesenen Anmerkungen über die Erzie-  
hung, die Naturgaben, die Künste und Wissenschaft-  
ten und die Religion. Aus dem Englischen nach  
der 4ten Ausgabe übersetzt von I. B. S. Frankf.  
und Leipzig. 8.*

*Vermischte Abhandlungen der physisch-chymischen War-  
schauer Gesellschaft zur Beförderung der praktischen  
Kenntniß. 1 Bandes 1stes Stück. Dresden und War-  
schau. 8.*

*Kleine Abhandlungen einiger Gelehrten in Schweden  
über verschiedene in die Physik, Chemie und Mine-  
ralo-*



*ralogie laufende Materien. 2ter und letzter Band.*

*Aus dem Schwedischen übersetzt. Leipzig. 8.*

*Briefe eines Arztes an verheyrathete Frauenzimmer.*

*Aus dem Englischen übersetzt. ib. 8.*

*Allgemeine Begriffe der Chymie nach alphabetischer Ordnung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von D. CARL WILHELM PÖRNER. 1ster Theil. ib. 8.*

*Alchymia denudata reuifa et aucta, oder das bis anhero nie recht geglaubte, durch die Experimente nunmehr beglaubte Wunder der Natur. 1ster und 2ter Theil. ib. 8.*

*Neu verbessertes Dispensatorium oder Arzneypuch, in welchen alles, was zu der Apotheckerkunst gehöret nach den Londoner und Edimburger Pharmacopeen mit practischen Wahrnehmungen und Bemerkungen vorgetragen wird. 1ster Theil. Aus dem Englischen übersetzt. Hamburg. 8.*

*Dictionnaire botanique et pharmaceutique contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les préparations de pharmacie internes et externes les plus usitées en médecine et en chirurgie. à Paris. 8. par \* \* \*.*

*Chymische Abhandlung, worinnen die verschiedene Bereitung der Spießglas Tinctur und die davon abhängende Eigenschaft und Wirkung untersucht, auch zugleich die Vortreflichkeit und Tugend der von dem seeligen D. VATER in Wittenberg erfundenen Tinctur erkläret wird. Mit Anmerkungen. Jena. 8.*

*Dissertations sur les antiseptiques, qui ont concouru pour le prix proposé par l'académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon en 1767. dont les deux autres ont partagé l'Accessit imprimés par ordre de l'académie. à Dijon et à Paris. 8.*

*Abregé économique de l'anatomie du corps humain,*

main, à la portée de toute personne, qui veut se connoître et s'instruire en cette partie, ainsi que de tous ceux, qui se destinent au grand art de guerir les malades. à Paris. 12.

*Nachricht an das Publicum, wie der warme Rocken-  
trank auf eine gute Art zubereitet, und mit welchen  
Nutzen selbiger anstatt des Coffee gebraucht wer-  
den kann. Berlin. 8.*

*Vertraute Briefe über den Coffee aus Korn und andern  
innländischen Gewächsen. 1ste Sammlung. Leipzig.  
8. mai.*

*Briefe eines Arztes an ein Frauenzimmer über die  
Kochkunst. Hamburg und Lüneburg. 8.*

*Anweisung, wie den Menschen, welche in Wasser oder  
von der Kälte erstarret oder erhenket und erdroßelt,  
oder auch von schädlichen Dünsten entkräftet, gefun-  
den werden, zu helfen sey, um sie beym Leben zu er-  
halten. Braunschweig. 8.*

*Du traitement et de l'exstinction de la variole et de  
la rougeole suivi d'un discours aux hommes sur  
leur santé. à Lyon. 12.*

*Notizie del l'innesti di vajuoli fatti in Cephalonia.  
Venet. 8.*

*Mémoire sur le fait de l'inoculation. à Paris. 4.*

*Examen des principaux points de la réponse à l'ar-  
gument tiré du nombre des personnes mortes en  
Angleterre de la petite vérole naturelle et artifici-  
elle avant et depuis la pratique de l'inoculation.  
ibid. 4.*

*Ordeel van de Genees-en Heel-meesters van den  
koning van Engeland, aangaande de manier van  
inentinge der Kinder-pokies der Heeren Sutto-  
niaanen. Ter gelegenheid van eeken brief van  
den Ridder JOHN PRINGLE aan den Heere*



BRADY in Brussel gedagtekend den 6. mai 1767. en eenen anderen van den Graave KAUNITZ RITTBERG aan den Graave SEILERN, afgezent van de Keyzerinne Koninginne aan den Koning van Groot Brittannie, gedagtekend den 17. dec. 1767. Uit hed Engelsch vertaald. In's Gravenhage. 8. mai.

Exposition des effets d'un nouveau remède dénommé syrop mercuriel rendu public conformément à la lettre adressée à l'auteur par Monseigneur LE DUC DE PRASLIN. On y a joint une instruction détaillée sur la manière d'employer ce remède dans les maladies vénériennes de toute espèce dans les écrouelles et le rachitis autrement la maladie des enfans noues. Vol. I. à Paris. 12.

Mémoires de l'academie Royale de chirurgie. Tom. IV. ib. 4. c. tab. aen.

Doutes, que la cataracte dont Mr. RÖNNOW fait mention dans son discours prononcé à l'Academie royale des sciences ait été osseuse ou pierreuse. Stockholm. 8.

Consultation de chirurgie, ou examen d'un rapport juridique, fait à l'occasion de CLAUDINE ROUGE trouvée dans le Rhône. à Paris. 12.

Essais d'agriculture ou diverses tentations physiques, proposée pour l'avantage de la Societé, par Mr. BEARDE DE L'ABBAYE. à Breme. 8.

*Eiusdem über den Ackerbau oder verschiedene physikalische Versuche. Aus dem Französischen übersetzt. ibid. 8.*

BERNH. SIEGFR. ALBINI academicarum annotationum liber octauus. De tabulis scriptisque suis opportunitate epistolae nuperae PETR. CAMPER. Leid. 4. mai.

FR. ARANDI carmen de feuerioribus eruendae veritatis mediis, eorum gradibus et noxis exinde resultantibus cum annexo leſſu, quo manes FridERICI Braun Bobenhuſani tormenta maſcule perpeſſi recitantur. 8.

ARETAEI CAPPADOCIS medici, inſignis ac vetuſtiſſimi libri ſeptem a IUNIO PAULO CRASSO Patauino accuratiſſime in latinum ſermonem verſi. Argentorat. 8.

Mémoires de chirurgie avec quelques rémarques historiques ſur l'état de la chirurgie en France et en Angleterre par G. ARNAUD. Voll. I. II. Londres. 4. mai. avec figures.

GEORG. CHRIST. ARNOLD diſſ. inaug. de motu fluidi neruei per fibras medullares neruorum. Lipſ. 4.

IO. ASTRUCS *theoretisch-practiſche Abhandlung von den Frauenzimmer-Krankheiten. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt und mit einer Vorrede und Anmerkungen begleitet von D. CHRIST. FRIEDRICH OTTO. 1 und 2ter Theil. Dreßden. 8.*

Voyage en Sibérie fait par ordre du Roi en 1761. contenant les mœurs, les uſages des Ruſſes et l'état actuel de cette Puiffance; la deſcription géographique et le nivellement de la route de Paris à Tobolsk; l'hiſtoire naturelle de la même route; des obſervations aſtronomiques et des expériences ſur l'électricité naturelle; enrichi de cartes géographiques, de plans, de profils du terrein, de gravures, qui repréſentent les uſages des Ruſſes, leurs mœurs, leurs habillemens, les diuinités des Calmouks et pluſieurs morceaux d'hiſtoire naturelle, par Mr. L'ABBÉ CHAPPE D'AUTEROCHE de l'académie royale des ſciences. à Paris. 4.

E. B \* \* \*. de principiis vegetationis et agriculturæ  
et



et de caussis triplicis culturae in Burgundia. 8. mai.

ERN. GODOFR. BALDINGER progr. de lectione Hippocratis medicis summe necessaria. Ienae. 4.

Eiusd. *Biographie jetztlebender Aerzte und Naturforscher in und außer Deutschland. 1sten Bandes 1. und 2. Stück. ib. 8.*

Eiusd. *neue Arzeneyen; eine medicinische physikalische Monathschrift. 2ten Bändchens 4tes Stück. Langensalza. 8.*

Eiusd. *catalogus dissertationum, quae medicamentorum historiam, fata et vires proponunt. Altenb. 4.*

Eiusd. *Auszüge aus den neuesten und besten dissertationen der mehresten Akademien, die zur Naturhistorie, Arzeneywissenschaft, Chymie und Physick gehören. 1. B. 1. Stück. Berlin und Stralsund. 8.*

*Art de guerir les hernies ou descentes, ouvrage utile aux personnes attaquées de ces maladies et dans le quel on trouvera la meilleure méthode de construire les bandages convenables à leur curation. Par Mr. BALIN. à Paris. 12.*

HR. GOTTH. BARTH *Abhandlung über die Natur, den Nutzen und Gebrauch des Gesund-Brunnens zu Lauchstädt. Leipzig. 4.*

OB. BASTER'S *verhandlingen over de voortelling der dieren en planten etc. The Harlem. 8. mai.*

*Essai sur la digestion et sur les principales causes de la vigueur, de la durée de la vie etc. par Mr. BATIGNE. D. M. à Berlin. 8.*

T. BEARDMORE *treatise upon the teeth. Lond. 8.*

O. MAR. BEGONTINAE *diff. inaug. de hydrophobia. Vienn. 8.*

O. PETR. BEUCKE *diff. inaug. de ileo. Argentorat. 4.*

IO. GOTTL. BIDERMANNI diss. inaug. de causis subitae mortis fulmine tactorum. Lips. 4.

Nouvelle méthode d'opérer les hernies par Mr. LE BLANC chirurgien lithotomiste de l'Hôtel-Dieu d'Orléans &c. à laquelle on a joint un essai sur deux hernies rares et peu connues de Mr. HOIN chirurgien à Dijon. à Paris. 8. c. fig.

ANT. BLOM diss. inaug. de liquidi genitalis confectione. Trai. ad Rhen. 4.

GEORG. RUD. BOEHMER diss. inaug. de caussis, vterum impraegnatum distendentibus. Resp. Io. Guil. Frid. Kuhn. Witeb. 4.

PHIL. ADOLPH. BOEHMER diss. inaug. de febre catarrhali maligna epidemica, angina gangraenosa stipata. Resp. Chr. Gottl. Conrad. Hertzog. Hal. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de nonnullis momentis, ad curationem epilepsiae spectantibus. Resp. Io. Ern. Stahl. ib. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de usu salutari extracti aconiti in arthritide observationibus comprobato. Resp. Io. Frid. Andreae. ib. 4.

Aphorismes de chirurgie D'HERRMANN BOERHAAVE commentés par Mr. VAN SWIETEN. Nouvelle traduction du latin en françois avec des notes par Mr. LOUIS. Tom. I. – VII. à Paris. 8.

*Eiusd.* maladies des femmes et des enfans; avec un traité des accouchemens, tiré des aphorismes commentés par VAN SWIETEN, traduits et augmentés de quelques notes et observations par Mr. A. L \* \* \*. ib. 12.

Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, contenant l'histoire des végétaux, des animaux, des minéraux, des corps celestes, des météores etc. par Mr. DE BOMARE. ib. 4. Voll. 4.

Il maniscalco instruito nella medecina pratica delle prin-



principali malattie del cavallo dal Sign. Conte  
FRANCISCO BONSI. Tom. II. In Rimini. 8.

Recherches sur le poulx par rapport aux crûes par  
TEOPHILE DE BORDEU. seconde edition. à  
Paris. 12.

ADOLPH. IULIAN. BOSE progr. de differentia  
fibrae in corporibus trium naturae regnorum.  
Viteberg. 4.

ERN. GOTTL. BOSE diss. inaug. de venae sectione  
in puerperis. Resp. Carol. Christoph. Schnorr.  
Lips. 4.

An account of Corsica; the journal of a tour to  
that Island; and memoirs of Pascal Paoli. By  
JAM. BOSWELL. Lond. 8.

JAC. VON BREDA diss. inaug. quid vir atque fe-  
mina coeundo ad embryonis generationem con-  
ferat. L. B. 4.

HEINR. CHR. VON BROCKE *wahre Gründe der  
physicalisch und experimental allgemeinen Forstwis-  
senschaft, oder Unterricht, wie neue Holzungen an-  
zubauen, alte zu verbessern, wilde Baumschulen an-  
zulegen, junge Bäume gezogen, gewartet und ge-  
pflanzt werden müssen, wobey die Fehler, welche  
bey den Anbau des Holzes vorgehen, auf das deut-  
lichste gezeigt werden, als ein Handbuch für Forst-  
bediente zu gebrauchen. Leipz. 8.*

MARTIN. THUAN. BRÜNNICHI ichthyologia  
Massiliensis sistens piscium descriptiones eorum-  
que apud incolas nomina. Accedunt spolia ma-  
ris Adriatici. Hafn. et Lips. 8.

Lettres sur la méthode de s'enrichir promptement  
et de conserver sa santé par la culture des végé-  
taux exotiques par Mr. PIERRE JOS. BUC-  
HOZ. Tom. I. à Paris. 8.

*Ciusd.* médecine rurale et pratique, tirée unique-  
ment des plantes usuelles de la France, appli-  
Tom. XVII. Pars I. M quées

quées aux différentes maladies, qui regnent dans les campagnes, ou pharmacopée végétale et indigène, contenant les formules tirées du règne végétal, ensemble l'explication sommaire des vertus de chaque plante et les définitions symptomatiques des maladies; ouvrage également utile aux Seigneurs de campagne, aux curés et aux cultivateurs ib. 12. Voll. 2.

FRANC. HENR. BUCHHOLTZ diss. inaug. de hepatomphalocèle congenita. Argentor. 4. c. tab. aen.

DAN. CHRIST. BURDACH diss. inaug. de laceratione partium, fetus nutritioni inferuentium, abortus causa. Lips. 4. c. tab. aen.

NICOL. LAUR. BURMANNI flora Indica, cui accedit series 200 zoöphytorum Indicorum, nec non prodromus florae Capensis. L. B. 4. mai. c. tab. aen.

ANDR. EL. BÜCHNER diss. inaug. de differentiis morborum, quae constitutioni epidemicae debentur. Resp. Io. Gottl. Hincke. Hal. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de salutaribus et nociuis dolorum effectibus. Resp. Carol. Benjam. Ruffero. ib. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de primis viis, morborum periculis sedes frequentissima. Resp. Frid. Barthas. Krupp. ib. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de virtute corticis Peruviani antiphlogistica. Resp. Georg. Sigism. Weichero. ibid. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de methodo antiphlogistica in genere. Resp. Anton Krock. ib. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. de diuersa colicam pectorum curandi methodo. Resp. Chrysostom. Gullielm Schroeter. ib. 4.

*Eiusd.* diss. inaug. qua proposita a Cl. MACKEREL de putredinis theoria examini subiicitur. Resp. Io. Gorgolio. ib. 4.



- ANDR. EL. BÜCHNER diff. inaug. de methodo  
medendi febribus intermittentibus. Resp. *Christ.*  
*Adolph. Helwig.* Hal. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de cauto regiminis calidi usu.  
Resp. *Io. Ludou. Kulmus.* ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de plantarum amararum insigni  
virtute medica. Resp. *Carol. Gottgetr. Wer-*  
*muth.* ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de roborantium differentiis in  
praxi bene attendendis. Resp. *Io. Dieter. Open.*  
ibid. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de morborum similitudine. Resp.  
*Conrad. Ihle.* ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de secretionum legibus generalio-  
ribus. Resp. *Henr. Aug. Kuppio.* ib. 4.
- CHRISTIAN. GOTTLIEB BÜRCKNER progr.  
de aëre vectore. Gerae. 4.
- C. PHP. GOTTL. BÜTTNER *Anweisung für ange-*  
*hende Arzeneybesessene, worauf sie bey Ausstellung*  
*eines Obductions - Attestes über tödtliche Verletzun-*  
*gen acht zu geben haben.* Königsb. 4.
- Innesto felice di vajuolo instituto e descritto da  
LEOPOLD. MARC. ANTON. CALDANI.  
Padua. 8.
- SPIR. CLAUD. FRANC. CALVET diff. de motu  
musculari. Resp. *Annib. Georg. Maynier.* Aue-  
nion. 4.
- Eiusd.* quaestio phys. med. an a puluere sympathe-  
tico dicto vulnerum sanatio expectanda? Resp.  
*Laurent. Agricol. Peru.* ib. 4.
- IO. FRIEDR. CASSEBOHMS *vollständige An-*  
*weisung zur gründlichen anatomischen Betrachtung*  
*und Zergliederung des menschlichen Körpers. Neue*  
*und vermehrte Ausgabe von ERN. GOTTFR.*  
*BALDINGER.* Berlin und Stralsund. 8.
- La theorie de l'ouie, supplement à cet article du  
M 2 traité

traité des sens par Mr. LE CAT. à Paris. 8.  
c. fig.

*Eiusd.* cours abrégé d'osteologie. ib. 8.

*Kritischer Versuch einer deutschen Uebersetzung der 8.  
Bücher des AUREL. CORNEL. CELSI von der  
Arzeneykunst von D. IO. HEINR. LANGEN.  
Lüneb. 8.*

Experiences et observations sur la cause de la mort  
des Noyés et les phenomenes qu'elle presente.  
Faites publiquement à l'école Royale vétérinaire  
de Lyon, sous les yeux des commissaires nom-  
més, approuvées par leur rapport et le jugement  
de l'académie royale de Chirurgie. Par MMs.  
CHAMPEAUX et FAISSOLE. à Lyon et à Pa-  
ris. 8.

Essay on fevers. By I. CHALMER. Lond. 8.

\* \* CHAPMANNS neue verbesserte Hebammenkunst.  
Neue Auflage. Helmstädt und Magdeburg. 8. mit  
Kupfern.

Lettres sur la lithotomie pour prouver la superiori-  
té du lithotome caché pour l'opération de la tail-  
le sur tous les autres instrumens, qui ont été  
proposés jusqu'à ce jour; lesquelles contiennent  
plusieurs observations très-essentielles à la chi-  
rurgie et en particulier à l'operation de la taille  
par Mr. CHASTANET. à Londres et à Paris.  
8. mai.

IO. FRID. CLASS specimen observationum criti-  
carum ad CORNELIUM CELSUM. Traj. ad  
Rhen. 4.

Ergo pro multiplici cataractae genere multiplex  
ἐγχειρησις. Auctore IO. COLOMBIER. à Pa-  
ris. 4.

Ossium extremitatum comminutio, non fragmento-  
rum extractio. Auctore IO. AUGUSTIN COU-  
TAVOZ. ib. 4.



HENR. IO. NEPOM. CRANZ de duabus dracō-  
nis arboribus botanicorum cum figuris aeneis  
partium fructificationis duorumque nouorum ge-  
nerum constitutione. Vienn. 4.

Eiusd. *Einleitung in eine wahre und gegründete Heb-  
ammenkunst. Neue Auflage. ib. 8.*

FLOR. LAURENT. FRID. CRELL diss. inaug.  
contagium viuum lustrans. Helmst. 4.

Physico chymie theorique par L. I. DE CROIX,  
Apothicaire à Lille. à Lille et à Paris. 8.

De principiis vegetationis et agriculturae et de caus-  
fis triplicis culturae in Burgundia disquisitio phy-  
sica, Auctore E. B. D. Tom. I – IV. Diuion. et  
Paris. 8.

Observations chirurgicales sur les maladies de l'ure-  
tre, traitées suivant une nouvelle methode; cin-  
quieme edit. augm. de nouvelles observations et  
des remarques particulieres par Mr. DARAN. à  
Paris. 12.

ROBERT DAVISON'S diss. inaug. de solutione  
mercurii in acido vegetabili eiusdemque vsu. L.  
B. 4.

*Vorläufige Nachricht von dem sale aperitiuo Frideri-  
ciano oder eröffnenden Friedrichs - Salze von D.  
HEINR. FRIEDR DELIUS. Zwote vermehrte  
Auflage. Hildburgshausen. 8.*

Eiusd. diss. inaug. de vitione cranii in epilepsia, Au-  
ctore et Resp. Io. Phil. Iul. Rudolph. Erlang. 4.

Essays on the puerperal fever and on puerperal  
conuulsions. By THOM. DENHAM, M. D.  
Lond. 8. mai.

Ergo datur hydrops, in quo humectantia diluentia-  
que hydragogis sunt praemittenda. Auctore I.  
CAROL. DESESSERTZ. Paris. 4.

THOM. DIMSDALES *Unterricht von der gegen-  
wärtigen Methode die Kinderblattern einzupfro-*

*pfen. Nebst einigen Versuchen, die natürlichen Blattern auf eine ähnliche Art zu behandeln. Aus dem Englischen übersetzt von CARL FRIEDR. TIEMANN, A. M. Leipz. 8.*

THOM. DIMSDALES *Auszug von der heutigen Inoculations-Geschichte in England. Aus dem Englischen übersetzt von IO. NEPOM. ANTON LEUTHNER Churfürstl. Bayrischen Hofmedico. München 8.*

*Eiusd. Verhandeling over de tegenwoordige manier van inenting der kinder pokjes. Waar by gevoegd zyn eenige proeven, in het werk gesteld, met oogmerk om te ontdekken de uitwerkingen van eene soortgelyke behandeling in de natuurlyke kinder - pokjes. Uit het Engelsch vertaald door EDUARD SANDIFORT. Tweeden druk, vermeerderd met een bericht van den uitslag der inenting, volgens deeze manier, hier ter plaatse in't werk gesteld. In's Gravenhage. 8. mai.*

Mémoires of agriculture and other oeconomical arts By ROBERT DOSSIE. Vol. I. Lond. 8.

Traité physiologique et chymique sur la nutrition. Ouvrage, qui a remporté le prix de physique de l'académie des sciences et belles lettres de Berlin par Mr. DURADE. à Paris. 12.

IO. FRID. CHRIST. EBELING *Spec. inaug. de tussi infantum convulsiva. Götting. 4.*

IO. PETR. EBERHARDS *Versuch eines neuen Entwurfs der Thiergeschichte. Nebst einem Anhang von einigen seltenen und noch wenig beschriebenen Thieren. Halle. 8. m. K.*

IO. THEOD. ELLERS *Physiologie und Pathologie herausgegeben von D. I. L. ZIMMERMANN Dritte vermehrte Auflage. Altenb. 8. mai.*

IO. LEONH. EYRICHS *Entwurf der vollkommenen*  
*Rein*



*sten Bienenpflege für alle Landesgegenden, darinnen gezeigt wird, wie solche überall mit dem nur möglichen Erfolg zum Erstaunen ins groſſe zu treiben. etc. Frankf. und Leipzig. 8. m. K.*

IO. LEONH. EYRICH'S vollständiges Bienenbuch, oder Plan der Fränkischen physicalisch-oeconomischen Bienengesellschaft. Anspach. 8.

Anfangsgründe der Naturgeschichte zum Gebrauch academischer Vorlesungen von IO. CHRIST. POLYCARP. ERXLEBEN. 1ster Theil. Göttingen. 8.

Eiusd. Betrachtungen über die Ursachen der Unvollständigkeit der Mineralsysteme, nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen. ib. 4.

Traité des maladies vénériennes par Mr. FABRE. Nouv. edit. corrigée et considérablement augmentée par l'Auteur. Tom. I. II. à Paris. 12.

FAISSELE vid. CHAMPEAUX.

IOH. FRIEDR. FASSELLIUS gerichtliche Arzneygelahrtheit, worinnen die vornehmsten Materien des bürgerlichen criminal und geistlichen Rechts nach den neuesten und besten medicinischen Grundsätzen erläutert und erkläret werden. Herausgegeben von CHRIST. RICKMANN und ins Deutsche übersetzt von CHRIST. GOTTFR. LANGEN. M. D. und Practicus zu Rudisfin. 8.

Instructions importantes au peuple sur les maladies chroniques, pour servir de suite à l'avis au peuple de Mr. TISSOT sur les maladies aiguës par Mr. FERMEY. Tom. I. II. à Paris. 12.

IOH. CLAUD. FLACHAT Untersuchungen zur Beförderung der Handlung, Künste, Handwerker, Haushaltung und Cameralwissenschaft, auf seinen Reisen durch einen Theil von Europa, Asien und Africa angestellt. Aus dem Französischen übersetzt. Leipzig. 8. mit Kupfern.

A treatise upon the formation of the human species;

cies; the disorders incident to procreation in men and women; the evils arising from the abuse of the genital faculties with the most approved and efficacious methods of cure, illustrated with a variety of cases and examples. By JAMES FLEMING. Lond. 8.

Traité pratique de l'inoculation dans lequel on expose les règles de conduite relatives au choix de la saison propre à cette opération, de l'âge et de la constitution du sujet à inoculer; de la préparation, qui lui convient, de l'espèce de méthode, qui doit être préférée et du traitement de la maladie communiquée par l'insertion. Par Mr. GANDOGER DE FOIGNY. à Nancy et à Paris. 8.

Elements of the practice of physic, part the second. Containing the history and methods of treating fevers and internal inflammations. By GEORGE FORDYCE M. D. the second edit. corrected. Lond. 8. mai.

A review of the venereal disease and its remedies. By WILLIAM FORDYCE, Surgeon. The second edition. ib. 8. mai.

JOSEPH. FERDINAND. FRIDERICH diss. inaug. de purgatione menstrua. Vienn. 8.

Pharmacopoeia extemporanea, siue praescriptorum chilias, in qua remediorum elegantium et efficacium paradigmata ad omnes fere medendi intentiones accommodata, candide proponuntur; cum viribus operandi ratione, dosibus et indicibus annexis per THOMAM FULLER. Edit. castigatior curante THEODOR. BARON. Parisiis. 8.

CAROL. FELIC. JOSEPH. DE FURLANI AB ELSENBURG diss. inaug. de salubri venenorum in corpus humanum effectu. Vindobon. 8.



PET. ADRIAN. GADD diff. upgifterat rätkkanna kalkaktige stamarter. Abo. 4.

*Eiusd.* diff. inaug. om sielf frätsten. ib. 4.

GANDOGER DE FOIGNY vid. FOIGNY.

Mémoire dans lequel on prouve l'impossibilité d'annéantir la petite verole, pour faire suite aux observations sur la meilleure maniere d'inoculer par I. I. GARDANE, Docteur en Médecine. à Paris. 8.

*Eiusd.* Conjectures sur l'électricité médicale avec des recherches sur la colique métallique. ib. 8.

Nouvelles reflexions sur la pratique de l'inoculation par Mr. GATTI. à Amsterd. 8.

*Eiusd.* New observations on the inoculation. Translated from the french. By MATY. M. D. London. 8.

IO. GOTTLIEB GLEDITSCH *Anleitung zu einer vernunftmäßigen Erkenntniß der rohen Arzneymittel.* Budissin. 8.

*Eiusd.* *vermischte Anmerkungen aus der Arzeneywissenschaft, Kräuterlehre und Oeconomie. 1ster Theil.* Leipzig. 8. mai.

SAM. GOTTL. GMELIN *historia fucorum.* Petropol. 4. c. f.

*Eiusd.* *flora Sibirica siue historia plantarum Sibiriae,* Tom. III. continet tabulas aeri incisas LXVII. ibid. 4.

Du traitement et de l'exstinction de la variole et de la rougeole, suivi d'un discours aux hommes sur leur santé. Par Mr. GONTARD. à Paris. 12.

CARL. AUGUST GRAEBNERS *Gedanken über das Hervorkommen und Wechseln der Zähne bey Kindern, nebst Anweisung für Erwachsene, die Zähne gesund zu erhalten, nebst einem Zahncalender und vier Kupfertafeln.* Nach dem Hamburger Exemplar. Langensalza. 8.

FRIEDR. CARL GRIMM *Med. Doct. Sendschreiben an Herrn ALBERT VON HALLER von der Epidemie zu Eisenach im Jahr 1767. und den Mittelwieder dieselbe.*

Mémoires pour différentes parties des sciences et des arts. Par JEAN STEPHAN GUETTARD. Tom. I. à Paris. 4. c. f.

La nature opprimée par la médecine moderne, ou la nécessité de recourir à la méthode ancienne et Hippocratique dans le traitement des maladies. Par Mr. TOUSSAINT GUINDANT, Doct. en médecine de Montpellier. ib. 8. mai.

*Sammlung von verschiedenen raren sympathetischen, magnetischen und andern Curen, wie auch von andern wunderbaren und in der Haushaltung nützlichen Kunststücken und Experimenten von M. H. Altona. 8.*

MATTHYS VAN DER HAAGE noodige en volstandige arzneykundige onderwyzinge. à Amsterdam. 8. c. f.

ANTON DE HAEN rationis medendi in nosocomio practico Vindobonensi. Pars XII. L. B. 8.

HEINRICH HAGENS *physicalische, chymische Betrachtungen über die Herkunft und Abstammung des Feuerbeständigen vegetabilischen Laugensalzes. Königsberg. 4.*

Pan apum eller afhandling om de Oerter af huilkaa bien hållt draga deras honung och vax ingifven til kongl. Wetenskaps Akademien sasom svar på desfraga angående bi-sköffel af IOHAN OTTO HAGSTRÖM. M. D. Stockholm. 8. mai.

IO. DAV. HAHNII praelectio academica de mathesi et chemia earumque mutuo auxilio. Traiecti ad Rhen. 4.

ALBERT. DE HALLER operum anatomici argumenti minorum. Tom. III. Accedunt opuscula pathologica aucta ac recensita. Laufann. 4. c. f.

ALBERT.



ALBERT. DE HALLER opuscula pathologica aucta. Lausann. 8.

*Eiusd.* elemens de physiologie. Traduction nouvelle du latin en françois. Par Mr. BORDENAVE. à Paris. 12. Vol. 1.

*Eiusd.* Anfangsgründe der Physiologie des menschlichen Körpers. Aus dem Lateinischen übersetzt von IO. SAMUEL HALLEN. IVter Band. Berl. 8.

Traité des arbres fruitiers, contenant leur figure, leur description, leur culture etc. Par DU HAMMEL DU MONCEAU. Tom. I. II. à Paris. 4. mai. c. tab. aen.

*Eiusd.* traité de la conservation des grains et en particulier du froment. ib. 12.

GEORG. ERHARD HAMBERGERS *semitische Vorlesungen über* IO. LOMMIUS *medizinische Wahrnehmungen durch* IO. DAV. GRAU. Zweyter Band. Lemgo. 8.

CHRISTIAN RUDOLPH HANNES *Brief an den Herrn D. ERNST GOTTFRIED BALDINGER über den Friesel und andre Beobachtungen. Wesel und Leipzig.* 8.

Voyages dans le Levant, dans les années 1749. 1750. 1751. et 1752. contenant des observations sur l'histoire naturelle, la médecine, l'agriculture et le commerce et particulièrement sur la Terre - Sainte et l'histoire naturelle de l'écriture par FREDERIC HASSELQUIST Doct. en Médecine, publiés par ordre du Roi de Suede par CHARLES LINNAEUS. Traduits de l'Allemand par M. E. Vol. I. à Paris. 12.

Diff. med. de emolumentis in genus humanum ex variolarum insitione fluentibus. Auctore FRANC. ANTON. HERTZOG. Argentor. 4.

Diff. inaug. de morbo articulari speciatim venereo, praesertim de arthritica quadam feliciter sanata. Aucto-

Auctore LUDOV. DAVID. HERTZOG. Helm-  
städt. 4.

Anmärkningar uid bergs . handteringens atskilliga  
öden och omväxlingar; förestälde uti et tal för  
kongl. Vetenskaps Academien, uid praesidii ned-  
läggning den 13. iul. 1768, af DETLOF HEY-  
KENSKÖLD, Bergs-Rad. Stockholm. 8. mai.

The vegetable System or the internal structure and  
the life of plants their parts and nourishment  
explained; their classes, orders, genera and spe-  
cies ascertained and described; in a method al-  
together new comprehending an artificial index  
and a natural system. With figures of all the  
plants, designed and engraved by the Author.  
The Whole from nature only. By JOHN HILL.  
M. D. Vol. XIII. Herbs having flowers of five  
petals, with an appendix, containing the figu-  
res and history of ten new discovered plants.  
Lond. fol. mai.

*Eiusd.* hortus Kewensis, sistens herbas exoticas in-  
digenasque rariores, in area botanica hortorum  
Augustissimae principissae CAMBRIAE DOTI-  
SAE apud Kew in comitatu Surreiano cultas;  
methodo florali noua dispositas. ib. 8.

A treatise on fruit - trees. By THOM. HILT.  
The third edition. ib. 8.

LEONH. ELIAS HIRSCHELS *Briefe über ver-  
schiedene Gegenstände aus dem Reiche der Arznei-  
wissenschaft. 1ster Theil.* Berlin. 8.

*Medicinische Beobachtungen und Versuche von Herrn  
FRANZ HOME. Aus dem Englischen übersetzt  
von D. KÖNIGSDÖRFERN.* Altenb. 8. mai.

CHRISTOPH. HUBER diss. inaug. de lue venerea.  
Vienn. 8.

10. THEODOR. HÜSER diss. inaug. de steatoma-  
te. Argentorat. 4.

Libellus



Libellus de natura, caussa, curationeque scorbuti.  
Auctore NATHANAEL HULME M. D. To  
which is annexed a proposal for preuenting the  
scurvy in the British navy. Lond. 8. mai.

FRIDER. GUILIELM. HUTH diss. inaug. sistens  
casum virginis, hydrope ouarii extinctae, cum  
analyfi annexa. Argentor. 4.

Essai sur les différentes espèces de fièvres avec plu-  
sieurs autres traités etc. par JEAN HUXHAM,  
Doct. en médecine. Nouvelle édition. à Paris. 12.

CHRISTIAN. FRIDER. IAEGER diss. inaug. de  
spiritu salis ammoniaci cum calce viua, praeci-  
pueque de eius a spiritu salis ammoniaci cum al-  
cali fixo parato differentia. Resp. Io. Christian  
Williardts. Tubing. 4.

Lettre de Mr. INGENHOUSZ Doct. en Médecine  
à Mr. CHAIS, au sujet d'une brochure, conte-  
nant sa lettre à Mr. SUTHERLAND et une ré-  
ponse de Mr. SUTHERLAND à Mr. CHAIS  
sur la nouvelle méthode d'inoculer la petite vero-  
le. à Amsterdam. 8. mai.

IA C. FRID. ISENFLEMM diss. inaug. de vasis  
neruorum. Resp. Io. Frieder. Doerfler. Erlan-  
gae. 4.

Dictionnaire interprete de matiere médicale et de  
ce qui y a rapport. Par Mr. JULLIOT Dé-  
monstrateur en chymie. Vol. I. à Paris. 12.

FRID. CHRISTIAN. IUNCKER diss. inaug. de  
aquarum hydropicarum euacuatione prudenti ex-  
emplis quibusdam clinicis illustrata. Resp. Io.  
Christ. Godofr. Iahn. Halae. 4.

Eiusd. diss. inaug. sistens saluationem spontaneam.  
Resp. Herm. Dav. Hecker. ib. 4.

F. S. K. Irthümer, Warnungen und Lehren, welche  
das Publicum in Ansehung der practischen Arzney-  
kunst betreffen. Erstes Buch. Dessau. 8.

AEGIDIUS KAISIN diss. inaug. de gonorrhoeis.  
Vindobon. 8.

PETR. KALM diss. om den skada, som kiol den  
tilfoget äker och trädgårds skötsel i Finland  
Abo. 4.

GOTTLIEB HENR. KANNENGIESSERI in-  
stitutiones medicinae legales in usum auditorum  
concinnatae cum praef. ANDR. ELIAE BÜCH-  
NERI. Halae. 8.

Eiusd. diss. inaug. de hydrope. Resp. Corn. Io.  
Nörtinger. Kiliae. 4.

Eiusd. diss. inaug. de insitione variolarum. Resp.  
Christian Adolph. Carsten. ib. 4.

CHRISTIAN ERHARD KAPP diss. inaug. de ex-  
stirpatione tumorum in mamma. Lips. 4.

IOH. CPHP. KAYSERS VON FRENTZ *Nach-  
richt von brandigten Weitzen.* Bernburg. 8.

CHRIST. GOTTLIEB KRATZENSTEIN de re-  
solutione et impotentia motus muscularis. Resp. Io.  
Henr. Schoenheyder. Hafn. 8. mai.

JO. GEORG. KRÜNITZ *Verzeichniß der vor-  
nehmsten Schriften von den Kinderpocken und deren  
Einpfröpfung.* Leipzig. 8.

H. M. KUGELMANN diss. inaug. sistens diffidia  
Auctorum circa chloroseos occasiones, euentum  
et curationum quoad partem. Argentorat. 4.

SIMON LANGE diss. inaug. de genesi et morbis  
offium. Vienn. 8.

L'art de se traiter et de se guérir soi même, dans  
les maladies le plus ordinaires et le plus dange-  
reuses. Traduit de l'Allemand de DANIEL  
LANGHANS. Vol. I. II. à Paris. 12.

Reliqua proxime.



Contenta in hac parte.

I.	Mémoires de mathématique et de physique présentés a l'Academie royale des sciences de Paris. Tom. V.	P. 3
II.	Traité des fleurs blanches, avec la méthode de les guérir par Mr. RAULIN. Tom. I. II.	28
III.	L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l'ornithologie. Traduit du latin de RAY par Mr. SALLERNE.	45
IV.	BRÜNNICHII ichthyologia Massiliensis.	47
V.	SCHLOSSER de lacerta Amboinensi.	48
VI.	FORLANI rariores observationes medico practico anatomicae.	50
VII.	Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för År 1768. Vol. XXIX.	58
VIII.	ZÜCKERTS <i>systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands.</i>	78
IX.	Saggio di nuove osservazioni e scoperte e continuazione del Saggio di PALLUCCI	85
X.	SCHAEFFERI icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum. Vol. I. II.	92
XI.	Traité des maladies des gens de mer par Mr. POISSONNIER DESPERIERRES.	94
XII.	Expériences et observations sur la cause de la mort des noyés, par M <sup>M</sup> rs. CHAMPEAUX et FAISSOLE.	109

- |   |        |
|---|--------|
| XIII. Mémoire sopra i muli di varii Autori  | p. 120 |
| XIV. Verhandeligen vitgegeeven door de<br>Hollandſche Maatſchappye VIII. Deel.<br>I und 2, Stuck.   | 124    |
| XV. Mémoires de Chirurgie par ARNAUD.   | 141    |
| XVI. Svar pa kongl. Vetensk. Academiens fra-<br>ga huru all slags frifel kan förekommas<br>och botas, ſa hos barnsängs huſtruv, ſom<br>andra? | 151    |
| XVII. DE FISCHER de febre miliari.  | 154    |
| XVIII. DELII diff. inaug. de vſtione cranii in<br>epilepfia.  | 158    |
| XIX. WOHLFART de vermibus per nares<br>excretis.  | 159    |
| XX. Noua phyſico medica.  | 161    |
| XXI. Index ſcriptorum phyſico medicorum,<br>quae anno 1768. prodierunt.   | 165    |
-